





+QK281
.R4
v.1





ICONES
FLORAE GERMANICAE ET HELVETICAE

SIMUL

**PEDEMONTANAE, TIROLENSIS, ISTRIACAE, DALMATICAE,
AUSTRIACAE, HUNGARICAE, TRANSYLVANICAE, MORAVICAE, BORUS-
SICAE, HOLSATICAE, BELGICAE, HOLLANDICAE,**

ERGO

MEDIAE EUROPÆ.

ICONOGRAPHIA ET SUPPLEMENTUM AD OPERA WILLDENOWII, SCHKUHRII, PERSOONII,
DECANDOLLI, GAUDINI, KOCHII ALIORUMQUE,

EXHIBENS

NUPERRIME DETECTIS NOVITIIS ADDITIS

COLLECTIONEM COMPENDIOSAM IMAGINUM CHARACTERISTICARUM OMNIUM
GENERUM ATQUE SPECIERUM

QUAS IN SUA

FLORA GERMANICA EXCURSORIA

RECENSUIT

AUCTOR

LUDOVICUS REICHENBACH.

VOLUMEN PRIMUM.

EDITIO SECUNDA EMENDATA ET AUCTA.

L I P S I A E

APUD FRIEDERICUM HOFMEISTER.

1850.

AGROSTOGRAPHIA GERMANICA
SISTENS
ICONES GRAMINEARUM

QUAS IN
FLORA GERMANICA

RECENSUIT

AUCTOR

LUDOVICUS REICHENBACH.

EDITIO SECUNDA EMENDATA ET AUCTA.
1850.

DIE
G R Ä S E R

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

DER

DEUTSCHEN FLORA

IN GETREUEN ABBILDUNGEN AUF 121 KUPFERTAFELN

DARGESTELLT

VON

H. G. LUDWIG REICHENBACH

KÖNIGL. SÄCHS. HOFRATHE, DR. DER MED. UND PROF. DER NATURGESCHICHTE IN DRESDEN.

LEIPZIG
BEI FRIEDRICH HOFMEISTER.
1850.

Ordo secundus.

Caulocoleophyta.

Culmus nodis interceptus tubulosus aut faretus, quibusdam ad bulbi locum reductus scapiger et paucis caulis foliosus. Trias in flore subdefinita, simplex vel aucta, raro abortu reducta.

Series I. **Glumaceae:** flos aut inflorescentia vaginâ herbaceâ stipata, flores ipsi bracteati lodiculas i. e. sepalorum rudimenta praebentes, in Commelinaceis tandem calyx trisepalus et corolla tripetala absolvuntur. Oriuntur schizogynae, hologynae tandem absolvuntur. Glumae s. bractee et bractiolae magis magisque in supremis formis ad vaginas reductae.

Fam. XLIX.

G r a m i n e a e.

Repertor. herbarii p. XXXIV. et 35.

Gradus evolutionis gynaecei primus. Ovarium ideo asymmetricum unilaterale uniovulatum schizogynum, styli duo fimbriati, bractee et bracteolae alternae glumaceae distichae, intima e duabus quae siconnata binervis, sepala — quae lodiculae dicuntur bina — subterna aequaliter hypogyna. Stamina subterna sepalis alternantia — abortu singulum aut bina, excessu sena vel plura —, antherae biloculares incumbentes, loculi utrinque subseparati. Caryopsis altero latere unisulca aut teres, cylindrica, oblonga aut globosa, extrorsum membranacea, crustacea, ossea, ultimis exoticis succoso-drupacea. Albumen farinaceum, embryo basilaris accumbens.

Divisio graminum secundum artificiales notas: habitum, inflorescentiam, florum sexum eorumque singularitatem aut aggregationem et alios characteres tentata est et vario modo exculta, sed cardo rei cernitur in ovario ipso, quod solum characteristicas notas divisionis fundamentales praebere potest, ubi eius progressus ex asymmetrico statu in symmetricum et evolutionem tegminum negligere non malles.

Erit enim sempiternum problema systematis naturalis: sequi naturam, quod fieri non potest nisi relationes illae occultae explorantur, quae manifestam constituent concinnitatem evolutionis organismorum cum progressibus illis, quos a polari regione versus aequatorem docet geographia plantarum.

Praestat autem in familia quacunque organum illud, quod in gradu naturali ipsam constituit et suam evolutionem absolvit. In graminum familia pistillum solum excellit, lodiculae non raro desunt aut numero variant et stylus ipse cum stigmatibus varians nonnisi accessorias notas potest praebere.

Fructus progressus lucusque neglecti ex asymmetrico statu unisulco in globosum et e fabrica membranacea pericarpium in carnosum transientes tantum characteristici fiunt, quantum sunt revera naturales. Praeterea stigmatum fabrica partim sequentes familias indicans, divisionum subdivisionibus apte convenit: ita ut a *Phippsiae algidae* gramine polari usque ad *Melocannae* intratropicum genus omnis graminum vegetatio absoluta ab ipsa natura demonstraretur.

Habemus igitur, ubi relationes ad reliquas glumaceas plantas: Cyperoidae et Commelinaceas non negliguntur, divisiones graminum tres naturales, quae sunt:

1. **Gramineae genuinae:** caryopsis unisulca, stigmata plumosa, e basi floris exserta. — Gramina borealia cum illis mediae regionis cespitosa et pratensia. Series eo modo se invicem sequuntur, ut in iis relationem ad superiores divisiones, quas vel repetunt vel indicant cernere possis.

Series I. **Avenaceae:** graminum solenocarporum maxime typicae formae, plurima uniflora, singula paniculata.

Linea I. **Agrostideae:** flores in panicula solitarii, quibusdam flosculi alterius rudimentum, glumae et glumellae bivalves membranaceae aut herbaceae, sepala bina, caryopsis glumellâ involuta.

Gastridium P. B.

Calamagrostis RTH.

Agrostis L.

Ammophila Host.

— Apera ADANS.

Linea II. **Aveneae:** spiculae 2 — 00-florae flosculo rudimentario terminali, glumae et glumellae bivalves, membranaceae aut herbaceae. glumella inferior ut plurimum arista tortili terminata.

Koeleria L.	Holcus L.
Corynephorus P. B.	— Arrhenatherum P. B.
Aira L.	Avena L.

Linea III. **Stipeae:** flores in panicula solitarii, glumella inferior involuta aristata — arista etiam articulata, tortilis, quibusdam trifida demum indurata, ovarium stipitatum, sepala 2 — 3. — Ultima genera praeparant gramina panicea.

Stipa L.	Piptatherum P. B.
Lasiagrostis LK.	Milium L.

Series II. **Triticeae:** gramina solenocarpa inflorescentiâ e spiculis spicatâ. — Gramina primum indicantia habitum Cyperoidearum.

Linea I. **Rottboelliaceae:** spica articulata, spiculae in excisuris axis uni—biflorae quibusdam triflorae, flosculus alter rudimentarius; glumae coriaceae 0 — 1 — 2, glumellae membranaceae. — Sunt Agrostideo-Triticeae.

Psilurus TRIN.	Lepturus P. BR.
----------------	-----------------

Linea II. **Loliaceae:** spica continua, spiculae verticaliter complanatae ex axis excisura orientes 3 — 00-florae flosculis rudimentariis terminatae, gluma 1 — 2-valvis glumellae bivalves herbaceae. — Gramina typica seriei.

Lolium L.

Linea III. **Hordeaceae:** spica plurimis continua, spiculae horizontaliter deplanatae ex axis excisuris ortae, 3 — 00-florae flosculis rudimentariis terminatae, gluma et glumella bivalvis herbacea.

Gaudinia P. B.	Triticum L.
Aegilops L.	Hordeum L.
Elymus L.	Secale L.

Series III. **Festucaceae:** gramina solenocarpa inflorescentiâ e spiculis paniculatâ.

Linea I. **Arundineae:** panicula (quibusdam thyrsoides), spiculae $1\frac{1}{2}$ — 2 — 00 florum plurimis comatae, flosculo terminali exserto. (gluma et glumella membranaceo-herbacea, caryopsis minus profunde sulcata. — Agrostideo-Festucaceae Calamagrostidem Ammophilamque repetentes.

Ampelodesmos LK.	Arundo L.
Phragmites TRIN.	

Linea II. **Poaceae:** panicula (quibusdam thyrsoides), spiculae 2 — 00-florae, flosculo terminali immerso, gluma proximâ glumellâ brevior. — Centricae Seriei. —

Lophochloa RCHB.	Scalochloa LK.
Dactylis L.	Catabrosa P. B.
— Chamaedactylis N. v. E.	Poa L.
Molinia SCHRK.	Eragrostis P. B.
Triodia R. BR.	Briza L.

Linea III. **Festuceae:** panicula (quibusdam thyrsoides), spiculae 2 — 00-florae flosculo rudimentario terminali exserto, gluma glumellâ proximâ brevior. — Genera prima Rottboelliaceas repetunt et Arundineas, media Loliaceas et Poaceas, ultima Hordeaceas referunt et Paniceas praeparant.

Nardurus RCHB.	Cynosurus L.	Bromus L.
Vulpia GM.	Lamarkia MICH.	Schedonorus P. B.
Sphenopus TRIN.	Brachypodium P. B.	Festuca L.
Sclerochloa P. B.		Glyceria R. BR.
Beckmannia HOST.		Melica L.

II. **Gramineae subcyperoideae:** caryopsis fusiformi-subcylindrica exsulca, stigmata brevissime fibrillosa versus apicem floris exserta. — Mediis hemisphaerae regionibus solennes, paucae — ut Phleum et Alopecurus — pratenses, in plurimae solitariae. Cyperoidearum qualitates cernuntur in multis habitu scapigero, in sepalorum defectu, in stigmatibus exsertis breve fibrillosis, quibusdam in antheris erectis, tandem in inflorescentia fasciculata et adeo in caryopsi reticulata Coleanthi.

Series I. **Sesleriaceae:** stereocarpae avenaceo-subcyperoideae, inflorescentia fasciculata, capitata, spicata et ultimis thyrsoides.

Linea I. **Coleanthae:** fasciculi florum contracti vaginati; flosculi solitarii, gluma nulla, glumella bivalvis, sepala nulla. Caryopsis reticulata.

Coleanthus SEIDL.

Linea II. **Sesleriae:** spica, spiculae 2 — 00-florae, gluma membranacea, flosculos amplexans, sepala bina.

Echinaria DSF.	Sesleria AND.
Psilathera LK.	Oreochloa LK.

Linea III. **Anthoxanthae:** thyrsus, panicula, gluma bivalvis herbacea, flores duo inferiores neutri aut masculi, superiores hermaphrodito-triandri, sepala bina maxima, stylus basi nudus ceterum fibrillosus.

Anthoxanthum L.	Hierochloa GM.
-----------------	----------------

Series II. **Nardoideae:** stereocarpae triticeo-subcyperoideae. — Typicis graminibus omnes contrariae, ambiguum igitur naturae gramineae centrum. —

Linea I. **Nardeae:** spica secunda, flores ex axis excisuris solitarii, stylus simplex nudiusculus, sepala 0, anthera incumbens vacillans.

Nardus L.

Linea II. **Sparteae**: spiculae binae—ternae basi tubuloso-connatae, gluma 0, glumella bivalvis, sepala 0, anthera erecta, stylus longissimus nudus. — Typi graminei contrarium infimum familiae constituit centrum.

Lygeum L.

Linea III. **Spartineae**: spicae laterales, flores solitarii in gluma bivalvi, glumella bivalvis, styli basi connati superne fibrillosi.

Spartina SCHREB.

Series III. **Phalarideae**: stereocarpae festuaceo-subcyperoideae Panicaceas ulterius praeparantes.

Linea I. **Alopecureae**: thyrsus, spiculae 1 — 1½-florae, gluma conchaeformis, flos glumae immersus, stylus breve fibrillosus.

Mibora ADANS.

Lagurus L.

Alopecurus L.

Colobachne LK.

Linea II. **Phalareae**: thyrsus, panicula lobata, spiculae 1 — 1½-florae, gluma carinata, flos glumae immersus, stylus aspergilliformis.

Phleum L.

Phalaris L.

— Achnodon L.

— Baldingera G. M. S.

— Chilochoa P. B.

Linea III. **Oryzeae**: panicula, quibusdam racemus, spiculae 1 — 2 — 3-florae, glumellae rigide membranaceae, infima neutra univalvis, flos terminalis fertilis, stamina 3 — 6, stylus aspergilliformis.

Leersia SOL.

Oryza L.

III. **Gramineae subcommelinaceae**: caryopsis brevis imo globosa. summis drupacea! stigmata aspergilliformia e floris medio emersa, sepala truncata. — Plurimae tropicae, paucae in zona moderata, paucissimae in boreali.

Series I. **Panicaceae**: avenaceo-subcommelinaceae.

Linea I. **Panicaceae**: thyrsus, spicae laterales aut digitatae, panicula. Spiculae 1½-florae, gluma bivalvis inferior minor planiuscula superior conchaeformis, glumellae cartilagineae.

Panicum L.

Setaria P. B.

— Digitaria Scop.

— Echinochloa P. B.

— Oplismenus P. B.

Linea II. **Tragineae**: racemus, spiculae compressae uniflorae, gluma bivalvis inferior parva inermis, glumella bivalvis.

Tragus DESF.

Linea III. **Olyreae**: panicula racemosa terminalis mascula, spiculae biflorae. Spadix axillaris femineus, spiculae biflorae altero flosculo neutro. Stylus longissimus nudiusculus subsimplex. — Primum indicant Bambusaceae.

Series II. **Saccharineae:** triticeo-subcommelinaceae.

Linea I. **Chlorideae:** spicae laterales aut digitatae, spiculae secundae compressae
1 — 2 — 00-florae, glumae valvula inferior producta.

Cynodon RICH.

Linea II. **Andropogoneae:** spicae articulatae, digitatae aut paniculatae quibusdam
panicula continua. Spiculae geminatae $1\frac{1}{2}$ -florae, terminales ternae.

Heteropogon P.

Pollinia SPR.

Andropogon L.

Sorghum P.

Linea III. **Sacchareae:** spicae articulatae thyrsoidae digitatae aut paniculatae, spi-
culae geminatae $1\frac{1}{2}$ -florae, flores plurimis comati.

Series III. **Bambusaceae:** festuaceo-subcommelinaceae subpolyandrarum, gramineae ve-
getationis proceres! — Omnes exoticae tropicae et subtropicae. —

Linea I. **Arundinarieae:** spiculae pedunculatae terminales aut racemoso-panicula-
tae. — Ultimo loco reflectunt Agrostideas.

Linea II. **Bambuseae:** spiculae fasciculatae subverticillatae. — Ultimo loco ad Tri-
ticeas respiciunt.

Linea III. **Melocanneae:** Bambusaceae drupaceae!

Sunt igitur in graminum agmine typicae familiolae quae sequuntur et serie
parallele relatoria enumerantur:

Gramineae

I. genuinae.

I. Avenaceae.

Agrostideae.

Aveneae.

Stipeae.

II. Triticeae.

Rottboelliae.

Loliaceae.

Hordeaceae.

III. Festucaceae.

Arundineae.

Poaceae.

Festuceae.

II. subcyperoideae.

I. Sesleriaceae.

Coleantheae.

Sesleriae.

Anthoxantheae.

II. Nardoideae.

Nardeae.

Sparteae.

Spartineae.

III. Phalarideae.

Alopecureae.

Phalareae.

Oryzae.

III. subcommelinaceae.

I. Panicaceae.

Paniceae.

Tragineae.

Olyreae.

II. Saccharineae.

Chlorideae.

Andropogoneae.

Sacchareae.

III. Bambusaceae.

Arundinarieae.

Bambuseae.

Melocanneae.

Eadem enumeratio in „Deutschlands Flora, Familie der Gräser 1846“ pri-
mum edita est.

Genera et species.

Gastridium P. B. Spiculæ unifloræ. Gluma bivalvis membranacea basi ventricoso-constricta apice compressa. Glumella bivalvis, valvulae ovato-truncatae dentatae, exterior aristata, stigmata plumosa. — *Gramen annuum planifolium, panicula contracta, pedicelli incrassati subcompressi.*

- 122. *Gastridium lendigerum*** GAUDIN: floribus viridi-argenteo nitidulis, arista exserta. *Milium lendigerum* LIN. *Agrostis australis* LIN. mant. *ventricosa* GOU. *panicea* LAM. *lendigera* POIN. *Gastridium australe* P. BEAUV. KUNTH, 230. 1. *Arundo Schwabii* SPRENG. ! SCHULT. — Datur varietas mutica serotina: *M. lendig. serotinum* GAUD. nitore distinguenda a viridi *G. scabro* PRESL, quod a KUNTHIO sub *G. mutico* GUTH. et SPR. quamvis enumeratum, tamen diversum non dicitur et a *Kochio* rectius restitutum est. RECHB. *Fl. germ. excurs.* 24. 131. *Koch syn.* II. 907.

Icon. tab. LXXIII. A. spicula integra.

Habitat in agris et collibus in littorali. Maio—Aug. ☉. In Dalmatia pr. Zara et Castel nuovo di Cattaro: DE VISIANI. Istria: Brioni maggiore: TOMMASINI. Genevæ: REUTTER. Genua: DE NOTARIS. Nizza: SONDER. — In Hercynia olim 1811 in via cava petrosa inter Wilhelmshöhe versus Harzgerode quasi spontaneum: SCHWABE.

Apera ADANS. Spiculæ unifloræ. Gluma bivalvis compressa, valva inferior minor, ad basin valvæ superioris pedicellus floris deficientis secundi. Glumellæ valvula inferior maior 5-nervis, sub apice aristata, superior minor binervis. Stigmata plumosa. — *Annuae.* — *Anemagrostis* TRIN.

- 123. *Apera interrupta*** P. B. culmo bi—trinodo, panicula tenui conferta ramis subverticillatis inferioribus remotiusculis, arista longissima subflexuosa, antheris ovalibus. *Agrostis interrupta* LIN. *Apera* — P. B. RECHB. *Fl. germ. exc.* 24. 132. KUNTH. 225. 48. KOCH syn. II. 904. *Anemagrostis spica venti var. c.* TRIN.

Icon. tab. LXXIII.

In agris in Carniolia, Austria, Vallesia. — Indicatur etiam in principatu Grubenhagen pr. Salzderhelden: 1820: W. MEYER et in Belgia. — Jun. Jul. ☉.

- 124. *Apera purpurea*** P. B. culmo tri—quadrinodo, panicula ampla rariflora patula, antheris lineari-oblongis. *Agrostis spica-venti purpurea* SCHLEICH. *Agrostis purpurea* GAUD. — RECHB. *Fl. germ. exc.* 25. 133. — Forte varietas sequentis quæcum a KUNTHIO conjungitur.

Icon. tab. LXXIII.

In Helvetia australi in Vallesia: SCHLEICHER et alii. In Pedemontio pr. Eutraque: G. RECHB. fil. Jun. Jul. ☉.

- 125. *Apera spica venti*** P. B. culmo tri — quadrinodo, panicula divergenti-effusa, antheris lineari-oblongis. *Agrostis spica venti* LINN. *Anemochloa* — DEC. — *Anemagrostis* — TRIN. — RECH. *Fl. germ. exc.* 25. 134. KUNTH 224. 47. KOCH syn. II. 904.

Icon. tab. LXXIII. B. spicula. C. flosculus.

In agris, locis incultis vulgata. ☉. Jun. Jul.

***Agrostis* LIN.** Spiculae uniflorae. Gluma bivalvis, valvae subaequales flore longiores. Glumella bivalvis, valvula inferior plurimis dorso aristata superior binervis brevior. Sepala 2. Stigmata plumosa. — *Perennes cespitoso-subramosae verticillato-paniculatae*.

a. *Trichodium* MENX. glumella superior minuta vel subnulla. Folia radicalia setaceo-complicata.

- 126. *Agrostis alpina*** SCOP. panicula oblonga ramis divisis patentibus scabris, glumis lanceolato-acuminatis, glumella inferiori acuta dorso aristata, superiori minima. RECH. *Fl. germ. exc.* 25. 136. KUNTH 222. 33. KOCH II. 903. *Agr. festucoides* VILL. *Agrostis rupestris* WILLD. spec. HOST. DUBY. *Trichodium rupestre* SCHRAD. — Var. *A. flavescens* HOST. *Trichod. flavescens* SCHULT. *Avena aurata* ALL. SUT.

Icon. tab. LXXIV. A. spicula. B. glumellae apex.

In alpium editioribus locis ad rupes cespitosas declives passim, in m. Belchen im Schwarzwalde, in Moravia et in Sudetis a b. GRABOVSKY detecta. Jul. Aug. 24.

- 127. *Agrostis rupestris*** ALLION. panicula oblonga, ramis patentibus laevibus, glumella inferiori denticulata infra medium aristata. RECH. *Fl. germ. exc.* 25. 135. KUNTH 223. 34. KOCH syn. 904. *Agrostis setacea* VILL. *rupestris* DEC. *alpina* WILLD. spec. *Trichod. alpinum* SCHRAD. *Agraulos alpinus* P. B.

Icon. tab. LXXIV. C. spicula. D. glumellae apex.

In alpium tractu ad rupes, in monte Belchen et in summis Sudetis. Jul. Aug. 24.

- 128. 129. *Agrostis canina*** L. panicula oblonga laxa, ramulis scabris sub anthesi patentibus, glumella inferiore truncata denticulata supra medium aristata, arista vix geniculata. RECH. *Fl. germ. exc.* 25. 137. KUNTH 222. 30. KOCH II. 903. *Trichod. caninum* SCHRAD. *Agraulos caninus* P. B. — Var. *pallida* spicularum colore stramineo.

Icon. tab. LXXIV. E. spicula. F. apex glumellae.

In pratis humidis, ad fossas e planitie in locos montosos subalpinos ascendens. Jun. — Aug. 24.

b. *Agrostis* P. B. glumella utraque distincta. Folia radicalia plana.

- 130. 131. 132. *Agrostis vulgaris*** WITHER. panicula oblonga laxa, virginea contracta, ramulis sub anthesi patentibus scabridis, foliis linearibus, ligula oblique truncata. RECH. *Fl. germ. exc.* 25. 138. KUNTH 220. 18. KOCH 902. 2.

Icon. tab. LXXV. A. spicula. B. ligula — 132. A. pumila cum spicula ovarium deforme exserente.

- 130. *Agrostis hybrida*** GAUD. *Agr. helv.* I. 66. minor, spiculae passim aristatae, folia radicalia tenuiora.

Ad lacum Katzenssee pr. Zürich, pr. Herzogenbuchsen: GAUDIN, a CHARPENTIER.

- 131. *Agrostis vulgaris genuina*.**

Vulgaris ad vias, agrorum versuras, in arvis, silvis, montes ascendens. Jun. Jul. 24.

132. *Agrostis vulgaris pumila* s. *A. pumila* LINN.

in siccissimis et sterilibus locis haud raro ustilagine corrupta. 24. Junio—Aug.

133—137 et 139. *Agrostis stolonifera* LINN. *Fl. suec.*: panicula ovali-oblonga divergenti-effusa, ramulis scabridis post anthesin contractis, ligula oblonga, foliis omnibus linearibus. *Rehm. Fl. germ. exc.* 25. 139. Koch syn. II. 901. *A. alba* SCHRAD. KUNTH 219. *ricularis* BROT. *stolonizans* BESS. *mutabilis* SIBTH. *diffusa* Host.

Icon. tab. LXXV et LXXVI.

133 est forma vulgaris. Huc *A. ambigua* R. S.

134. *Agrostis coarctata* HOFFMANN: ramulis contractis floribus breve pedunculatis et subsessilibus. Huc *A. decumbens* GAUD. *a. varia* Host. *capillaris* POLL. LEERS.

135. *Agrostis patula* GAUD.: ramulis confertis patentibus referens habitum singularem ex alpihus helveticis et pedemontanis oblata.

136. *Agrostis gigantea* Roth: bi—tripedalis, panicula maxime effusa plurimiflora plerumque pallidiore. Post messem in agrorum versuris et intra frutices in humidioribus locis.

137. *Agrostis stolonifera vivipara* s. *A. silvatica* HUDS.

Singulae varietates in pratis, ad vias, locis arenosis in planitie et in montosis et alpinis. Jun. Aug. 24.

138. v. infra.

139. *Agrostis maritima* LAM.: panicula contracta, ramulis brevibus, foliis rigide patentibus glauis. *A. glaucescens* Pa. Culmus semidecumbens, habitus densus rigidus littoralis

In septentrionali et meridionali littore maris. Jun. — Aug. 24.

138. *Agrostis verticillata* VILL.: panicula lobato-thyrsoidea densiflora, glumis dorso pubescentibus, ligula brevi truncata denticulata. *A. densa* M. B. *Vilfa stolonifera* P. B. *A. stolonifera* (ex herb. LINN.) SM. KUNTH 219. 12.

Icon. tab. LXXVI. C. spicula.

Ad fossas Maio—Jun. 24. Prope Sebenico, ad lacum di Castell Andresa, Spalato, St. Trinila pr. Cattaro: DE VISIANI. Indicatur pr. Niccam.

139. v. supra.

140. *Agrostis pungens* SCHREB.: ramosa, panicula contracta mutica, foliis numerosis involutis rigidis patentibus pungentibus. *Rehm. Fl. germ. exc.* 139 d. add. *Sporobolus pungens* KUNTH 210. 6.

Icon. tab. LXXVII.

Ad litora maris in arena. Jul. Aug. 24. Indicatur inter Ventimiglia et Savona in Liguria.

Calamagrostis Roth: Spiculae uniflorae quibusdam auctae rudimento floris secundi, flos pilis stipatus. Gluma bivalvis valvae lanceolato-acuminatae flore longiores. Glumella bivalvis, valvulae membranaceae, inferior maior dorso vel apice aristata, superior minor mutica. Stylus brevis, stigmata plumosa. — *Gramina perennia speciosa paniculata.*

a. Arista dorsalis.

aa. *Deyeuxia* P. B. cum rudimento floris secundi: pedicellus ad basin dorsi glumellae superioris apicē barbatus.

142. Calamagrostis stricta SPR.: panicula angusta stricta conferta, glumae valvis acutis, pilis glumella brevioribus, arista glumellam truncato-quadridentatam vix excedente. RCHB. *Fl. germ. exc.* 26. 141. Koch syn. II. 906. *Arundo stricta* TIMM. *neglecta* ENRH. *Deyeuxia neglecta* KUNTH 242. 24.

Planta septentrionalis rigidula, bipedalis et ultra, glumis castaneis.

Icon. tab. LXXVIII. D. spicula. E. apex glumellae.

In pratis vilginosis ad fossas. Jun. Jul. **24.** Schleswig, Holstein, Mecklenburg, Lüneburg, Pommern, Brandenburg, Preussen, Nieder-Lausitz.

143. 144. Calamagrostis silvatica DEC.: panicula rigidula patula, glumis acutis, pilis glumellis multo brevioribus, arista valde geniculata longe exserta. RCHB. *Fl. germ.* 26. 142. *Agrostis arundinacea* L. *Calamagrostis arundinacea* ROTH. *Arundo silvatica* SCHRAD. *Agrostis villosa* VILL. *Deyeuxia silvatica* KUNTH 243. 30. — Var. contracta: *Calamagrostis pyramidalis* Host. nostra ic. 144.

Icon. tab. LXXIX. A. spicula. B. penicillus. C. flos.

In silvis, ericetis, ad montium locos declives. Jul. Aug. **24.**

145. Calamagrostis acutiflora DEC.: panicula rigidula patente, glumis longe acuminatis, pilis glumella brevioribus, arista dorsali parum exserta. RCHB. *Fl. germ. exc.* 26. 144. *Deyeuxia acutiflora* KUNTH 243. 28. *Arundo Agrostis* Scop. *acutiflora* SCHRAD. *Calamagr.* — DEC. *Fl. gall. suppl.* C. *subulata* DUMORT. C. *montana* β. *acutiflora* Koch 906.

Icon. tab. LXXX. A. spicula. B. palea externa. C. ligula.

In memoribus. — In monte Gemmi in Helvetia: BROWN, in Germania meridionali et media in insulis fluminis Isar, in Salisburgo, Carniolia, agro Tergestino. Jun. Jul. **24.**

146. Calamagrostis montana Host: panicula rigidula patente, glumis acutis, pilis glumellas aequantibus, arista glumellam superantibus. RCHB. *Fl. germ.* 26. 145. Koch syn. 906. *Arundo montana* GAUD. *Agrostogr. Clarionis* LOISEL. *gall. Deyeuxia montana* POIR. *Arundo varia* SCHRAD. *Deyeuxia varia* KUNTH 242. 25.

Stricta uni—bipedalis et ultra, glumae stramineae violaceonervosae.

Icon. tab. LXXX. E. F. flos magis auctus, cui adstat cireuitus aristae. G. ligula.

Ad montes declivos, inter frutices in graminosis locis in solo calcareo et gypsoso ad colles usque ad alpes medias in meridie, in regione media Hercyniam usque. Jul. Aug. **24.**

bb. *Calamagrostis* P. B. spicula sine rudimento flosculi secundi.

141. Calamagrostis tenella Lk.: panicula patente, glumis lanceolato-acutis, pilis vix dimidiis glumellas aequantibus, arista recta aut nulla. RCHB. *Fl. germ. exc.* 26. 140. KUNTH 238. 11. Koch II. 906. *Arundo tenella* SCHRAD. *Agrostis pilosa* SCHLEICH. *Calamagrostis alpina* Host. *Agrostis spuria* R. S.¹

β. *aristata* glumella aristata: C. *tenella* Host. *Arundo humilis* R. S.

Icon. tab. LXXVIII. A. spicula. B. flos. C. apex paleae externae.

Habitu refert Agrostidem vulgarem, spithamaea — pedalis gracilis, spiculae viridi-violascentes.

In pratis alpinis in Helvetia, Tirolis, Salisburgo et Austria minime vulgaris. Jul. Aug. **24.**

147—149. Calamagrostis Pseudophragmites (SCHRAD.) LK.: panicula oblonga patente, glumis acuminatis, pilis glumellas excedentibus, arista recta paulo infra medium dorsi emergente subexserta. RCHB. *Fl. germ. exc.* 26. 146. *Arundo pseudophragmites* SCHRAD. *A. Halleriana* GAUD. *Calam. Halleriana* DEC. *C. varia* HOST. *C. Clarionis* LOIS.

147. planta typica.

Icon. tab. LXXXI. spicula, flos, pistillum et folium cum ligula.

148. Calamagrostis pulchella SAUTER. RCHB. *Fl. germ. exc.* 26. 147. arista pilisque solito brevioribus.

Icon. tab. LXXXI. spicula, cum glumellae externae apice et folio cum ligula.

149. Calamagrostis nutans SAUTER. RCHB. *Fl. germ. exc.* 26. 148. arista et pilis praecedentis, panicula conferta laxa nutante.

Icon. tab. LXXXI. cum spicula, flore, ligula.

In pratis silvaticis silvarum marginibus locisque arboribus privatis et in montium declivis per alpium tractum, Hereyniam, Silesiam et metalliferos Saxoniae et Bohemiae montes nec non in Holsatia. Jul. Aug. 24.

b. Arista terminalis: *Calamagrostides* verae absque rudimento flosculi secundi.

150. Calamagrostis Gaudiniana RCHB. paniculae tenellae ramis erectis, glumis attenuato-acuminatis, arista brevissima laevi, pilis glumellas subexcedentibus. RCHB. *Fl. germ. exc.* 27. 150.

Gracillima specierum et mollis tenera, compressibilis, ligula suprema duplo longior et angustior, panicula longissima angustissima pallens, glumae angustiores longiores, arista illa sequentis brevior laevis. l. c.

Icon. tab. LXXXII. A. spicula. B. flos.

In paludibus, silvis. Jul. Aug. 24. Helvetia pr. Lausanne „au bois de Sauvabelin“ a CHARPENTIER. marais de Roche Cant. Vaud.: THOMAS. in Saxonia Viehleite bei Pirna: HÜBENER.

151. Calamagrostis lanceolata ROTU.: panicula laxa patente, glumis lanceolatis, arista brevi scabra, pilis glumellas excedentibus. RCHB. *Fl. germ. exc.* 27. 151. KUNTH 236. 1. Kocz II. 905. *Arundo Calamagrostis* LINN. *Calamagr. ramosa* HOST. *Arundo Leersii* OETT. *A. canescens* WIGGERS.

Gracilis et speciosa, minus laxa 4—5-pedalis, spiculae viridi-violascentes.

Icon. tab. LXXXII. C. spicula. D. flos.

In paludibus, fossis passim, in meridionali regione rarior. Jul. Aug. 24.

152. 153. Calamagrostis littorea DEC.: panicula oblonga patente, glumis oblongis acuminatis, pilis glumellas excedentibus, arista recta glumella vix brevior. RCHB. *Fl. germ.* 27. 152. KUNTH 237. 2. KOCH 905. 2. *Arundo littorea* SCHRAD. *pseudophragmites* HALL. f. *annulata* R. S.

153. C. laxa HOST: panicula ampla effusa, gluma exterior arista brevior.

Bi—quadripedalis habitu *C. lanceolatae* et *Epigeio* intermedia, huic magis accedens, glumae viridi-badiae.

Icon. tab. LXXXIII. A. spicula. B. flos. C. apex glumellae.

Ad fluviorum ripas, silvarum oras et sepes. Jul. Aug. 24. Inprimis in meridionali et media regione, in Hercynia ad ripas torrentis Bode et in Saxonia ad fluv. Mulde pr. Nerebau.

- 154. Calamagrostis Epigeios** Rtt.: panicula oblonga lobata, rigidula patula, glumis subulatis, glumella inferiore bicuspidata ex aut sub incisura aristata, pilis glumellulas superantibus. Rchb Fl. germ. 27. 156. KUNTH 237 6. Koch 905. 3. *A. Calamagrostis* M. B. *intermedia* Gm.

Quadri—quinquepedalis rigens, folia convoluta, glumae caesio-violascentes.

Icon. tab. LXXXIV. E. spicula. F. flos.

Ad silvarum oras, vias, ripas et inter frutices in arenosis. Jul. Aug. 24.

Hinc proxime accedunt binae sequentes:

- 155. Calamagrostis glauca** M. B.: panicula oblonga, gluma exteriori acuminato-bifida e fissura aristata, arista glumellam excedente, pilis eadem brevioribus paucis. Rchb. Fl. germ. exc. 27. 155. — Non cum *C. littorea* jungenda. —

Tri—quadripedalis glauca, vaginae saepe pubescentes, glumae maxime inaequales, viridulae raro violascentes.

Icon. tab. LXXXIV. C. spicula. D. flos. — folium cum ligula.

Ad ripas Albis et in valle Mordgrund pr. Dresden, pr. Manheim in silva Neckeraviensi. Jul. Aug. 24.

- 156. Calamagrostis Hübneriana** Rchb.: panicula oblonga ramis erectis multifloris, glumis brevibus, extima obtuse bilobata e fissura aristata, arista abbreviata, pilis numerosis glumas excedentibus. Rchb. Fl. germ. 27. 154. KUNTH 237. 3.

Tri—quadripedalis, gracilis, foliis angustioribus, glumis minus inaequalibus, pilis longioribus quotannis distincta forma.

Icon. tab. LXXXIV. A. spicula. B. flos, adstat folium cum ligula.

Habitat in nemorosis Zschachwitz prope Dresden. Jul. Aug. 24.

Psamma P. B. Panicula thyrsideo-contracta, spiculae cum floris secundi rudimento: pedicello apice barbato. Glumae membranaceae obtusae, inferior minor uninervis, superior trinervis, glumella inferior mucronata. — *Habitus rigidus vaginatus.*

- 157. Psamma arenaria** R. S. thyrsus cylindrico, glumis lineari-lanceolatis acutis, pilorum fasciculis tribus glumellis pluries brevioribus. *Arundo arenaria* L. *Ammophila arenaria* Lk. Rchb. Fl. germ. exc. 28. 157. *Ammoph. arundinacea* Host. KUNTH 245. 1.

Bi—tripedalis, glumis viridi-pallentibus nitidis, foliis involutis, radice repente.

Icon. tab. LXXXV. A. spicula. B. floris glumellae. C. apex paleae externae.

In arena mobili ad oras maris septentrionalis et Venetiis, nec non in medio continente pr. Spandau, Rietschner Heide et Daubitz in Lusatia superiori, Breskow in inferiori, ad arcem Friederikenburg et Gribow in principatu Anhalt, pr. Wittenberg, Dresdam, Darmstadt. Jun. Jul. 24.

- 158. Psamma baltica** R. S.: panicula conferta sublobata, glumis lanceolatis subulato-mucronatis, pilis glumellas semilongis. *Arundo baltica* FLÜGGE. *Ammophila baltica* Lk. Rchb. Fl. germ. exc. 28. 158. KUNTH 246. 2. *Psamma baltica* R. S. Koch 907. 2.

Bi—tripedalis, spiculae fusculae, folia involuta. Mucro glumarum longitudine variat.

Icon. tab. LXXXV. E. spicula. F. G. apex paleae externae.

In maris baltici litore arenoso continentem vix intrans. Jun. Jul. 24.

Milium LINN. Panicula patente. Gluma bivalvis, utraque valva convexa subcompressa flosculum subexcedens. Glumellae valvulae demum induratae. Sepala lanceolata extrorsum bifida. Stigm. plumoso-aspergilliformia. Caryopsis glumellis corticata.

159. Milium effusum L.: perenne, culmo vaginisque glabris, foliis latelinearibus planis, panicula divaricata. RICH. *Fl. germ.* 28. 159. KUNTH 66. 1. KOCH 907. 1. *M. confertum* MILL.? non GUSS.

Bi—quadripedale speciosum, laete virens. Apices foliorum contracti.

Icon. tab. LXXXVI. A. spicula. B. gluma postice visa. C. glumella inferior. D. superior extus. E. eadem intus visa. F. pistillum cum sepalis et staminibus. G. H. fructus. I. idem transectus. K. caryopsis denudata cum sepalis. L. eadem cum umbilico.

In nemoribus. Maio—Junio. 24.

160. Milium vernale M. B.: annuum, culmo vaginisque glabris, his scabris, panicula confertim patula ampla, pedicellis subpilosis. KUNTH 66. 2.

Icon. tab. LXXXVII. cum spicula.

Habitat in humidis arenosis locis in Flora Tauro-caucasica, comparanda! — Apr. Mai. ☉.

161. Milium scabrum MERLET. R. S.: annuum culmo vaginisque scabris, panicula contracta. Pro *M. conferto* MILL. RICH. *Fl. germ. exc.* 28. 160. *M. effusum* β. KUNTH 66. 1. β. Spithameum, tenerum, laete virens.

Icon. tab. LXXXVII. cum spicula.

Ad littora septentrionalis maris pr. Overseen, Katwyk in Hollandia. Mai. ☉.

Piptatherum P. B. Spiculae uniflorae, glumella inferior apice aristata, arista basi articulata decidua.

162. Piptatherum multiflorum P. B.: panicula patente multiflora, spiculis tertiusculis, gluma exteriori quinquenervi, glumellis glabris. RICH. *Fl. germ. exc.* 28. 161. KUNTH 177. 3. KOCH 908. 2. *Agrostis miliacea*. LINN. *Milium multiflorum* CAV. *frutescens* SIEB. *Urachne parviflora* TRIN.

Gracile pedale—sesquipedale, panicula parviflora multiflora.

Icon. tab. LXXXVII. cum spicula.

In pratis silvaticis inter frutices. Jun. Jul. 24. In Tirol meridionali, Istria, Lossino, in Dalmatia, Hungaria.

163. Piptatherum paradoxum P. B.: paniculae amplae ramis sub et post anthesin laxè patentibus elongatis apice floribundis glumella utraque trinervi subpuberula. Pedale—bipedale, spiculae minus numerosae sed magnae viridulae. RICH. *Fl. germ.* 28. 162. KUNTH 177. KOCH 908. *Milium paradoxum* LINN. *Urachne virescens* TRIN.

Icon. tab. LXXXVIII. spicula sub anthesi. B. gluma infera. C. glumellae et genitalia. D. glumella inferior extus visa. E. sepal. F. flosculus demum glumella infera. G. pistillum. H. flos fructifer. I. K. fructus postice visus. M. caryopsis denudata et N. eadem postice visa.

In silvaticis fruticetis. Maio—Jun. 24. In Istria: Brioni pr. Pola, Idria, Gottschee, Kolida, in Croatia, Hungaria, in Bannatu.

Stipa LINN. Gluma bivalvis uniflora acuta aut altera valva aristata. Glumella bivalvis, valvula exterior convoluta arista articulata tortili persistente terminata. Sepala tria. Caryopsis glumâ aristatâ corticata.

- 161. *Stipa Aristella* LINN.:** panicula tenui elongata exserta conferta, arista recta glabra glumellas puberulas duplum longa. *RECH. Fl. germ. exc.* 28. 163. *KUNTH* 180. 10. *KOCH* II. 908. 3.

Pedalis—bipedalis tenuis rigidula, folia angustissima, spiculae fusculae.

Icon. tab. LXXXIX. cum gluma flore soluta.

In saxosis ad rupes, inprimis in calcareis. Mai. Jun. **24.** In Dalmatia, Istria, Croatia, Fiume, Liguria.

- 165. *Stipa pennata* LINN.:** panicula vaginata, arista longissima geniculata, basi torta medio glabra, e medio ad apicem usque plumosa. *RECH. Fl. germ. exc.* 28. 165. *KUNTH* 179. 1. *KOCH* II. 908. 1.

Rigidula pedalis—bipedalis, insigne demum declivorum decus, ventis motu eleganter fluctuans.

Icon. tab. LXXXIX. Granum cum arista.

In rupibus calcareis et gypsaceis, ad vias, in ruderalis. Mai. Jun. Rarior in septentrionali regione.

- 166. *Stipa capillata* LINN.:** panicula vaginata, arista geniculata longissima nuda e medio tortuoso-flexuosa. *RECH. Fl. germ.* 28. 164. *KUNTH* 180. 6. *KOCH* II. 908. 2.

Pedalis—bipedalis, aristae longae filiformes tortuoso-intricatae.

Icon. tab. LXXXIX.

Ad colles saxosos calcareos, ad vias. Jun. Jul. **24.** Passim per singulas regiones rarius in septentrionalibus.

***Lasiagrostis* LINK.** Panicula patens. Gluma bivalvis-valvae acutae heterogeneae, inferior magna puberula. Glumellae valvula exterior longe pilosa, arista apicali continua geniculata. Antherarum loculi apice stellato-barbati. Sepala tria. Stigmata plumosa.

- 167. *Lasiagrostis Calamagrostis* LK.:** arista glumellam subtriplum longa supra geniculum recta. *RECH. Fl. germ.* 29. 166. *KUNTH* 178. 1. *KOCH* II. 909. 1. *Agrostis Calamagrostis* L. *WILLD. stipata* KOEL. *Arundo Halleri* W. prodr. *A. speciosa* SCHRAD. *Calamagr. argentea* DEC. *speciosa* HOST. *conspicua* BERGERET. *Stipa Calamagrostis* WAHLNB. — Num *L. variegata* MEYER. eadem ac. *L. spendens* *KUNTH* 178. 2? —

Gramen speciosum bi—tripedale, panicula argenteo-nitidula effusa.

Icon. tab. LXXXIX. adstat spicula, palca externa, apex antherae bibarbatae et folium.

Ad torrentium ripas in alpinis et in rupibus declivibus elatioribus. Jun. Jul. **24.**

***Gaudinia* P. B.** Spica articulata e spiculis composita. Spiculae ex incisuris axis ortae transversae deplanatae 4—7-florae, flosculo terminali rudimentario. Glumae valvae inaequales. Glumellae valvula inferior sub apice aristata arista subgeniculata.

- 168. *Gaudinia fragilis* P. B.:** spiculis solitariis glabris. *RECH. Fl. germ. exc.* 19. 88. *KOCH* II. 950. 1. *Avena fragilis* LINN. *KUNTH* 303. 26.

Gramen adscendens, humile, ramosum, pubescens.

Icon. tab. XC. spicula, particula axis, flos e mediis cum parte axis spiculae, articulus huius axis et idem transsectus.

In locis declivibus siccis, ad vias et prata. Mai. Jun. **24.** In Helvetia im Canton Waadt pr. Middel, Nenv, Peterlingen, Genf ante portam de Cornavins, in insula Sansego in Istria.

Lagurus LINN. Thyrsus densus. Spiculae uniflorae cum pedicello flosculi secundi. Glumae valvae subulato-aristatae. Glumellae valvula inferior biaristata, arista tertia dorsali geniculata.

169. Lagurus ovatus LINN. Sola species: spithamaca pedalis, in solo arenoso prostrata vel adscendens alibi et ubi densa erescit erecta, semper mollissima pubescens thyrsu ex albido virente. RICH. *Fl. germ. exc.* 24. 128. KUNTH 295. 1. KOCH II. 904. 1.

Icon. tab. XCI. A. spicula integra.

In meridionali et occidentali regione ad maris litus, in olivetis ad vias et in locis incultis ad rudera. Mai. Jun. ☉.

Polypogon DESF. Thyrsus lobatus. Gluma bivalvis uniflora, valvae subaequales ex apicis obtusi emarginatura setaceo-aristatae. Glumellae valvula inferior plerumque aristata. Styli a basi stigmatico-plumosi.

170. Polypogon monspeliensis DESF.: panicula oblonga, glumis late ovalibus. glumellis villosociliatis obtuse bilobis arista brevioribus. *Alopecurus paniceus* LINN. spec. *aristatus* HUDS. *paniceus* LINN. sp. *Cynosurus paniceus* LINN. sp. ed. 1. *Agrostis panicea* WILLD. sp. *triaristata* KNAPP. *alopecuroides* LAM. *crinita* MNCH. *Phalaris cristata* FORSK. *Phleum crinitum* SCHREB. *monspeliense* KOEL. *Polypogon paniceum* LAG. *crinitum* NUTT. *Santia plumosa* SAVI. — Var. minor capensis seta flosculi exigua et culmo repente distinguitur.

Gramen spithamacum—pedale, panicula virente.

Icon. tab. XCI. B. spicula. C. flosculus. D. genitalia.

In littorali meridionali ad vias in arena, in olivetis. Etiam in Helvetia pr. Fribourg: „aux rhames“ cum Lepidio procumbente et latifolio in rupe arenosa forte quasi spontaneus: RAPIER et LAGGER. Junii—Aug. ☉.

171 et 171b. Polypogon maritimus WILLD.: panicula condensata, glumis dense pubescentibus obtuse bilobis arista triplo brevioribus, glumella exteriore truncata quadridentata mutica. KUNTH 233. 2. — In Fig. nostra 171b. legendum est: *maritimus* W.

Praecedente minor et gracilior, thyrsus fere Alopecuri subcylindricus.

Icon. tab. XCI. ad dextram. B. valvae fimbriatae aristatae. C. glumella. D. flos. Tab. XCII. ad dextram (falso subscriptus b. *littoralis*) flos separatus et caryopsis.

Ad meridionale litus maris. Mai. Jun. ☉. Pr. Nicaeam: KUNZE. Marinjo pr. Sebenico, Trau: DE VISIANI.

172. Polypogon littoralis SMITH.: panicula lobato-condensata, glumis lanceolato attenuatis pubescentibus carina setosis aristam subaequantibus, glumellis sub apice aristatis. KUNTH 233. KOCH II. 901. 2.

Saturatius virens ac *P. monspeliensis*.

Icon. tab. XCII. ad sinistram cum ramis et apex foliis.

In insula Norderney in solo lutoso: MERTENS. Nuper non repertus teste BAEKELER. Jul. Aug. 24.

Koeleria PERS. Thyrsus lobatus. Spiculae bi—subtriflorae distichae; flores hermaphroditi. Glumae valvae compresso-carinatae. Glumellae valvula inferior aristata. Styli jam supra basin plumoso-stigmatici subdivaricalem exserti. — *Cespitosae, culmi simplices erecti, folia plana.*

- 173. Koeleria villosa** PERS.: thyrsobulbo cylindrico, spiculis bifloris, gluma carina longiciliata submutica, glumella exterior e crena mucronulata. KUNTH 382. 11.
Humilis vix spithamea mollis.

Icon. tab. XCIII. cum spicula.

In arena ad mare prope Niceam: a CHARPENTIER, KUNZE. ☉.

- 174. Koeleria cristata** PERS.: thyrsobulbo lobato, spiculis 2—4-floris, glumis acuminatis, foliis planis ciliatis, vaginis emarceidis indivisis. RCHB. Fl. germ. 49. 329. KUNTH 381. 1. KOCH II. 912. 1. *Poa cristata* L. syst. MURR. *Aira cristata* L. sp. *Dactylis cristata* M. B. *Festuca cristata* VILL. *Airochloa cristata* LK.

Spithamea—bipedalis, thyrsobulbus magis vel minus distincte lobato, spiculae in formis maris violascentes in pinguioribus e viridi albae nitidulae.

Icon. tab. XCIII. cum spicula et flos.

In siccioribus arenosis pascuis collibus, ad agrorum versuras, pinguioribus formae inter fruticosa, ad prata. Jun. Jul. 24.

- 175. Koeleria valesiaca** GAUD.: thyrsobulbo continuo dense conferto, spiculis 2—3-floris, foliis radicalibus convolutis glaberrimis, vaginis emarceidis fibroso-solutis. RCHB. Fl. germ. exc. 49. 330. KUNTH 382. 7. KOCH 913. 3. *Aira valesiaca* ALL.

Spithamea—pedalis, dense caespitosa rigens, folia radicalia fere setacea.

Icon. tab. XCIII. cum spicula.

Ad colles apricos in valle Valesiae mediae, in pago Neuenburgensi pr. Cressier: SHUTTLEWORTH, Creux du Van: GODET. Neuenburg: RAPIN, infra M. Cenisium: HUGENIN. Jun. 24.

- 176 et 175b. Koeleria glauca** DEC.: thyrsobulbo basi interrupto, foliis planis, margine glabris, vaginis emarceidis indivisis. RCHB. Fl. germ. exc. 49. 331. KUNTH 381. 2. KOCH II. 912. 2.

Pedalis et ultra, glauca, pinguior bipedalis thyrsobulbo paniculato: *Aira dactyloides* et *Koeleria pyramidalis* ROCHET i.e. nostra 175b. specimen minus. *Poa pyramidata* LAM.?

Icon. tab. XCIII. cum spicula.

In campis arenosis passim Jun. Jul. 24.

- 177. Koeleria hirsuta** GAUD.: thyrsobulbo oblongo subcylindrico, spiculis 2—3-floris apicem versus villosa-ciliatis, glumella exteriore brevis et recte aristata, foliis linearibus. RCHB. Fl. germ. exc. 49. 332. KUNTH 382. 10. KOCH 913. 4.

Dense caespitosa, spithamea, culmo superne pubescente, spiculis viridi-violaceis.

Icon. tab. XCIII. cum spicula.

In pascuis sterilibus alpium summorum primaeavorum in Valesia superiori: Furca, Rhonegletscher, Merzenlech im Zelnten Goms, Kitzhorn, in Ober-Engadin, Graubünden, Vellin, in Monte di Pozza in Fassa, pr. Sölden im Oetzthale, Passerthal b. Mötzt hinter St. Leonhard, Ersénik in Carniola: FREIER. — Jul. Aug. 24.

Corynephorus P. B. Panicula. Spiculae biflorae, glumae valvae inaequales, glumellae valvulae subaequales, inferior e basi aristata arista medio geniculato-barbata extorsum clavata. *Habitus rigens et exsiccatus*.

- 178. Corynephorus canescens** P. B.: panicula confertim patente, foliis selaceis. RCHB. Fl. germ. exc. 49. 334. KUNTH 286. 1. KOCH II. 915. 1. *Aira canescens* L. *Avena canescens* WEB.

Græmen spithamaeum glaucum rigens, cespites efformans solitarios dense scoparios.
Panícula ampliore et foliis tantum involutis distinguitur *A. articulata* DESF. meridionalis.

In arenosis regionis septentrionalis et mediae, in meridionali rarius nisi ad littora maris, in Helvetia vix occurrens. Jun. — Aug. ♂.

Aira LINN. Panícula. Spiculæ bifloræ vel cum tertii flosculi rudimento. Glumæ valvæ subæquales. Glumellæ valvæ exterior supra basin aristatâ, arista basi tortilis subgeniculata.

a. *Avenaria* RCHB. 1830: *Fl. germ. exc.* 50. flosculi gemini sessiles, glumella exterior bifida.

179. *Aira præcox* LINN.: panícula tenui conferta, glumis flosculos paulo excedentibus, glumella utraq. infra medium aristata, foliis setaceis. RCHB. *Fl. germ.* 50. 335. KUNTH 289. 1. *Avena præcox* P. BEAUV. KOCH II. 922. 28. *Trisetum præcox* DUMORT. *Aira pusilla* WIGG. *Aira subspicata* RAINVILLE.

Humillima bi—quadripollicaris, pallide virens, panícula straminea.

In arenosis pascuis et ericetis imprimis septentrionalibus, in mediis et meridionalibus passim et vix in Helvetia. Apr. Mai. ☉.

180. *Aira caryophyllæa* LINN.: panícula patenti-divergente, flosculis gluma longè minoribus, arista basi torta geniculata exserta, foliis setaceis. RCHB. *Fl. germ. exc.* 50. 336. KUNTH 289. 2. *Aira inflexa* et *Leersii* Lois. *Avena caryophyllæa* WEB. KOCH II. 922. 25.

Græmen humile tenue laxum palmare rarius demum spithamaeum, pallide virens, culmus cum glumis violascens.

In arenosis pascuis, collibus, rupibus. Mai. Jun. iterum Sept. ☉. In regione meridionali rarior.

181. *Aira capillaris* Host.: panícula capillaripatente, pedunculis spicula multo longioribus, glumella flosculi inferioris subinermi. — Ceterum cum præcedente convenit, sed constat culturâ. RCHB. *Fl. germ.* 50. 337. *Aira elegans* WILLD. GAUD. KUNTH. 289. 3. *Avena capillaris* KOCH II. 922. 26.

Præcedente tenuior et sæpe altior, culmo glumisq. e viridi rubellis, folia setacea.

In pascuis arenosis locis declivibus siccis ad vias et versuras. Mai. Jun. ☉. In Istria, Croatia, Dalmatia et in Liguria et iam pr. Ivrea in Pedemontio: G. RCHB.

b. *Avenaria* RCHB. l. c. flosculi gemini pedicellati, arista geniculata.

182. *Aira flexuosa* LINN.: panícula patente cernua, glumis flosculos æquantibus, glumellis quadridentatis supra basin aristatis, flosculi alterius pedicello pluries ipso brevior, foliis setaceis ligula truncata. RCHB. *Fl. germ.* 50. 339. KUNTH 290. 9. *Avena flexuosa* M. BIEB. KOCH II. 915. 3.

183. Var. *A. discolor* THUILL. procerior, glumis sexdentatis arista firmiore, glumis e viridi fuscis, ligula acuminata.

Græmen cespites separatos tenuissimifolios efformans gracillimum, venti motui continuo subjectum, spiculis violascentibus.

Gregarie et abunde in arenosis, ericetis et silvis acerosis, in declivis, collibus rupibusq. Jun. — Aug.

2. *A. discolor* in „Nordbrabant“ ulterius observanda.

184. *Aira uliginosa* WEHBE: panícula patente erecta, flosculis exsertis, glumella exteriore supra basin aristata, flosculi secundi pedicello ipsius dimidium æquante, foliis an-

gustissime linearibus planiusculis, ligula acuminata. RCHB. *pl. crit. ic.* 280. *Fl. germ.* 338. KOCH II. 915. 4. *A. paludosa* WEIHE Deutchl. Gräser.

Præcedente tenuior, spiculis minoribus et foliis planiusculis facile distinguenda.

In turfosis inundatis. Aug. Sept. In regno Hanoverano pr. Hunteburg, Gronau, Bentheim, Rhede, Bocholt pr. Münster; Ostfriesland.

c. *Deschampsia* P. B.: flosculi pedicellati, arista basi non tortili rectiuscula.

185—189. *Aira cespitosa* LINN.: panicula divergenti-effusa laxa, pedunculis scabris, arista glumellam vix superante, foliis planis supra scabris, radice dense cespitosa. RCHB. *Fl. germ. exc.* 50. 340. KOCH II. 914. 1. *Deschampsia cespitosa* P. B. KUNTH 286. 1. *Campella cespitosa* LK.

185. planta **genuina** normalis.

186. var. **montana** humilior conferta, saturatius colorata.

187. var. **ochroleuca**, planta umbrosa spiculis stramineis. Passim et in pratis.

188. var. **alpina vivipara**.

189. var. **parviflora** THUILL. spiculis pallidis.

Cespites magni sed segregati, laete virides, culmus procerus bi—quadripedalis, panicula ampla speciosa, passim cernua.

In pratis nigrinis et humidis locis, imprimis ad rivulos et fossas aqua fluente replatas nec non ad lacus et stagna imprimis in silvaticis. Jun. Jul. 24.

189b. *Aira Wibetiana* SONDER: panicula conferta oblonga, ramis erectis, pedunculis scabris, arista vix exserta, radice stolonifera. KOCH II. 915. 2. *A. paludosa* WIBEL nec ROTH, quae planta Scheuchzeriana dubia, forte *A. cespitosae* varietas. Kocmo videtur.

Bipedalis, panicula pyramidata, spiculis flavo-virentibus, habitu *A. bottnicae* WAHLNB.

Pr. Altona ad Cöllmbanner et in insula Poggersand ad Albim ante Glücksstadt: NOLTE. Hamburgi:

SONDER.

Iconem in supplemento dabimus.

Holcus LINN. Panicula. Spiculae biflorae, flos inferior hermaphroditus inermis, superior masculus aristatus. Stylus brevissimus, stigmata plumosa.

190. *Holcus lanatus* LINN.: arista uncinata, flosculis cum arista inclusis, vaginis mollioribus pubescentibus. RCHB. *Fl. germ. exc.* 53. 367. KUNTH 34. 1. KOCH 916. 1. *Avena lanata* KOEL.

Pedalis—bipedalis et ultra, habitus laxus et mollis, panicula thyrsoides nonnisi sub anthesi patens albida violascens.

In pratis, nemoribus. Jun. Aug. 24.

191. *Holcus mollis* LINN.: arista geniculata extrorsum recta exserta, vaginis puberulis. RCHB. *Fl. germ. exc.* 53. 367. KUNTH 35. 2. KOCH II. 916. 2. *Avena mollis* KOEL.

Gramen pedale—bipedale et ultra praecedente gracilius et distincte repens, vaginae arctiores et minus molles, glumae longiores et angustiores, utraque inermis, stramineae.

In arenosis silvaticis, in declivibus inter fruticeta imprimis ad margines aquarum fluentium. Jul. Aug. 24.

Arrhenatherum P. B. Panicula. Spiculae bi—triflorae, flore infero masculo arista geniculata, supero breve pedicellato rarius aristato, intermedio rudimentario ad pedicellum reducto vel nullo.

- 192. 193. Arrhenatherum avenaceum** P. B.: foliis planis. RCHB. *Fl. germ. exc.* 53. 363. KUNTH 307. 1. *Holcus avenaceus* SCOP. *Avena elatior* L. *Arrh. elatius* MERT. et KOCH II. 916. 1. et syn.

Gramen gracile bi—quadripedale et ultra, spiculae e viridi albidae in solo sicciori violascentes. Datur var.:

- 193. β . nodosum:** nodis calmi infimis tuberosis et tuberiferis, geniculis superioribus pubescentibus, spiculis non raro viviparis: *Holcus bulbosus* SCHRAD. *Avena preclatoria* THUILL. *bulbosa* W.

In pratis ad agrorum versuras et margines nemorum nec non inter fruticeta, ad sepes. Jun. Aug. 24.

Avena LINN. Panicula, spiculae pedunculatae bi—multiflorae. Glumae valva inferior maior. Glumella inferior bifida dorso aristata, arista basi tortili geniculata.

n. Ventenata KOEL.: annuae, glumella exterior setaceo-bicuspidata.

- 194. Avena neglecta** SAVI: panicula thyrsosideo-cylindrica lobata densiflora, spiculis subtrifloris, flosculis exsertis, glumellae exterae bisetae arista vix tortili, foliis vaginisque puberulis, radice fibrosa. RCHB. *Fl. germ.* 341. h. add. 140⁵. *panicea* LAM. *Trisetum neglectum* R. S. KUNTH 296. 10.

Humilis adscendens, panicula e viridi stramineo pallente.

Ad vias in littorali. Jul. ☉. In Pedemontio et Novara teste BALBIS.

- 195. Avena pygmaea** (Arundo — SPR. POLLINI): panicula condensata ovali, spiculis bifloris, callo breve-rachi longius pilosa, setis glumam suam subaequantibus cum arista longiore exsertis. *Arundo pygmaea* SPR. POLLIN. *Fl. veron.* *Avena Loefflingiana* CAV. RCHB. *Fl. germ. exc.* 50. 341. non LINN. *Trisetum Cavanillesii* TRIN. KUNTH 297. 13.

Gramen pusillum, lacte virens nitidulum.

In soli sterilis locis apricis. April. Mai. ☉. In valle Aosta, pr. Ville Franche GAY. in Valsesia media in Monte d'Orge et pr. St. Leonhard: a CHARPENTIER.

- 196. Avena myriantha** BERTOL.: panicula elongata multiramea, densiflora, spiculis bifloris, glumae flosculis longioris valvis subaequalibus, arista e medio dorso glumellae ea dimidio brevioris. BERTOL. *Fl. ital.* 1.

Pedalis, habitu referens *Aperam interruptam*, panicula totumque gramen lacte virens glabrum, illa demum pallens.

In agris pr. Mediolanum detexit BALSAMO-CRIVELLI et de NOTARIS, miserunt KUNZE, GORSKI et BONJEAN.

- 197. Avena tenuis** MICH.: panicula laxissime divergente, ramulis versus apicem spiculiferis, spiculis bi—trifloris, flosculis apice exsertis inferiore mutico, superioris arista dorsali valde torta et geniculata. RCHB. *Fl. germ. exc.* 51. 342. KOCH II. 920. 18. *Avena fertilis* ALL. auct. *dubia* LEERS. *triaristata* VILL. *Ventenata bromoides* et *avenacea* KOEL. *Bromus triflorus* POLL. *Holcus biaristatus* WEBER. *Avena striata* LAM. *Trisetum striatum* PERS. *tenuis* R. S. — KUNTH 298. 21.

Gramen gracillimum pedale—sesquipedale, spiculis maiusculis stramineis.

In collibus siccis. Jun. Jul. ☉. In Palatinatu rhenano in regione fluminis Nahe. Mosel, Main, pr. Göttingen, Zerbst, Jena, Eisleben. in Austria inferiore. Moravia, Bannatu. in ditioe veronensi et pr. Mondovi in Pedemontio.

b. *Trisetum* (cum praeced.) PERS.: glumella externa biseta. spiculae porrectae. radix perennis.

- 198. *Avena argentea* WILLD.** EN.: panicula laxa patente, spiculis subtrifloris, floribus exsertis, axi piloso pilis ad tertiam partem glumellas aequantibus, glumella exteriori supra medium aristata, foliis tenuibus. RCHB. *Fl. germ. exc.* 51. 344. KOCH II. 921. 22. *Avena distichophylla* Host. *sesquitertia* WILLD. sp. *disticha* LAM. *Trisetum argenteum* R. S. KUNTH 298. 18.

Adscendens culmo basi ramoso foliisque tenuibus a sequente facile distinguenda, folia nempe plana et angustissime linearia, laxè disticha, glumae virentes. glumellae violaceo-fasciatae. Specimina quaedam in valle ad flumen Isonzo lecta. spiculis tam numerosis quam in *A. distichophylla* non vidi.

In saxosis alpium summorum. Monte Generoso. Tirolis. Carnioia. Styria. Carinthia. Jul. Aug. 24.

- 199. *Avena distichophylla* VILL.**: panicula densa, spiculis subtrifloris, floribus exsertis, axi piloso pilis flores subaequantibus, gluma exteriori supra medium fortiter aristata. RCHB. *Fl. germ.* 51. 343. *A. brevifolia* Host. SCHRAD. *Trisetum distichophyllum* P. B. KUNTH 298. 19.

Adscendens. culmo basi ramoso foliisque rigentibus. folia nempe latiora in apicem attenuata, disticha, glumae fusculae aut violascentes, glumellae fusculae violaceo-fasciatae, panicula arctior et spiculae maiores ac in praecedente.

In saxosis alpium summorum ad rupes. Jul.—Sept. 24. In Helvetia et Pedemontio nec non per austriacos Alpes.

- 200. *Avena subspicata* CLAIRV.**: panicula cylindrico-thyrsoidea, spiculis bi—trifloris, axi breve-piloso. KOCH II. 921. 23. *Trisetum subspicatum* P. B. KUNTH 295. 2. *Koeleria subspicata* RCHB. *Fl. germ.* 49. 333. *aristata* LOIS. *Aira subspicata* LINN. *Avena airoides* KOEL.

Habitus fere *Koeleriae* quacum pari jure jungeretur quali *Calamagrostes* geniculato-aristatae reliquis jungi posse in *Fl. germ.* elaboranda putavi. Culmus superne pubescens, glumae fusculae violaceo-fasciatae.

In summis alpium pascuis. ad rupes. Jul.—Spt. 24. Per alpium tractum.

- 201. *Avena alpestris* Host:** panicula patente. ramulis inferioribus a basi multispiculatis, spiculis bi—quadrifloris exsertis, axi brevissime pilosa, gluma superiore lanceolata jam e medio acuminata, arista tortuoso-tortili, ovario apice puberulo. RCHB. *Fl. germ.* 51. 347. KUNTH 299. 1. KOCH II. 921. 20. *sesquitertia* Host syn. *Trisetum alpestre* P. B.

Humilis et tenera spithamea et ultra fere referens *A. flavescentem*.

In alpibus in Austria. Styria. Tirol. Jul.—Spt. 24.

- 202. *Avena villosa* BERTOL.**: panicula oblonga subnutante, ramulis arrectis, spiculis bifloris, floribus vix exsertis, pedicello piloso, axi jubato, glumis medio et sub medio aristatis. KUNTH 305. 38. *Trisetum villosum* SCHULT. mant.

Sexpollicaris—spithamea, radix repens, culmus et folia cum vaginis glabra, glumae stramineae nitidulae.

Ex Appenninis misit Orsini. num intra fines distributa sit explorandum erit. Jul. 24.

203. *Avena longifolia* THORE.: foliis angustis involutis rigidis longissimis, inferioribus vaginis nodisque pubescentibus, panícula erecta subcontracta, spiculis bifloris, floribus glumam aequantibus inferiore aristato superiore mutico, axi piloso, glumae valvis inaequalibus acuminatis, glumella externa pilosella integra. *A. Thorei* DEC. DUBY *Bol. Gall.* KUNTH 306. 52 propter *Avenam longifoliam* REQ. distinctam.

Gramen insigne rigidum, ligulae foliorum inferiorum subtriangulares acutae serratae, supremi folii bipartita oblique truncata dentata. Glumae pallide virentes et fusculae.

Extra fines inventa in silvaticis montibus apricis pyrenaeorum: Tarbe a CHARPENTIER. Dax: GRATELOUP. Collioure RUGL. Mai. Jun. 24.

204—206. *Avena flavescens* LINN.: panícula aequali oblonga, spiculis trifloris, gluma superiore ovato-lanceolata supra medium acuminata, axi piloso pilis floribus multo brevioribus, glumella inferiori supra medium aristata breve bicuspidata. RCHB. *Fl. germ.* 51. 346. KOCH. II. 921. 19. *Trisetum pratense* PERS. *Trisetum flavescens* P. BEAUV. KUNTH 298. 20.

204. *genuina*, planta normalis.

205. *lutescens*, spiculis lutosus.

206. *variegata*, spiculis minoribus fusco stramineoque variis, forma insignis passim in iisdem cum praecedentibus locis certe montanis occurrens.

Culmi pedales—bipedales graciles laxi, folia supra pubescentia, spiculae e viridi stramineo-pallidae nitidulae.

In pratis, ad colles, inter fruticeta. Mai. Jun. 24.

207. *Avena pratensis* LINN.: panícula subspicata ramulis inferioribus bi—tri-, superioribus bi- vel unispiculatis, spiculis 4—5-floris, gluma superiore trinervi, axi brevissime piloso, ovario apice barbellato. RCHB. *Fl. germ.* 51. 350. KUNTH 300. 9. KOCH 919. 14.

Culmus uni—bipedalis rigidus, folia inferiora involuta, gluma viridula medio violascens.

In pratis siccis, ad montium rupiumque locos declivos. Mai—Jul. 24. Rarius in septentrione. Distinguitur:

207b. *Avena bromoides* LINN.: panícula extrorsum spiciformi, ramulis inferioribus tri—bispiculatis supremis unispiculatis, gluma superiore distincte trinervi, spiculis 6—8-floris. glumella inferiore 5-nervi, nervo quoque serie duplici punctato-scabro, medio fortiter aristato, arista patente, axi brevissime piloso, pilis calli floriferi vix longioribus.

Bipedalis rigida, folia emarcida insigniter tortuosa. In collibus siccis in Liguria. Junio. 24. Genua: A CHARPENTIER. Val de Tenda ante Fontine ad dextram ad rupem cum *Foeniculo piperito* et *Pollinia distachya* et alibi passim G. RCHB. fil. Perpignan RUGL. Mai. Jun. 24.

208. *Avena Scheuchzeri* ALL.: panícula racemosa, spiculis inferioribus solitariis vel binis, glumis oblongo-ovalibus acuminatis, superiore trinervi, spiculis 4—5-floris longe exsertis, axi piloso fasciculis brevissimis, glumellis in medio dorso aristatis, arista basi longissime tortili, ovario apice pubescente. RCHB. *Fl. germ. exc.* 51. 349. *versicolor* VILL. KUNTH 300. 4. KOCH 919. 15. *glauca* LAPEYR.

Uni—bipedalis, spiculae paucae sed magnae, aurato-fusculae violaceo-variae.

In summis pratis alpinis. Jul. Aug. 24. Per alpium tractum, in alpihus littoralibus et Appeninis.

- 209. *Avena lucida* BERT.:** panicula simpliciuscula conferta, spiculis bi- (in nostra tri—quinque-) floris, glumis flores basi barbato dorso aristatos aequantibus, foliis vaginisque glabris, ligulis superioribus acuminatis integerrimis.

Ab *A. pubescente* distinguitur teste BENTOLONE spiculis minoribus folisque angustioribus.

In pratis ad M. Balduni: della Ferrara: DE VISIANI, POLLINI. Specimen pictum e valle Fassae: FACCHINI, glabritie potius ab *A. pubescente* distinctum pluriflorum.

- 210. 211. *Avena planiculmis* SCHRAD.:** panicula contracta oblonga, spiculis inferioribus 3—5, singulis 3—6-floris, floribus in axi brevissime piloso exsertis, gluma superiore distincte trinervi. RCHB. *Fl. germ.* 52. 352. KUNTH 301. 10. KOCH II. 918. 10.

Speciosa, culmo arrecto basi vaginato. foliorum vaginis amplis compresso-aneipitibus, glumis stramineis violaceo-fasciatis apice scariosis subargenteo-nitidulis.

- 210. *compressa* HEUFF.:** humilior et rigidior, folia angustiora, vaginae arctiores et minus compressae, spiculae subsolitariae nec variegatae. Ulterius observanda.

In pratis humidis cristarum editiorum montium et in silvis humidis ad rupes madidas. Jul.—Spt. 24. Glatz am grossen Schneeberge: GRABOWSKY, in montibus in Silesia moravica ad m. Köpernik, Hoekschar: WIMMER, Brünneleheide, Altwater inprimis an der Krautgartenlehne, dem Leiterberge, im Kessel: WIMMER, GRABOWSKY, G. RCHB. fil. In Styria pr. Marburg. — *A. compressa* HEUFF. Werschetz in Bannatu ad vineas: WIERZBICKI, HEUFFEL.

- 212. *Avena alpina* SM.:** panicula pacemosa elongata, rigente, spiculis inferioribus subgeminis, glumis inaequalibus utraque distincte trinervi acuta, spiculis 5—8-floris, floribus longe exsertis, glumella supra medium aristata, arista basi pluries torta, axi piloso, pilis articulorum superioribus callo triplo longioribus, ovario apice piloso; vaginis teretibus, laminis anguste linearibus supra scabris. RCHB. ic. XII. Fig. 1703. *Fl. germ. exc.* add. 352. KUNTH 301. 11. KOCH 918. 13. *A. praeusta* RCHB. *Fl. germ. exc.* 140. add. 5. *planiculmis* Eugl. Bot. 2141. *Trisetum alpinum* R. S. syst. II. 663.

Refert *A. planiculmem* sed vaginae teretes, culmi bi—tripedales, folia linearia angustiora et longiora. Glumae viridi-luteae medio violaceo-fasciatae apice ferrugineo nitidae submetallicae quasi praestuae.

Carniola in Monte Nanas: Dr. WELWITSCH. Zhernaperst: FREIER. Castell Andraz in Tirol meridionali: PAPPERITZ. Jul. Aug. 24.

- 213. *Avena pubescens* LINN.:** panicula aequali laxa, ramulis inferioribus quibusdam subbispiculatis, reliquis nisi singulis unispiculatis, spiculis 2—5-floris, floribus exsertis, gluma superiore trinervosa, axi piloso, pilis ad callos longioribus, ovario piloso. RCHB. *Fl. germ.* 51. 351. KUNTH 300. 5. KOCH 918. 11. *sesquitertia* LINN. mant. *Trisetum pubescens* R. S. *Avena pratensis* GORT. *pratensis* a. LED. *cantabrica* LAG.

Uni—bipedalis et ultra, vaginae inferiores retropubescens, folia latiuscule linearia plana; glumae basi laete virides violascentes, margine apiceque scariosae subargenteo nitidulae. arista violacea.

In pratis, nemoribus, agrorum versuris ad colles. In septentrionali et media regione vulgaris in meridionali rarior. Mai—Jun. 24.

- 214. *Avena sempervirens* VILL.:** panicula laxa nutante, ramis inferioribus bi—sexspiculatis, glumis subaequalibus acuminatis, spiculis tri—quadrifloris vix exsertis, axi piloso, flosculorum uno alterove inferiorum dorso aristato reliquis submuticis, glumella inferiore 5-nervi, ovario piloso. RCHB. *Fl. germ.* 51. 348. KUNTH 301. 12. KOCH 919. 16. *A. sesquitertia* TEN. *fallax* R. S.? *sedenersis* DEC?

Uni—bipedalis, folia anguste linearia supra scabra, involuta, rigida, glumae basi viridulae ante apicem testaceum violaceo-fasciatae.

Ad alpes inter saxa alpium summarum in Bavaria, Tirol. Austria. Carniola et Styria rarior. Jul. Aug. 24.

c. *Arenae genuinae*: annuae, spiculis magnis pendulis.

- 215. *Avena brevis* RTH.**: panicula secunda, spiculis brevibus subbifloris vix exsertis, gluma superiore trinervi, glumellis oblongis bicuspidatis, floris inferioris arista dorsali geniculata firmula, superioris minori vel nulla. axi glabro. RCHB. *Fl. germ.* 52. 354. KUNTH 301. 13. KOCH 916. 1.

Minima et gracillima inter veras Avenas, vix bipedalis, spiculis parvis agnoscenda.

Inter segetes passim et rarior. Jun. Jul. ☉. Hannover, Anhalt, Saxonia boruss. Austria inf. Jun. Jul. ☉.

- 216. *Avena nuda* LINN.**: panicula subaequaliter pyramidalis, spiculis bi—trifloris floribus parum exsertis glabris, gluma superiore 7—9-nervi, glumellis bicuspidatis infra medium nervosis, flore inferiore, passim et medio aristato, axi glabro. RCHB. *Fl. germ.* 52. 355. KUNTH 302. 18. KOCH 917. 6. — Ex *A. sativa* ortum esse LINKIO visum est.

Habitu fere *A. sativae* differt glumis et glumella inferiore herbacea fortiter nervosa. — Varietas KUNTHIO videtur: *A. chinensis*: rachis valde dilatata, flosculis distantibus e calyce pendentibus BESSER.

Passim inter segetes inprimis in Austria. Jun. Jul. ☉.

- 217. *Avena hybrida* PETERM.**: panicula aequali patente, glumis plerumque bifloris flores superantibus, valva superiore 9-nervi, floribus glabris lanceolatis apicem versus angustatis apice bifidis subdenticulatisque omnibus aristatis, axe calloque florum setaceo-hirsutis. RCHB. *Fl. Saxon.* 17. KOCH 917. 2.

Inter segetes in Saxonia prope Lipsiam: Rückmarsdorf et Dölzig: PETERMANN. Schwarzburg-Rudolstadt um Singen: SCHÖNREIT. Tondern in Schleswig. Jul. Aug. ☉.

Hanc ut *A. sativam* et reliquas cultas et quasi spontaneas in supplemento dabimus.

- 217b. *Avena strigosa* SCHREB.**: panicula subsecunda, spiculis subbifloris, glumis flores aequantibus, supera 7—9-nervi, axi glabro, flore superiore basi barbato. RCHB. *Fl. germ.* 52. 356. KUNTH 302. 17. KOCH 917. 5. *nervosa* LAM. *Danthonia strigosa* P. BEAUV. Gracilis bi—quadripedalis.

Inter Avenam sativam. Jul. Aug. ☉.

- 218. *Avena fatua* LINN.**: panicula aequali patente, spiculis subtrifloris, gluma superiore 9-nervi, glumellis subtus ferrugineo-pilosis bidentatis, arista dorsali geniculata, axi piloso. RCHB. *Fl. germ.* 52. 358. KUNTH 302. 21. KOCH 917. 8.

Elata tripedalis et ultra, spiculae magnitudine illarum *A. sativae*.

Inter segetes. Jul. Aug. ☉.

- 219. *Avena sterilis* LINN.**: panicula cernua, spiculis 4—5 floris, glumis subaequalibus supera 9-, infera 7-nervi, flore infero infra ferrugineo-longepiloso, valde aristato, supero glabro inermi. RCHB. *Fl. germ.* 52. 357. KUNTH 303. 23. KOCH 917. 8. *A. macrocarpa* MOENCH.

Spiculis maximis insignis, tripedalis et ultra.

In declivibus locis regionibus meridionalis, in cultis ad litorale. Jun. Jul. ☉.

Danthonia DEC. Panicula subracemosa. Spiculae 2—5-florae. Glumae magnae ventricosae. Glumella cartilaginea, basi penicillata inferior concava bicuspidata, arista intermedia plana basi tortilis geniculata. Ovarium glabrum.

- 220. *Danthonia provincialis*** DEC. (calycina in Tab. nostra): racemi spiculis subquadrifloris, gluma inferiore bicuspidata, foliis ad vaginas barbatis. *D. calycina* RCHB. *Fl. germ. exc.* 52. 362. *D. provincialis* DEC. KUNTH 312. 4. KOCH 923. 1. *Avena calycina* VILL. non LAM. *spicata* β . WILLD. *stricta* HOST. *D. alpina* VEST.

Gracilis pedalis, foliis planis, spiculis Avenae sed arista terminali.

In apricis regionis meridionalis. Mai. Jun. ☉. Carniola ad Kolschnam, pr. Gottschee, Tergesti pr. Contobello, al Boschetto. In Bannatu pr. Orawicza, in Pedemontio in Valle di Lanzo et pr. Tenda.

Psilurus TRIN. Rachis filiformis articulata. Spiculae subsolitariae biflorae exeisuris insertae, flos inferior in tuberculo, superior pedicellatus subabortivus. Gluma univalvis flore longe brevior, glumellae valvula inferior aristata. Styli brevissimi, stigmata plumosa.

- 221. *Psilurus nardoides*** TRIN. Sola species: annua, subcespitosa, spithamea, culmi simplices, foliis filiformibus involutis, spica filiformi elongata inflexa. RCHB. *Fl. germ. exc.* 15. 60. KUNTH 461. 1. KOCH 959. 1. *Nardus aristata* L. *Rottboella monandra* CAV. *Monerma monandra* P. B. *Asprella nardiformis* Host.

In vineis et olivetis, collibus saxosis apricis. Apr.—Jun. ☉. Tergesti: Contobello etc., Fiume, Pola: Fort Marie Louise, Val Bandon, Isola Brioni, Veglia, Catarro etc.

Lepturus R. BR. Rachis subarticulata. Spiculae articulis excavatis immersae uniflorae vel cum alterius floris rudimento aut pedicello. Gluma uni—bivalvis cartilaginea florem occultans. Glumella membranacea. Stam. tria. Styli a basi plumosi.

- 222. *Lepturus incurvatus*** TRIN.: spica filiformi demum incurvata, glumis flosculos tertia parte superantibus. RCHB. *Fl. germ.* 16. 63. exsicc. 505. *Aegilops incurvata* L. *Rottboella incurvata* L. fil. *Agrostis incurvata* Scop. *Ophiurus incurvatus* P. B.

Procumbens, spicae demum incurvato-adscendentes. Spithameus.

In arena litorali. Mai. Jun. ☉. In Holland: Katwijk: RCHB. in insula Zelandia, in Holsatio in insula Amrum et Beneschallig: NOLTE, in argillosis ad mare balticum. Priwall pr. Travewünde: HAECKER. Tergesti, Monfalcone, Capo d'Istria, Venedig, Veglia, Lossin, Osero, Crappano, Lessina, Ragusa, Nizza, Genua.

- 223. *Lepturus filiformis*** TRIN.: spica filiformi subulata subcompressa recta, gluma flores vix superante. RCHB. *Fl. germ. exc.* 16. 61. KUNTH 462. 2. KOCH 958. 2. *Rottboella filiformis* WILLD. *En. erecta* SAV. *incurvata* β DEC. *Lepturus strigosus* DUMORT. *Ophiurus filiformis* R. S.

Adscendens et praecedente tenuior, spica recta et erecta tenuiore extrorsum distinguendus.

In arenosis maritimis. Mai. Jun. ☉. Belgia, Varel, Holsatia, Montefalcone, Istria.

Ophiurus LK. Spica teres articulata. Spiculae uniflorae foveis rachidis immersae solitariae. Gluma univalvis florem obtegens, cartacea acuminata glumellis longior. Glumellae binae membranaceae, inferior 5-, superior 2-nervis. Stam. 3. Stylus brevissimus plumosus.

- 224. *Ophiurus subulatus*** LK.: Sola species, gluma sua solitaria (e duabus intense connata?) egregie generice distincta. Rudimentum alterius floris vix ullum et flos terminalis sterilis bivalvis. RCHB. *Fl. germ. exc.* 16. 62. *Rottboella cylindrica* W. *subulata*

SAVI. *Monerma subulata* P. B. *Lepturus cylindricus* TRINIUS. KOCH 959. 3. *subulatus* KUNTH 462. 3.

Habitat in littorali Tergestino ad salinas pr. Saute. Mai. Jun. ☉.

Pholiurus TRIN. Spica subarticulata continua. Spiculae biflorae articulorum foveis appressae. Glumae geminae rachii contrariae, membranaceae breviores. Sepala lanceolata. Styli a basi plumoso-stigmatici.

225. Pholiurus pannonicus TRIN. Sola species, floribus binis hermaphroditis glumella superiore bifida agnoscenda. RICH. *Fl. germ.* 16. 64. *Leptur.* — KUNTH. 462. 4. *Rothb.* — a Host. *biflora* RTH. *Salina* SPR. *Ophiur.* — us P. B.

Habitus Ophiuri subulati sed altior et robustior.

In humidis salsis. Mai. Jun. ☉. Dalmatia: Trau ANDRICH, CLEMENTI. in Hungaria ad fl. Theiss: SADLER.

Lolium LINN. Rachis excisa. Spiculae sessiles alternatim distichae margine altero rachin spectante, multiflorae. Gluma spicularum inferiorum solitaria, altera certe valva hebetata, supremæ bivalves. Glumella bivalvis, valvula inferior 5-nervis mutica vel sub apice aristata, superior bicarinata apice excisa.

a. annua:

CX. **226—28. Lolium remotum** HOFFM.: spiculis glumam sesquolongis remotis oblongis, glumellis muticis aut mucronatis, culmo glabro, ligula brevi. *L. arvense* in tab. nostra et *Fl. germ. exc.* 16. 65. *exsec.* 102. *L. linicola* SOND. KOCH 957. 5.

Foliorum fasciculi steriles nulli. Gramen gracile tenue.

L. arvense WITT. genuinum esse *Lolii temulentii* formam gracilem docuit cl. SONDER, propterea nomen erat mutandum huius a b. SCHRADERO pro *L. arvensi* in Flora germanica primum enumerati.

In agris inter Linum. Jun.—Ang. ☉.

230. Lolium complanatum SCHRAD.: spiculis gluma patula parum longioribus approximatis ovalibus approximatis complanatis, floribus patentibus muticis, culmo superne scabro, ligula oblonga. RICH. *Fl. germ.* 16. 66. *L. rigidum* GAUD.

Jam habitu multum a praecedente recedit, illius spica elongata gracilis, huius brevis robustula et spiculae floresque ipsi magis patentes. Satione constantissimum et per botanicos plurimos hortos immutatum colitur.

In agris in valle Aosta: GAUDIN, in Belgia indicatum. Jun. Jul. ☉.

229. Lolium robustum RICH.: culmo subventricosso vaginisque scabris, spiculis 5—9-floris sub anthesi glumâ arrectâ brevioribus, floribus ellipsoideis, submuticis, inferioribus condensatis. RICH. *lc. Fl. germ. Gram.* ed. I.

Elatum robustum et rigidum, *L. specioso* M. B. propinquum, sed omnino distinctum culmo vaginisque scabris *L. temulentii*, a quo culmo erasso et glumellis muticis recedit.

In agris in littorali australi, Italia superiore, Tirol meridionali et in Patatinatu. Jun. Jul. ☉.

CXI. **231—33. Lolium temulentum** L.: culmo filiformi-cylindrico vaginisque scabris, spiculis gluma patente brevioribus, glumellis aristatis. RICH. *Fl. germ. exc.* 16. 67. KUNTH 437. 6. KOCH 957. *Bromus temulentus* BRUN. *Craepalia temulenta* SCHUK.

Variat aristarum longitudine, sed etiam si flores omnes mutici videantur, quod nusquam occurrit, quum semper quidam certe sint mucronati, culmo aequali glumisque patentibus nec arrectis a *L. robusto* distingueretur.

Icon. tab. CXI. 231. specimen maerum virgineum, 232. robustius submuticum, 233. et aliud aristatum. A. flos. B. pistillum. C. paleae. D. ramuli stigmatici. e. granum. f. idem transsectum.

In agris inter Hordeum et Avenam inprimis, praeterea inter Linum, Solanum tuberosum et in ruderalis. Jun. Jul. ☉.

L. speciosum STEV. M. B. Fl. Taur. Cauc. I. 80. pro varietate vaginis culmoque laevibus habetur, sed satione certe non mutatur. Huc pertinere videtur vexatum illud *L. arvense* WITH. arr. 168. et Sm. *engl. Fl.* I. 175.

231. Lolium multiflorum LAM.: spiculis eomplanatis glumam patentem sesquilateralis 12—20-floris, floribus dense superimpositis superioribus aristatis, arista reeta glumellas subaequante, (turionibus nullis). RCHB. *Fl. germ.* 16. 68. KUNTH 436. 3.

Habitu fere *L. italicum* exprimit, a quo inprimis radice annua propterea turionum defectu distinguitur.

In Helvetia australi in agris. Jun. Jul. ☉.

b. *perennia*:

CXII. **235—235b. Lolium perenne** L.: spiculis gluma longioribus muticis, turionibus complicato-foliosis. RCHB. *Fl. germ.* 16. 65. KUNTH 436. 1. KOCH 956. 1.

235b. est varietas macra spiculis paucifloris: *L. tenue* L. *L. agreste* Host. *L. Halleri* Gm. *Fl. bad.* — Variat etiam proliferum et spicis compositis ut sequens.

Ad vias, in pascuis, ruderalis et cultis. Jun. Jul. 24.

236. Lolium festucaecum LK.: spiculis multifloris compressis gluma sua passim gemina multo longioribus, inferioribus subpedunculatis, glumella externa obtusa mutica ciliata. LINK. *hort. Ber.* 1. 273. RCHB. *Fl. germ.* 70.

In occidentali regione passim cum *L. perenni* et *Festuca elatior*, quibus intermedium et ex opinione quorundam hybridum. Mai. Jun. 24.

CXIII. **238—39. Lolium italicum** A. BRAUN: spiculis glumam bis—ter longis 6—20-floris, glumellis lanceolatis, turionibus foliosis, foliis novellis convolutis. A. BRAUN *Fl. bot. Zeit.* XVII. 241. KOCH 956. 2. RCHB. *Deutschl. Fl. Gräser.* S. 22. 236. *L. Boucheanum* KNTU. 436. 4.

Laxius et tenerius *L. perenni*, laete virens.

Icon. tab. CXIII. Var. mutica et var. aristata eum spiculis auctis.

Passim in meridionali regione, etiam cultum. Mai—Jul. 24.

Aegilops LINN. Spiculae ex incisuris racheos orientes articulis adpressae 3—4-florae sessiles, flos infimus et supremus hermaphroditus medii maseuli, superiores steriles. Glumae geminae oppositae basi subconnatae ventricosae pluriaristatae. Glumellae binae. inferior 5-nervis, superior bicarinata apice emarginata.

CXIV. **240. Aegilops ovata** L.: spiculis e cylindrico ventricosis 3—4, gluma scabra 3—4-aristata, arista a basi scabra; glumellis 2—3-aristatis, arista glumella longioribus. RCHB. *Fl. germ.* 17. 73. KUNTH 458. 1. KOCH 958. 1. *geniculata* RTH. *Phleum Aegilops* Scop.

Adscendens humilis.

In regione meridionali in saxosis apricis, ad vias et montium locos declivos. Mai—Jul. ☉. Istria, Dalmatia, Croatia, Liguria.

241. Aegilops triaristata W.: spiculis e cylindrico ventricosis 4—5, glumis scabro-nervosis 2—3-aristatis, aristis basi margine subscabris, glumella 2—3-nervi, arista arrecta glumella multo longiore. RCHB. *Fl. germ.* 17. 74.

Praecedente gracilior, procerior.

Icon. tab. CXIV. A. spicula soluta. B. flos fertilis cum sterilibus. C. gluma. d. D. granum. In declivibus petrosis ad vias in meridionali regione. Mai—Jul. ☉. Istria, Croatia, Dalmatia, Liguria.

242. Aegilops triuncialis L.: spica producta, spiculis 5—6-, glumis scabro-nervosis, 2—3-aristatis, arista margine scabra, spicularum superiorum longioribus, glumella inferiore 3-dentata aut breviter triaristata. RCHB. *Fl. germ.* 17. 75. KUNTH 458. 3. KOCH 958. 4.

Intermedia vicinis.

In saxosis apricis in Istria, Dalmatia, Liguria. Mai—Jul. ☉.

243. Aegilops cylindrica Host: spica cylindrico-elongata, spiculis 5—7, glumis uniaristatis, inferiorum arista abbreviata, supremorum longissima, basi scabra. RCHB. *Fl. germ.* 17. 76.

Ad vias in vineis et collibus saxosis in Hungaria pr. Ofen et Pesth, Orawicza, Aosta in Pedemontio. Mai. Jun. ☉.

Notandum est hanc speciem atque affines optime distinctas esse in „M. Cosson Notes sur quelques plantes de France critiques, rares ou nouvelles.“ Enumerantur enim l. c.

1) **Ae. caudata** L.: sp. II. 1489. Willd., Bory et Chaub., Requier, Mutel, Kunth (excl. Host et Buxb.). *Ae. cylindrica* Sm. et Sibth. t. 95. Link in Linnaea 1835. Tausch Fl. b. Z. 1837. 107. D'Urville enum. pl. Orient. „Gram. cretic. etc.“ Tournef. coroll. inst. rei herb. 39. — In Galloprovincia, Graecia et Tauria.

2) **Ae. cylindrica** Host et nostra cf. supra. Haec est *Ae. caudata* Link Linnaea l. c. Tausch Fl. b. Z. l. c. non W. — Addit el. Cosson: „*L'Ae. cylindrica* Host se distingue de *Ae. caudata* par les glumes des épillets latéraux aristées tronquées-bidentées et non pas à deux dents aiguës, par les glumes de l'épillet terminal ordinairement tridentées à arête plus longue que celle des glumes, mais ces caractères ne sont peut-être pas suffisants pour faire distinguer spécifiquement les deux plantes; en effet le caractère fourni par les glumes des épillets latéraux est assez variable, et on ne sauroit attacher une bien grande importance à la présence des arêtes dans les glumelles de l'épillet supérieur, ce caractère ayant, en général, peu de valeur dans cette tribu de la famille des Graminées.“

Praetera exponuntur 1) *Ae. squarrosa* L. Willd. Cav. ic. t. 90. f. 2. Desf. Kunth (excl. Schreb.) Requier, Dury, Mutel f. 648. *Ae. ventricosa* Tausch. 2) *Ae. Tauschii* Cosson: *Ae. squarrosa* Schreb. Tausch l. c. Boiss. Esp. *Ae. cylindrica* var. *taurica* R. S. *Ae. caudata* Sm. Sibth. Fl. graec. l. 76. in nota non Linn. *Gram. loliac. spurium spica crassiore cristata* Buxb. l. 31. Cent. I. t. 50., altera in Gallia, Hispania, Sardinia et Algeria, altera in Iberia, Tauria, Georgia lecta et intra fines nondum reperta.

Elymus LINN. Spiculae e rachis excisuris ortae geminae, ternae — quaternae bi — septemflorae, flores hermaphroditi, terminalis tabescens. Gluma bivalvis anteposita involucrans, glumella bivalvis superior bicarinata. — Habitus hordeaceus. —

CXV. **244—45. Elymus crinitus** SCHREB.: spica oblonga, glumis acuminatissimis, spiculis geminis 1—2-floris cum rudimento, scabris, arista glumam pluries longa. REHB. *Fl. germ.* 18. 77. KUNTH 452. 18. KOCH 954. 3. *Horde. crinitum* DESF. *jubatum* LOIS. non L. *E. intermedius* M. B.

Habitu Hordeo murino accedens. Folia plana supra pilosa, vaginae glabrae.

Icon. tab. CXV. spica altera 245. est maturata. A. spicula aperta glumis resectis. B. glumella interior cum grano et palea. C. apex glumellae. D. pistillum cum palea.

In campis arenosis. Mai — Jul. ☉. In Hungaria, in altivio pr. Triest.

246. Elymus europaeus LINN.: spica oblonga, spiculis bifloris scabris, florum arista glumae bis longa. REHB. *Fl. germ.* 18. 78. KUNTH 452. 13. KOCH 954. 2.

Habitus fere Tritici (*Agropyri*) repentis, folia plana, glabra, vaginae parum pilosae.

Icon. tab. CXV. adstat partícula folii et vagina in laminam transiens.

In collibus silvaticis praecipue basalticis. Juni — Spt. 24. passim nec vulgaris.

CXVI. **247—48. Elymus arenarius** LINN.: spica elongata cylindrico-attenuata, gluma acuminata ciliata, spiculis pubescentibus trifloris, flore mutico, foliis rigidis glaucis demum involutis. REHB. *Fl. germ.* 18. 79. KUNTH 450. 1. KOCH 18. 79.

Gramen speciosum totum glaucum rigidum gregarie culmis quaquaversum.

Icon. tab. CXVI. spica florens et fructifera. Adduntur figurae: spicula florens glumis reflexis, pistillum, glumella cum grano et eadem aucta, tandem granum transectum.

Ad littora maris et fluviorum nec non in campis arenosis. Mai. Jun. 24. In septentrionali regione ad mare, in media ad fluvios Berolini, Dresdae, in Lusatia, Anhalt, Bohemia et Palatinatu.

Hordeum LINN. Spiculae ternae uniflorae vel cum alterius floris pedicello, flos medius hermaphroditus, laterales masculi vel neutri. Gluma anteposita involucrans.

CXVII. **249. Hordeum murinum** L.: spiculis singulis aristatis, gluma spiculae mediae lineari-lanceolata ciliata, lateralium setacea scabra. REHB. *Fl. germ.* 18. 81. KUNTH 456. 8. KOCH 955. 6.

Icon. tab. CXVII. Spicula externe visa. B. spiculae latus interior. C. gluma exterior. D. gluma interior. E. genitalia.

Ad muros et sepes, in ruderalis, viis. Jun. — Aug. ☉.

249b. Hordeum pseudomurinum TAPPEINER: spiculis singulis aristatis, glumis intermediae et interiori lateralium lineari-lanceolatis utrinque ciliatis, exteriori lateralium lineari-setacea altero latere basi ciliata. KOCH 955. 7.

Num varietas sit aut species genuina ulterius observandum KUCHNER commendat. Iconem in supplemento dabimus.

Tirol, im Vintsehgau pr. Schlanders: TAPPEINER. Jul. Aug. ☉.

250. Hordeum maritimum WITT.: spiculis singulis aristatis, glumis scabris, singula lateralium semilanceolata, reliquis setaceis. REHB. *Fl. germ.* 18. 83. KUNTH 456. 11. KOCH 956. 9. *geniculatum* ALL. *rigidum* RTH. Catalaet.

Humilius sed robustius *H. murino* et plerumque glaucescens. Vaginae supremae plerumque pedunculo longiores.

Ad littora maris, ad vias et agrorum versuras. Mai — Jun. ☉ et 24. Ad mare septentrionale pr. Jever, in Holstein, Schleswig, Istria, Friaul, Ungarn, Dalmatien.

251. Hordeum pratense HUDS.: spiculis singulis aristatis, glumis scabris setaceis. RECHB. *Fl. germ.* 18. 82. KUNTH 455. 6. *secalinum* SCHREB. KOCH 955. 8. *nodosum* M. B. — *H. maritimum* ROTH est var. spiculis lateralibus subpilosus.

Gracilius reliquis, culmo basi subbulboso tunc adscendente, ceterum stricto elongato, spica humili.

In pratis, pascuis, ad vias inprimis in salsis. Jun. Jul. 24. Passim.

CXVIII. **252. Hordeum bulbosum** LINN.: spica elongata disticha, floribus fertilibus ternis, glumis lineari-lanceolatis, glumella extrema florum lateralium acuminata, medii aristata. RECHB. *Fl. germ.* 18. 80. KUNTH 455. 5.

Bulbus avellanam referens quasi costatam, culmus 1 — bipedalis, vaginae et folia pilosa.

Icon. tab. CXVIII. A. particula racheos cum spicula.

In cultis in Dalmatia, Istria, pr. Dignano BIASOLETTO. Zara, Sebenico, Salona, Ragusa. Jun. Jul. 24.

Culta Hordea seorsim sequuntur.

Oreochloa LINK. Panicula spicata, spiculis in axi articulato subsessilibus distichis compresso-verticalibus plurifloris. Gluma subaequaliter bivalvis mutica. Glumella bivalvis membranacea, inferior 5-nervis, superior bicarinata.

253. Oreochloa disticha LINK. Gramen habitu Sesleriae sphaerocephalae spiculis e viridi coeruleo-variegatis. RECHB. *Fl. germ.* 19. 89. *Sesleria disticha* PERS. KUNTH 323. 11. KOCH 942. 6. *Poa disticha* WULF. *seslerioides* ALL. *Cynosurus distichus* HOFEM.

Icon. tab. CXVIII. B. axis cum spicula. C. spicula aperta. D. glumella interior.

In alpium rupibus summis in Salisburgo, Carinthia, Tirol, Helvetia meridionali, Pedemontio. Jun. Jul. 24.

Agropyrum P. B. Spiculae alternatim sessiles complanato-depressae bi — multiflorae, flos summus tabescens. Gluma subaequaliter bivalvis carinata. Glumella inferior quibusdam aristata, superior bicarinata bidentata. — Triticum ut plurimum perennia, gluma carinata compressa, nec ventricosa apice recta nec extrorsum flexa.

CXIX. **254. Agropyrum caninum** R. S.: spica gracili disticha, spiculis sub-5-floris, gluma lanceolata 3 — 5-nervi acuminata, glumellis acutis altera aristata, rachis folisque utrinque scabris, radice fibrosa. RECHB. *Fl. germ.* 20. 98. *Triticum caninum* SCHREB. KUNTH 442. 26. KOCH 953. 17. *Elymus caninus* LINN. *Tr. sepium* LAM. *Festuca nutans* MICH.

In silvaticis ad rivulos atque torrentes. Jun. — Aug. 24.

255. Agropyrum cristatum P. B.: spica oblonga disticha imbricata complana, spiculis oblongis quadrifloris aristatis. RECHB. *Fl. germ.* 21. 106. (excl. *Tr. pectinato* M. B.) *Triticum* — SCHREB. KUNTH 443. 29. *Bromus cristatus* LINN. am. — β . STEV. = *T. intermedium* M. B.

Erectum glabrum aut puberulum.

In arenosis siccioribus ad vias in Hungaria: Pesth, Ofen, Neusiedler Sec. Jun. Jul. 24.

CXXVII. **253. Agropyrum biflorum (Trit.)** BRIGNOLI: spiculis 2- rarius 4-floris, glumis oblongis crasse trinerviis acuminatis, glumellis oblongis, infera trinervi subemarginata, aristâ debili brevi, axi scabro, radice fibrosa, foliis glabris margine scabriusculis. *Rehb. Fl. germ. exsicc.* 2104. KUNTH 448. 65. KOCH 953. 16. —

254. var. Trit. violaceum HORNEM. humilior spiculis paucioribus violaceo-suffusis. Habitus *A. canini*, sed folia angustiora.

In alpinis Juliis in rupibus montis Matajur: SENDTNER, TOMMASINI. Jul. Aug. 24.

CXIX. CXX. **256—261. Agropyrum repens** P. B.: spiculis in rachis scabra sub-5-floris, glumis lanceolatis 5-nerviis acutis, glumellis muticis aristatisve, foliis in nervibus supra simplici serie punctato-scabris, radice longe lateque repente. *Rehb. Fl. germ.* 20. 99. KUNTH 440. 12. KOCH 953. 15.

CXIX. **256. firmum** PRESL: spiculis magnis, glumellis elongatis muticis. Habitus procerus.

CXX. **257. arvense** SCHRANK: spiculis mediocribus, glumellis oblongis acutis muticis.

258. subulatum SCHRANK: ut antecedens sed glumis subulatis, glumellis mucronatis.

259. dumetorum SCHRANK: (spiculis inferioribus passim geminis ternisve), glumis glumellisque breve aristatis.

260. Vaillantianum SCHRANK: (spiculis inferioribus passim geminis ternisve), aristis glumarum glumellis brevioribus.

261. Leersianum SCHRANK: glumis glumellisque in aristam ipsis subaequilongam attenuatis. *Elymus caninus* LEERS.

CXXI. **263. littorale** HOST: procerum spiculis magnis fere praecedentis sed magis abrupte aristatis, rachis laevi glabro.

Ceterum varietas caesio-glaucæ, foliis convolutis floribusque obtusis vel obtusiusculis est *T. repens* b. *maritimum* KOCH & ZIZ. cat. pl. palat. p. 5.

In cultis, arvis, ad vias et sepes. Jun. — Spt. 24. Vulgatissimum gramen.

CXXI et CXXIII. **262 et 269. Agropyrum glaucum** R. S.: spiculis approximatis sub-5-floris, glumis oblongis 5—7-nerviis obtusis vel truncatis spiculis dimidio brevioribus, floribus obtusis, axi scabro, foliorum nervis supra simplici serie punctato-scabris, radice repente. *Rehb. Fl. germ.* 20. 100. KUNTH 445. 41. KOCH 952. 14.

Habitus *A. repens*, a quo recedit proceritate et colore et foliis inferioribus convolutis. *T. intermedium* HOST et *juncum* HOST huc pertinent. Cf. *Fl. germ. exsicc.* n. 1802.

In lapidosis siccis. Jun. Jul. 24. In Bohemia, Austria, Hungaria, Styria, Istria, Helvetia.

CXXII. **267. Agropyrum pungens** R. S.: spiculis subapproximatis 5—10-floris, glumis 7-nerviis acutiusculis spiculam dimidiam longis, glumellis obtusis, foliorum nervis supra simplici serie setuloso-scabris, radice repente. *Rehb. Fl. germ.* 20. 102. KUNTH 444. 40. KOCH 952. 13.

Humile, gracile.

Ad littora maris in Holsatia et ad mare adriaticum. Jun. Jul. 24.

CXXI et CXXII. **261 et 266. Agropyrum acutum** R. S.: spiculis in rachi laeviuscula subremotis 5—8-floris, glumis acutis 7-nerviis, spicula parte tertiā brevioribus, floribus acutis glabris, foliorum nervis supra setuloso-scabris, radice repente. RCHB. *Fl. germ.* 20. 103. KUNTH 441. 18. KOCH 952. 11. — *T. affine* DETHARD. *A. acutum* β. RCHB. *Fl. germ. exc.* 140¹. 103. et *Fl. g. exsicc.*

Ad littora maris: Holsatia, Norderney, ad mare adriaticum. *Tr. affine* pr. Warnemünde: DETHARDING. Jun. Jul. 24.

CXXII. **267. Agropyrum junceum** P. B.: spiculis in rachi laevi remotis 5—9-floris, glumis lineari-lanceolatis 5—9-nerviis obtusiusculis, spicula tertiā parte brevioribus, floribus muticis, foliorum nervis supra setuloso-scabris, radice repente. RCHB. *Fl. germ.* 21. 104. KUNTH 444. 38. KOCH 951. 9. *Bromus truncatus* Scop. *Triticum farctum* Viv. *Festuca juncea* MICH. *T. glaucum* DEC.

Humile robustum glaucum, vaginae laxae, folia turionum convoluta rigida, spiculae paucae inter omnes maximae. *Fl. germ. exsicc.* 106.

Ad littora maris meridionalia et septentrionalia. Jun. Jul. 24.

CXXIII. **268. Agropyrum strictum** DETHARDING: spiculis in rachi scabra 5-floris approximatis, glumis lineari-lanceolatis 5-nerviis glabris, acutis, spicula dimidia longioribus, floribus obtusis muticis basi pilosellis, foliorum nervis supra setuloso-scabris, culmo stricto rigido, radice repente. RCHB. *Fl. germ.* 21. 105. KUNTH 444. 39. KOCH 952. 10.

Elatum habitu suo firmo strictissimoque insigne.

In arenosis hieme inundatis pr. Warnemünde: DETHARDING. Jun. Jul. 24.

CXXIII. **271. Agropyrum rigidum** R. S.: spiculis e rachi setulosa 5—9-floris complanatis obtusis, glumis obtusatis bis tertiā parte spicula brevioribus 7-nerviis, floribus muticis, foliorum nervis supra simplici serie setulosis. RCHB. *Fl. germ.* 20. 101. *Trit. rigidum* SCHRAD. KUNTH 445. 42. KOCH 952. 12. *junceum* β. *giganteum* ROTM. *elongatum* HOST. *T. giganteum* RETZ. *T. pilosum* SEENUS?

Habitus *A. stricti*, spiculae minores.

In paludosis siccis in Bohemia, Austria, Tirol, Istria. Jul. Aug. 24.

Triticum L. Spiculae ventricoso-deplanatae racheos dentibus insertae 3—4-florae, floribus inferioribus hermaphroditis extimis fatuis. Gluma aequaliter bivalvis ventricosa floribus brevior. Gluma aequaliter bivalvis, superior bicarinata, inferior aristata aut mutica.

CXXIV. **272. Triticum villosum** M. B.: spica disticha, spiculis 4-floris, gluma cuneata truncata, infera aristata, glumis rachique fasciculato-pilosis, gluma infera aristata, foliis pilosis. RCHB. *Fl. germ.* 22. 114. KUNTH 440. 10. KOCH 951. 8. *Secale villosum* L. *Hordeum ciliatum* LAM. *Agropyrum villosum* LINK hort.

Habitus fere *Secalis*. Cf. *Fl. germ. exsicc.* 1501.

Icon. tab. CXXIV. A. flos explicatus.

Ad agros, vias in Istria, Hungaria, Croatia, Dalmatia: Italia superiori. Mai—Jul. ☉.

Species cultae Trilicorum seorsim tractabuntur.

Secale L. Spiculae in rachi articulatae deplanatae singulae triflorae, flores inferiores fertiles cum pedunculato tertii rudimento. Gluma bivalvis lanceolato-acuminata uninervis. Glumella inferior ex apice aristata 5-nervis, superior bicarinata.

CXXIV. **223. Secale fragile** M. B.: rachis articulata fragili, gluma in aristam acuminata, glumellis longissime aristatis. RCHB. *Fl. germ. exc.* 22. 115. KUNTH 449. 2. *cereale* M. B. *spontaneum* FISC. Cat. fl. Gorengk. *sylvestre* Host. *campestre* SCHULT.

Habitu refert *S. cereale*, sed gracilius, foliis angustioribus et aristis longissimis patulis, rachis maxime fragili distinguitur.

Icon. tab. CXXIV. B. spicula a dorso. C. eadem ab interiore latere axili visa.

In arenosis ad vias in Hungaria. Jun. Jul. ☉.

Catapodium LINK. Rachis non dentata. Spiculae distichae secundae breve pedunculatae compresso-deplanatae 5—9-florae, flos superior fatuus. Gluma subaequaliter bivalvis utraque subtrinervis, glumella infera carinata trinervis, supera bicarinata.

CXXV. **224. Catapodium loliaceum** LINK. Gramen humile prostratum vel adscendens habitu fere Lepturi incurvati. Racemus compositus dense distichus secundus, spiculae ovato-lanceolatae. RCHB. *Fl. germ. exc.* 19. 90. *Fl. germ. excicc.* 1202. *Festuca rottboelloides* KUNTH 395. 17. *Poa loliacea* HUDS. KOCH 925. 1. *Triticum loliaceum* SMITH. *unilaterale* VILL. *Triticum rottboella* DEC. *Brachypodium loliaceum* R. S.

Icon. tab. CXXV. A. pars axis communis cum spicula.

In graminosis ad vias in regione maxime meridionali: Fiume, Ins. Veglia, Sansego, Brioni. Mai. Jun. ☉.

Brachypodium P. B. Rachis exciso-articulata. Spiculae brevi-pedunculatae teretiusculae 5—00-florae, flores supremi fatui. Gluma subaequaliter bivalvis, inferior trinervis, superior septemnervis. Flores exserti, glumella inferior sub apice aristata. Germen glabrum.

CXXVI. **227 — 229. Brachypodium gracile** P. B.: racemo laxo nutante, aristis superioribus glumas superantibus, foliis scabris, radice fibrosa. RCHB. *Fl. germ.* 19. 93. *Triticum sylvaticum* MÖNCH. KUNTH 445. 43. *Brachypodium sylvaticum* R. S. KOCH 944. 1. *Bromus pinnatus* β. LINN. sp. *sylvaticus* POLLICH. *dumosus* VILL. *gracilis* WEIG. *Festuca gracilis* MÖNCH meth. *sylvatica* HUDS. KOEL. *Triticum teretiflorum* WIBEL. *gracile* BROTERO.

Gramen lacte viride, gracile, laxum, sublatifolium, spiculae unguiculares glabrae aut pubescentes, rarius infimae geminae ut in fig. 279.

Icon. tab. CXXVI. 277. specimen spiculis pubescentibus. 278. iisdem glabris. 279. spiculis geminatim impositis.

In nemorosis. Jun. — Spt. 24.

CXXVI et CXXVII. **280 — 81. Brachypodium pinnatum** P. B.: racemo firmulo erecto, aristis superioribus gluma brevioribus, foliis rigidulis, ligula oblonga, radice repente. RCHB. *Fl. germ.* 19. 94. 95. KOCH 944. 2. *Triticum pinnatum* MÖNCH *Fl. Hass.* KUNTH 445. 44. *Bromus pinnatus* L. *gracilis* LEYSS. *Festuca pinnata* MÖNCH meth. *Trit. bromoides* WIBEL.

Rigidius praecedente, spiculae longiores, pollicares et ultra.

a. **281.** spiculis puberulis.

b. **280. Bromus rupestris** Host, *Brachypod. rupestre* R. S.: spiculis glabris.

In declivibus graminosis inter frutices, ad prata silvatica. Jun. Jul. 24.

CXXVII. **282. *Brachypodium caespitosum*** R. S.: racemo spicato erecto, spiculis alternis glabris subaristatis passim subfalcatis, foliis anguste linearibus basi villosis, vaginis glabris, ligula abbreviata, radice dense caespitosa-repente. *Rehb. Fl. germ.* 20. 95. *Bromus caespitosus* Host. *corniculatus* LAM. *Trit. gracile* DEC. *Fl. franc.* et *Trit. pinnatum* β. DEC. *Fl. fr.* *Brachyp. pinnatum* γ. *caespitosum* Koch 944. 2. γ.

Habitus gracilior, viror magis flavesceens, inprimis folia angustiora et longiora, ligulae contra abbreviatae et modus creseendi caespitosus plantam hanc meridionalem nec unquam in septentrionali aut media regione, in quibus *B. pinnatum* abundat, occurrentem et a me saepius e semine educatam optime distinguunt.

In silvaticis in Tirolis australi et in regione littorali. Mai. Jun. 24.

CXXVIII. **285 — 86. *Brachypodium ramosum*** R. S.: adscendenti-erectum ramosum tenue rigidum, spiculis 1—5 distantibus 6—15-floris breve aristatis, foliis angustissimis rigidis involutis glaucis patentibus divergentibus, radice repente. *Rehb. Fl. germ.* 20. 96. Koch 944. 3. *Bromus ramosus* L. *Pluckenctii* ALL. *Festuca caespitosa* DESF. *Brachypod. Pluckenctii* LINK. — *B. genuense* R. S. et *Fl. germ.* 140. 96c. ulterius observandum est *Trit. genuense* DEC. *Festuca genuensis* POLLINI.

Gramen gracilitate, ramositate et rigiditate facile separandum.

In lapidosis apricis in pratis inter frutices in regione maxime meridionali, in littorali, Dalmatia, ad Nicaeam. *B. genuense* Genuae in M. Scaggio. Jun. 24.

***Trachynia* LINK.** Rachis exciso-articulata. Spiculae breve pedunculatae multiflorae. Glumae ovali-oblongae acutae. Glumella infera crasse 5-nervis ex apice aristata, superior membranacea obtusa.

CXXIX. **287. *Trachynia distachya*** LINK. Gramen adscendens humile rigidum scabrum spithameum — pedale, spiculae 1—2—3 pollicares 6—15-florae. Folia plana ciliata, culmus glaber, radix fibrosa. *Rehb. Fl. germ.* 19. 91. *Triticum ciliatum* DEC. KUNTH 447. 50. *Bromus distachyos* LINN. *pauper* GM. *ciliatus* LAM. *platystachyos* LAM. *Festuca ciliata* GOV. *distachya* KOEL. *diandra* MÖNCH meth. ~ *speudodistachya* KOEL. *monostachya* POIR. it. *Brachypodium distachyon* R. S. Koch 945. 4.

Icon. tab. CXXIX. particula spiculae verticaliter visa, ad dextram flos fructifer apertus et axis universalis pars infera cum inferioribus spiculae floribus a latere. Ad sinistram representatur granum transsectum.

In locis siccis sterilibus et cultis in Istria, Dalmatia, Lombardia, Liguria, Pedemontio, in Belgia pr. Songnez, Lüttich et in Flandria orientali. Mai. Jun. ☉.

***Nardurus* REHB.** Spiculae brevissime pedunculatae in rachi continua excisa alternae subsecundae. Gluma bivalvis lanceolato-acuminata nervosa. Glumellae lanceolatae, inferior aristata, superior ciliata. Nomen in *Fl. germ.* 19. 92. quasi *Vulpia* spicata! —

CXXIX. **288. *Nardurus tenellus*** REHB.: spiculis subremotis erectis distichis 3—7-floris, glumis lanceolatis spicula brevioribus, inferiore uninervi, glumellis lanceolato-acuminatis scabro-aristatis. *Rehb. Fl. germ.* 19. 92. (*Brachypod. tenellum* P. B.) *Deutschl. Flora. Gräser* S. 27. 288. *Festuca tenuiflora* SCHRAD. KUNTH 395. 20. Koch 935. 1. *Triticum tenellum* α. LAM. *T. Nardus* DEC. *Brachypodium tenellum* et *tenuiflorum* R. S. *psilanthum* LINK.

Gramen tenue et gracile pulnare—spithamacum fere *Nardi* spica sed minus rigida praeditum.

Var. β . *Triticum biunciale* ALL. auct.: floribus spicularum racemi inferiorum mucronatis, superiorum longe aristatis.

Icon. tab. CXXIX. 288. Figurae adduntur: flos apertus, axis spiculac, pistillum, spicula cum petiolo et axis particula.

In apricis in Istria et in Vallesia, in M. Tanno pr. Croneburg teste BECKER. Jun. Jul. ☉.

CXXV. **275 Nardurus? unilateralis (Triticum unilaterale** LINN. mant.): rigidior, spiculis distincte secundis, glumis exiguis glumellisque acutis muticis. *Festuca unilateralis* SCHRAD. KUNTH 395. 16. *Fest. tenuiflora a. mutica* KOCH 935. 1.

In apricis in Italia superiori. Jun. Jul. ☉.

CXXV. **276. Nardurus?** (rectius **Catapodium**. *Fl. germ.* 140. 97.) **Halleri (Triticum — Viv.)**: spiculis ovato-lanceolatis, multifloris alternatim secundis, glumis nervosis glumellisque ovato-lanceolatis acutis, loliis subsetaceis, radice annua fibrosa. *Agropyrum Halleri* RECH. *Fl. germ.* 20. 97. *Triticum Halleri* VIV. fragm. t. 26. f. 1. *tenellum* LINN.? *biunciale* VILL. *lolioides* PERS. *Brachypodium Poa et Halleri* R. S. *Festuca Poa* KUNTH. *Lachenalii* SPENN. KOCH 935. — β . var. *ramosa*: *Triticum Lachenalii* GM. bad. *Trit. Festuca* DEC. *Fest. Lachenalii* β . *ramosa* KOCH 935.

In siccis arenosis graniticis locis et in glareosis rivulorum, im. Elsass u. d. Vogesen KIRSCHLEGER cf. *Fl. germ.* 140. 97., Oberbaden b. Freiburg zwischen Wyl u. Basel, Locarno, Canton Tessin, Aosta-Thal u. im Mailändischen. Jun. Jul. ☉.

276b. Nardurus hispanicus (Trit.—um REICHARD, WILLD. sp.): spica lineari secunda recta, floribus sex adpressis subaristatis. *Brachypod. hispanicum* RECH. *Fl. germ.* 140. 92b. (excl. Viv. fragm.) *Festuca maritima* LÖFL. *hispanica* KUNTH 395. 15.

In Liguria in littorali: a Sestri di Ponente nach Genua zu: BERTOLONE.
Iconem serius dabo.

Vulpia GMEL. Panicula coarctata subspicata secunda. Spiculae pedunculis brevibus in-crassatis articulatae, pluriflorae complanatae. Glumae valde inaequales, inferior un-nervis aut subnulla, superior trinervis. Glumellae binae, inferior carinata 5-nervis longe aristata, superior bicarinata ciliata. Stamina tria, bina vel plurimis unicum. *Mygalurus* LINK.

CXXX. **289. Vulpia myurus (Fest. — LINN. sp. GOU. S. WILLEM.)**: panicula spi-cato-contracta, spiculis sub-5-floris, gluma superiore acuminatissima inferiore brevissima setacea vel nulla, floribus lanceolatis, glumellis arista brevioribus pilosis ciliatisque. RECH. *Fl. germ.* 37. 230. *Festuca ciliata* PERS. KUNTH 396. 25. KOCH 936. 6. *My-urus* β . SER. MAUR. *Vulpia pilosa* GM. bad.

In siccis in Istria, Croatia, Dalmatia, Lombardia, Liguria, Pedemontio, Genesae, Tessin. Mai. Jul. ☉.

290. Vulpia Pseudomyurus (Fest. — WILLEM.): panicula elongata racemosa se-cunda cernua, spiculis sub-5-floris, gluma inferiore setacea, superiore lanceolata, glu-mella scabra aristata. RECH. *Fl. germ.* 37. 231. *Fest. Myurus* EHRH. KUNTH 396. 23. KOCH 937. *Bromus bohemicus* SCHMIDT. *Vulpia Myurus* GM. *Mygalurus caudatus* LINN.

Culmi adscendentes graciles et longis vaginis ad paniculam usque induti, color pallens
mox stramineus.

In arenosis passim. Mai. Jun. ☉.

- 291. *Vulpia uniglumis* (Fest. — SOLANDER):** panicula dense spicata secunda, spiculis sub-6-floris, gluma inferiore minima vel nulla, superiore majuscula, glumellis longissime subulatis arista brevioribus. RCHB. *Fl. germ.* 37. 234. *Festuca* — KUNTH 396. 21. KOCH 936. 5. *Stipa membranacea* LINN. sp. *Lolium bromoides* HUDS. *Bromus hordeiformis* LAM. *Festuca fasciculata* FORSK. *Vulpia membranacea* LINK hort. *Mygalurus uniglumis* LINK EN.

In siccis apricis. Mai. Jun. ☉. Triest, Venedig, Genua, Nizza.

- 292. *Vulpia ligustica* (Fest. — BERTOL.):** panicula secunda cernua, spiculis in pedunculo compresso-ensiformi 2—5-floris, gluma inferiore minima v. nulla, superiore majore aristata, spiculam sine aristis aequante, glumella scabra, arista brevior. RCHB. *Fl. germ.* 100³. 234b. *Bromus ligusticus* ALL. ped. *stipoides* LINN. mant. *Bromus geniculatus* LINN. mant. *Festuca ligustica* BERTOL. *stipoides* DESF. *clavata* MÖNCH. *Vulpia geniculata* LINK hort. *Mygalurus geniculatus* LINK ENUM. *Fest. geniculata* WILLD. EN. KUNTH 397. 30.

Panicula quidem contracta sed propter spiculas porrectas nec ut in reliquis arrectas magis patens.

In collibus siccioribus in Liguria: Genua. Apr. Mai. ☉ ♂.

- 293. *Vulpia bromoides* (Fest. — LINN.):** panicula laxè spicata secunda, spiculis 5—7-floris, gluma infera brevissima, supera maiore lanceolata aristata, glumellis glabris longius aristatis. RCHB. *Fl. germ.* 37. 233. et *sciuroides* ib. 232. *Festuca bromoides* LINN. KUNTH 396. 26. KOCH 937. 8. *Bromus dortonensis* ALL. *ambiguus* CYRILL. *Fest. sciuroides* ROTH. *Vulpia bromoides* GM. bad. LINK hort. *Mygalurus* LINK EN.

Culmus superne nudus. Spiculae complanae duntius virentes fere Bromi cuiusdam tenelli. *Fl. germ. exsicc.* 122.

In arenosis passim. Mai. Jun. ☉ ♂.

***Festuca* LINN.** Panicula. Spiculae pluriflorae distichae complanae. Gluma bivalvis mutica, inferior brevior uninervis, superior trinervis. Glumellae subaequales, inferior carinata 3—5-nervis sub apice aristata, superior bicarinata binervis ciliolata.

a. folia setacea.

aa. ligula truncato-biauriculata.

- CXXXI. **294. *Festuca ovina* LINN.:** culmo superne tetragono, panicula contracta erecta, spiculis oblongis compresso-teretiunculis sub-4-floris, glumis cuspidatis, arista florum partem tertiam aequante. RCHB. *Fl. germ.* 37. 235. KUNTH 398. 33. KOCH 937. 10. *F. paludosa* GAUD.

Folia setacea scabra, gramen tenue strictum spithameum—pedale.

- 295. var. vivipara: *F. vivipara* SM.** *Fl. brit.*

In pascuis siccis, in silvis ad colles, rupes, vias cavas etc. Mai. Jun. 24.

- 296. Festuca tenuifolia** SIBTH.: tenuior floribus muticis. RCHB. *Fl. germ.* 37. sub 235. KUNTH et KOCH l. c.

In silvis acerosis. Mai. Jun. 24.

- 299. Festuca Halleri** ALL.: panicula racemosa, rachi glabra, spiculis 4—5-floris compresso-teretiuseculis oblongis aristatis, glumae valva exteriori pubescente, aristis glumellam superantibus, foliis setaceis. RCHB. *Fl. germ.* 38. 239. KUNTH 399. 38. KOCH 937. 9.

Dense caespitosa palmaris — semipedalis.

In alpinis in Sabaudia. Jul. Aug. 24.

- 297. Festuca Gaudini** KUNTH: racemo spiciformi erecto, spiculis oblongis subquadri-floris aristatis subsessilibus, inferioribus pedunculatis interdum geminis, aristis glumella dimidia brevioribus, foliis capillaribus glabris. KUNTH 399. 38. *F. Halleri* GAUD. Sub *F. ovina* β . *alpina* KOCH 938.

In alpinis summis in pascuis siccis in Helvetia, Tirol, Carinthia. Jul. Aug. 24.

- 300. Festuca aurata** GAUD.: panicula racemosa patula, spiculis demum dilatatis distichis, foliis capillaceis mollibus, culmeis complicatis. RCHB. *Fl. germ.* 38. 238. KUNTH 399. 40. *F. pallida* MURRILL. *Schenodorus auratus* R. S.

Videtur var. flavescens Festucae Halleri.

In Valesia in alpinis pascuis elatis in M. Gex et Sillon, in vallibus Herménée et Anniviers. — Jul. Aug. 24.

- 298. Festuca alpina** GAUD.: panicula patula, pedunculis spicularum inferiorum spiculam subaequantibus, glumis valde inaequalibus, arista glumellis brevior. RCHB. *Fl. germ.* 38. 237. *exsicc.* 2111. KUNTH 398. 37. Sub *F. ovina* β . *alpina* KOCH 938.

In pascuis alpinis. Jul. Aug. 24.

- 301. Festuca amethystina** HOST: panicula patente multispiculata, pedunculis spiculam vel certe dimidiam aequantibus, floribus patentibus muticis vel mucronatis; foliis rigidis. RCHB. *Fl. germ.* 37. 236. *F. ovina* η . *amethystina* KOCH 938.

Culmus subteres inferne certe amethystinus.

In apricis siccis arenosis in Carniola, Hungaria, Bohemia imprimis in Austria pr. Viadobonam: Weinhaus u. auf der Tückenschanze. Jun. 24.

- CXXXIII. **302—311. Festuca duriuscula** LINN.: panicula subsecunda patula, spiculis majusculis rhombeis sub-5-floris, arista florem dimidium aequante. RCHB. *Fl. germ.* 38. 241. KUNTH 399. 45. *F. ovina* ϵ . *duriuscula* KOCH 938.

Varietates magis constantes aut partim species affines, cultura certe constantes sunt:

- 302. Festuca violacea** GAUDIN: foliis setaceis laxis, spiculis nitidulis flavo-virentibus violaceo-variis. In alpinis editioribus cf. *Fl. germ. exsicc.* 124.

- 303. Festuca duriuscula** LINN.: planta typica graminicolor.

- 304. Festuca curvula** GAUD.: culmo foliisque basi curvatis, panicula contracta. Forma alpina transiens in *F. alpinam*.

- 305. Festuca hirsuta** HOST: spiculis pubescentibus.

- 306. Festuca canescens** LOIS.: c. glauco tota canescens tenuior.

307. Festuca glauca LAM.: tota glauca pruinosa robustior duriorque. Forma rupestris.

308. Festuca pallens Host: gracilior, pallidior, mox straminea.

309. Festuca laevigata CLAIRVILLE: forma alpina laevissima panicula ramosiore.

310. Festuca pannonica WULFEN: foliis culmoque viridibus tenuissimis longissimisque, spiculis numerosis angustioribus.

311. Festuca vallesiaca GAUDIN: foliis culmoque glaucis pruinosis tenuissimis longissimisque, panicula multispiculata spiculis minoribus. In rupibus calidis in Vallesia. *Fl. germ. exsicc.* 909.

In pratis, collum et montium declivis rupibusque. Mai—Jul. in alpebus Aug. 24.

CXXXIV. **313. Festuca vaginata** W. K.: panicula patente, ramulis remotis, spiculis rhombo-ovalibus complanatis 7—10-floris muticis mucronatisve, foliis longius laxiusque vaginatis setaceis glabris rigidis ligula biauriculata. RCHB. *Fl. germ.* 38. 245. KUNTH 401. 54. *F. duriuscula* G. *vaginata* KOCH 939. — Cf. *Fl. germ. exsicc.* 2115. — *Bromus glaucus* HORT. quorund. —

In pratis siccis arenosis, in montium declivis in Hungaria et Austria. Jun. Jul. 24.

312. Festuca guestfalica BONNINGH: glaucescens, paniculae pyramidatae ramis divergentibus, spiculis ovali-rhombeis 5-floris mucronatis, culmo tereti striato, ligula obsolete biaurita, foliis longe vaginatis setaceis, radice nigra fibrosa. RCHB. *Fl. germ. exc.* 140³. KUNTH 401. 52.

Differt a *F. valesiaca* GAUD. panicula patenti-divergente, ramulis longioribus, spiculis floribusque brevioribus hispidioribus, a *F. vaginata* vaginis arctioribus, foliis tenuioribus et paniculae divaricatione.

Habitat in Guestfalia: an Kalkfelsen im Sauerlande: WEIHE. Mai. Jun. 24.

314. Festuca laxa Host: panicula laxa patente ramulis solitariis vel inferioribus binis scabriusculis, spiculis in axi pubescente 3—5-floris, rarius aristatis, glumella inferiore 5-nervi. RCHB. *Fl. germ.* 38. 246. KUNTH 403. 65. KOCH 940. 16.

Cum ligula praecedentium sequentium habitum jungit. Spiculae saturate virides violascentes.

In lapidosis humidis alpium in Carinthia Carnioliam versus in M. Loibl. Jun. Jul. 24.

bb. Ligula oblonga truncata.

CXXXV. **316. Festuca pumila** VILL.: panicula sub anthesi patente, ramulis solitariis infimisve binatis, spiculis 3—4-floris aristatis, glumella inferiore 5-nervi supra medium abrupte acuminata. RCHB. *Fl. germ.* 38. 247. KUNTH 402. 61. KOCH 940. 14. *F. varia* HOPPE Tasehb. 1799. PERS. non HÄNKE. *Schenodorus pumilus* R. S.

Folia complicato-setacea, spiculae viridi rubellae violascentes. *Fl. germ. exsicc.* 519.

In summis alpebus etiam in maritimis atque Appenninis. Jul.—Sept. 24.

315. Festuca varia HNK.: panicula sub anthesi patente, ramulis solitariis vel inferioribus binatis, spiculis oblongis muticis vel breve aristatis, 5—8-floris, glumella infera e medio sensim attenuata, foliis complicato-setaceis. RCHB. *Fl. germ.* 39. 248. KUNTH 405. 81. KOCH 940. 13. *acuminata* GAUD.

Spiculae e viridi violaceo-variae.

- 317. Festuca flavescens** BELLARDI: eadem spiculis flavescentibus vix variegatis, foliis flaccidioribus. RCHB. *Fl. germ.* 39. 349. *F. xanthina* R. S. *F. alpina* Host. Sub *F. varia* KUNTH l. c. Koch l. c.

- CXXXVI. **320. Festuca eskia** RAMOND: robustior fere *F. poaeformis* habitum referens, foliis crassioribus rigidioribus. RCHB. *Fl. germ.* 39. 251. Sub *F. varia* KUNTH l. c. *F. varia* γ. *crassifolia* Koch 940.

In rupibus ad declivitates siccas. Jul. Aug. 24. Per alpium tractum, montes Carpatos, passim in Sudetis: Růbezahls Lustgarten u. kleine Schneegrube, im Kessel u. im Gesenke. Babia Gora. — *F. flavescens* in alpinis imprimis in vallibus meridionalibus in Lombardia. — *F. eskia* in Carniola: FREIER et MÜLLER. M. Iserau in Sabandia: PH. THOMAS in valle Aosta supra St. Marcel: G. RCHB. fil. —

- 318. Festuca poaeformis** Host: panicula sub anthesi patente, ramulis tenuibus infimis subquino-verlicillatis, spiculis teretiusculis in axi fasciculato-piloso 3—6-floris violaceis. RCHB. *Fl. germ.* 39. 250. *exsicc.* 126. *F. rhaetica* SUTER. KUNTH 402. 64. *F. pilosa* HALL. fil. Koch 940. 15.

Folia setacea, planta erecta rigidula.

In pratis alpinis siccioribus ad rupes per alpes, in Hungaria, in Helvetia et Pedemontio. Jul. Aug. 24.

b. *Heterophyllae*: foliis radicalibus involutis, culmeis planis.

- CXXXVII. **321. Festuca rubra** L.: panicula sub anthesi patente, spiculis oblongis 5—10-floris, floribus lanceolatis acuminato-aristatis, radice repente prolifera. RCHB. *Fl. germ.* *exc.* 39. KUNTH 401. 58. Koch 939. 12. — β. *dumetorum* L. sp. *barbata* SCHUNK pubescens. — γ. *arenaria* OSBECK, RETZ. *baltica* HOHMANN. *dumetorum* RAEN. spiculis maioribus lanuginosis.

In pratis siccis, ad vias et margines silvarum. Mai. Jun. 24.

- 322. Festuca nigrescens** Lam.: panicula patente, spiculis ovatis sub-5-floris, floribus late lanceolatis acuminatis; foliis radicalibus setaceis, culmeis planiusculis, ligula biauriculata, radice fibrosa. RCHB. *Fl. germ.* 39. 355. KUNTH 402. 60. *Schenodorus nigrescens* R. S. *F. nigricans* SCHLEICH.

Ambigit quasi inter *F. duriusculam* et *heterophyllam*. Culmi atro-violacei, spiculae e luteo violascentes.

In alpinis in locis arenosis lapidosis in Helvetia: Berner, Savoier Alpen, Jura, Schneeberg in Oestreich, Kärnthen in d. Saugrube, auf d. Schleeren n. Udai bei Kitzbühl in Tirol. Jun.—Aug. 24.

- 323. Festuca nemorum** LEYSS.: panicula patente ramosa subcernea, spiculis oblongis 4—5-floris, glumella infera obtusa, superiore acuminata 5-nervi, ovario glabro. RCHB. *Fl. germ.* 39. 254. *exsicc.* 127. *F. heterophylla* HAENKE in Jacq. collect. KUNTH 402. 59. Koch 939. 11. *F. duriuscula* LINN. syst. nat. *F. rubra diversifolia* GAUD.

Foliis culmeis latiusculis insignis. Color viridis aut viridi-glauescens.

Ad margines silvarum viasque. Mai. Jun. 24.

c. *Planispiculatae*: foliis spiculisque planis.

- CXXXVIII. **324. Festuca Scheuchzeri** GAUD.: panicula patente ramosa subnutante, spiculis late rhombeis 3—4-floris, floribus acutis muticis, foliis linearibus planis ligula oblonga obtusa, radice repente. RCHB. *Fl. germ.* 40. 256. KUNTH 406. 85. Koch

942. 21. *F. nutans* Host. *pulchella* Schrad. *spadicea* Melicun. *Schenodorus Scheuchzeri* et *nutans* R. S. *cernua* Schult. Oestr. Fl.

Folia plana glabra, radix repens, spiculae e viridi violaceae.

In pratis alpinis. Jul. Aug. 24.

325. Festuca spadicea L.: panicula patente, ramulis brevibus solitariis geminatisve, spiculis oblongis muticis 4—5-floris, glumella infera 5-nervi, germine apice pilosello. Rchb. Fl. germ. 40. 257. Kunth 406. 82. Koch 941. 18. *Anthoxanthum paniculatum* L.

Gramen speciosum bi—tripedale, foliorum vagina membranacea testacea, lamina plana tandem involuta, panicula spadicea. Cf. Fl. germ. exsicc. 1307.

In pratis montanis siccis in Tirol, Salisburgo, Carinthia, Carniola, in alpinis maritimis ad Valdieri, in Colle di Tenda, Sabaudia, Canton Tessin, Lombardia. Jul. Aug. 24.

CXL. **329. Festuca spectabilis** Jan.: panicula ampla nutante, ramulis subgeminatis ternisve scabris, spiculis 5—6-floris muticis axi glabro, glumellis acuminatis, supera trinervi carinata, infera 5-nervi, germine apice pilosello. Rchb. Fl. germ. exs. 2303. Deutschl. Flora Gräser. S. 31. Koch syn. 941. 17.

Radix fibrosa caespitosa, folia linearia, acuta, plana, supra scabriuscula, vaginae firmac, nitidae, spiculae virides et sulphureo-pallidae.

In M. Baldo: Jan, in latere Montis Pastello pr. Veronam 3000' Bracht. In Tirol australi ex alpe Seiseralpe ad M. Baldum usque, in regionibus frigidioribus in superiore cerealium regione, in calidioribus in subalpinis regionibus. Planta calcarea in calcis vicinitate etiam supra „Augitporphy“, in Tirol in Fiemme pr. Forno et Sommedo, in Fassa pr. Campitello, in M. la Gaze in agro Tridentino: Facchini. Castell Andraz in Tirol australi: Papperitz. Jun. Aug. 24.

CXXXVIII. **326. Festuca sylvatica** Vill.: panicula ramosissima diffusa erecta, ramis scabris, inferioribus quaternis ternis geminisve, spiculis sub-5-floris axi scabro, glumella superiore attenuata cuspidata scabriuscula 5-nervi, nervis tribus magis prominentibus, germine apice pilosello, vaginis infimis aphyllis, foliis lanceolato-linearibus supra glaucescentibus margine scabris, radice fibrosa. Rchb. Fl. germ. 40. 259. Kunth 405. 80. 941. 19. *F. calamaria* Sm. *decidua* Sm. E. Bot. 2266. *Poa sylvatica* Pollich. *trinervata* Schrad. *Bromus triflorus* Ehrh. *Tritic. teretiflorum* Wrb. *Schenodorus calamarius* R. S. *sylvaticus* Hrv.

CXXXIX. **327. F. latifolia** Host: nisi foliis latioribus gaudet.

Planta procer, spiculis demum pallide virentibus. Cf. Fl. germ. 40.

In silvis montanis, *F. latifolia* in alpinis Salisburgensibus. Mai—Jul. 24.

CXXXIX. **328. Festuca Drymeia** M. K.: panicula ramosissima diffusa cernua, ramis inferioribus ternis geminisve, spiculis sub-5-floris axi scabriusculo, glumella infera acuminata mucronata punctulata 5-nervi, nervis tribus crassioribus, germine apice pilosello, vaginis omnibus foliatis, foliis supra glaucescentibus margine scabris, radice stolonifera. *F. montana* (non Ström.). Rchb. Fl. germ. exc. 40. 261. *F. Drymeia* Kunth 450. 79. Koch 942. 20. *exaltata* Presl.

Affinibus procerior, panicula ditior et folia latiora. Stolonibus squamatis fere Caricis hirtae insignis.

In silvis montanis in Bohemia, Moravia, Austria et Hungaria. Jun.—Aug. 24.

d. *Schenodorus*: Foliis planis, spiculis teretiusculis.

CXLI. **330—33. Festuca pratensis** HUDSON: panicula secunda erecto-patente, ramis geminatis altero brevissimo uni-, altero 2—4-spiculato, spiculis lineari-oblongis 5—10-floris, glumis obtusis, glumella infera 5-nervi apice denticulata mutica v. mucronata, germine glabro, ligula abbreviata. RCHB. *Fl. germ.* 40. 262. KUNTH 404. 74. *F. elatior* LINN. suec. KOCH 943. 25. *Bromus elatior* KOEL. *pratensis* SPR. syst. *Poa curvata* KOEL. *Schenodorus pratensis* P. B.

Uni—tripedalis, laete virens, folia linearia, culmus erectus, spiculae virides, panicula haud raro ad racemum subspicatum ut in fig. 333. reducta, rarius spiculae mucronatae ut in fig. 332.

In pratis, ad agrorum versuras et vias, in montium locis graminosis. Mai—Jul. 21.

334. Festuca arundinacea SCHREBER: panicula diffusa cernua, ramis geminis ramulosis scabris multispiculatis, spiculis ovato-oblongis 4—5-floris, glumella inferiore mutica vel sub apice mucronata, germine glabro, foliis lanceolato-linearibus ligula abbreviata. RCHB. *Fl. germ.* 40. 263. KOCH 943. 24. *F. elatior* LINN. spec. et SM. KUNTH 404. 71. *littorea* WAHLB. *Bromus littoreus* RETZ. *arundinaceus* ROTH. *elatior* SPRENG. *Festuca spadicea* MÖNCH. *Schenodorus elatior* P. B. *Schedonorus arundinaceus* DUMORT. *Poa phoenix* SCOP.

CXXXVI. **319. β. incrustata** a CHARPENTIER: forma calcinata. *Fest. decolorans* M. K. KUNTH 404. 72. *Bromus decolorans* RCHB. *Fl. germ. exc.* 44. 290. *Fest. laxa* SERINGE non Host.

Procera, folia linearia, plana, panicula magna, spiculis viridi-violaceis.

In pratis inprimis ad ripas fluviorum intra frutices, β. ad catarractam calcaream in valle Lauterbrunn in Helvetia. Jun. Jul. 24.

CXLI. **335—36. Festuca inermis** DEC.: panicula late pyramidata erecta, ramis inferioribus senis—ternis, spiculis lineari-oblongatis, floribus lanceolatis, glumella inferiore apice bidenticulata e crena mucronata aut breve aristata 5—7-nervi, superiore margine subtiliter ciliolata, foliis glabris. RCHB. *Fl. germ.* 41. 264. *Bromus inermis* LINN. mant. KUNTH 412. KOCH 949. 13. *Festuca Leysseri* MÖNCH. *speciosa* SCHREB. spicileg. *poaeoides* THUILL. *poaeiformis* PERS. *Schenodorus inermis* R. S.

Gramen bi—tripedale et ultra, folia late linearia, panicula speciosa, antherae magnae croceae, spiculae viridi-violaceoque variae.

In graminosis ad ripas, agrorum versuras et margines silvarum et pratorum ipsisque in pratis. Jun. Jul. 24.

336b. Festuca longiflora (Bromus —us WILLD. En. suppl.): panicula elongato-pyramidata juniore cernua, spiculis longe pedunculatis nutantibus complanatis ultrapollicaribus pallentibus breve aristatis, foliis planis scabriusculis, radice repente. RCHB. *Fl. germ. exsicc.* 1313. *Bromus longiflorus* W. KUNTH 419. 45.

F. inermis altior 3—4-pedalis et ultra, illa mensis dimidium serius florens.

In pratis, ad sepes, in Flora Dresdensi pr. Burgstädtel inveni ex anno 1838. Jun. Jul. 24.

Lophochloa RCHB. Panicula subspicata cylindrica. Spiculae pedunculatae 2—5-florae. Glumae valvae lanceolato-acuminatae inferior minor. Glumella inferior carinata bifida, arista recta, superior bicarinata bicuspidata.

CXLII. **337. Lophochloa phleoides (Festuca — VILL.):** foliis planis villosis, thyrso cylindrico, spiculis 2—5-floris, gluma externa sub apice aristata, inferiore floris inferioris pilosa, superioris scabra. RCHB. *Fl. germ.* 42. 273. *Festuca phleoides* VILL. KUNTH 383. 12. *F. cristata* LINN. sp. *Trisetum phleoides* TRIN. *Bromus trivialis* SAV. *Koeleria phleoides* PERS. KOCH 913. 5.

Gramen habitu Phlei, cantius adspectum cum Bromi conformatione conveniens eiusque censum exordiens.

In siccioribus apricis declivibus locis in meridionali regione. Mai. Jun. ☉. Dalmatia, Croatia, Istria Liguria, Lombardia.

Bromus L. Spiculae multiflorae. Gluma bivalvis floribus infimis brevior. Glumella inferior sub apice aristata. Germen apice pilosellum, styli antice supra medium exordientes breves, stigmata plumosa e basi floris emersa. — Panicula. —

a. *Annu:* flores subaequales subdiaudri.

338. Bromus maximus DESF.: panicula laxa erecta, tandem cernua, spiculae petiolatae, longissimae, scabrae; glumae lanceolato-acuminatae, infera bifida septemnervis, arista glumam suam superante. RCHB. *Fl. germ.* 42. 277. *exsicc.* 1311. KUNTH 419. 34. Ultrapedalis, folia cum vaginis et culmus pilosus.

In siccioribus Apr.—Jun. ☉. Fiume: MÜLLER. Pola: PAPPERITZ. Mailand: de NOTARIS. Mantua: BARBIERI.

339. Bromus sterilis L.: panicula cernua, spiculis lineari-lanceolatis scabris, aristis rectis gluma longioribus. RCHB. *Fl. germ.* 42. 275. KUNTH 418. 44. KOCH 949. 14. *distichus* MOENCH. *grandiflorus* a. WEIG.

Satis procerus et laete viridis, folia pilosa, paniculae ramuli longissimi, spiculae magnae.

In ruderalis, cultis, ad vias, muros, sepes. Jun.—Aug. ☉.

340. Bromus tectorum LINN.: panicula nutante molliter pilosa, floribus tandem remotiusculis, aristis rectis glumellas aequantibus. RCHB. *Fl. germ.* 42. 274. *exsicc.* 1813. KUNTH 419. 46. KOCH 949. 15.

Gracilis laxis, superae pilosus, panicula secunda, spiculae rubellae aut violascentes. In ruderalis, arenosis. Mai. Jun. ☉.

341. Bromus rigidus ROTR.: panicula erecta clausa, spiculis subsessilibus oblongo-lanceolatis scabris extrorsum latioribus, gluma infera 7-nervi, supera bifida aristata, arista glumâ longiore recta; glumella superiore ciliata. RCHB. *Fl. germ.* 42. 278. KUNTH 419. 49. KOCH 949. 16. *rubens* HOST. *madritensis* VAHL. *villosus* FORSK.? *incrassatus* LAM.?

Adscendens, folia cum vaginis et culmus superne pubescens, spiculae e viridi rubellae. In siccioribus locis declivis. Mai—Jul. ☉. Istria, Dalmatia, Liguria.

342. Bromus madritensis L.: panicula erecta, spiculis pedunculatis oblongis apicem versus latioribus scabris, gluma infera sub-7-nervi, supera bicuspidata, nervo medio aristato, arista glumellam aequante recta, glumella supera ciliata. RCHB. *Fl. germ.* 42. 276. KUNTH 419. 50. *diandrus* CURT. KOCH 949. 17. *gynandrus* ROTR. *polystachyus* DEC. *multispicatus* R. S. *muralis* HUBS. *Rochelianus* OPITZ. *scaberrimus* BERT. *Festuca madritensis* DESF.

Adscendens, folia cum vaginis pilosella, culmus glaber, spiculae demum rubentes.
In siccis declivis. Mai—Jun. ☉. In Dalmatia, Istria, Lombardia, Liguria.

b. *Annu:* spiculae apicem versus attenuatae.

CXLIII. 343. Bromus arvensis L.: panicula patula cernua, spiculis compresso-lanceolatis glabris, floribus compactis, glumella infera 7-nervi aristam et superam glumam ciliatam aequante. RCHB. *Fl. germ.* 42. 297. KUNTH 417. 36. KOCH 947. 8. *versicolor* POLICH. *multiflorus* WEIG. *spiculitenuata* KNAFF.

Reliquis gracilior, folia cum vaginis pilosa, spiculae violaceo-variae, passim puberulae. In agris passim, in meridionali regione vulgarior. Mai. Jun. ☉.

343b. Bromus brachystachys HORRUGG: panicula sub et post anthesin erecto-patula, spiculis glabris ovato-lanceolatis ovalisve, floribus subrhombeis, fructiferis compactis margine se occultantibus, glumella inferiore 7-nervi margine supra medium obtusangula, superiorem subaequante, arista porrecta vix dimidiam aequante; vaginis inferioribus pilosis. KOCH 947. 7.

Ab affini *Br. molli* spiculis glabris, panicula post anthesin patula nec contracta, ramis elongatis, inferne senis pluribusve verticillatis, glumellis subaequalibus et antheris lineari-elongatis differt. Cum *Br. arvensi* comparatus radicem offert biennem, paniculam strictiorem, ramos validiores, flores breviores et latiores, aristas longe breviores tandem caryopsin obovato-oblongam glumellis paulo longiorem quam in *B. arvensi* lineari-teres et glumellis quarta parte brevior sit. Iisdem notis et glumellis subaequalibus a *B. patulo* distat.

Iconem auctor ipse dedit in *Flora bot. Zeit.* XVI. fl. 1. 1. nostram in supplemento dabimus.

In agrorum versuris pr. Aschersleben in prov. Magdeburg. Jun. ♂.

344. Bromus patulus M. K.: panicula patente cernua, spiculis lanceolatis longissimis complanatis glabris (rarius pubescentibus), glumella infera 7-nervi superam longe superante, aristas post anthesin patulis. RCHB. *Fl. germ.* 43. 280. KUNTH 415. 15. KOCH 947. 9. *multiflorus* DEC. *commutatus* K. et Z. catal.

Vaginae glabrae, culmus saepe violascens, spiculae passim violaceo-variae. Flores maturi distantes in *B. arvensi* compacti.

In agris passim, in palatinatu pr. Dürkheim, in regione fluvii Nahe. in Tirol in agris ad flum. Isongo pr. Flitsch, in Saxonia, Hungaria. ♂.

345. 346. Bromus mollis L.: panicula erecta ante et post anthesin contracta, spiculis oblongis subcompressis pubescenti-mollibus, floribus compactis, glumella infera 7-nervi superiorem superante aristam suam aequante. RCHB. *Fl. germ.* 43. 283. KUNTH 413. 7. KOCH 946. 5. Hebelatus pygmaeus: *B. nanus* WEIGEL.

Folia cum vaginis molliter pubescentia, spiculae suturate virentes rarissime glabrae, ut in iconibus nostris variantes numero florum et forma minus vel magis oblonga.

Ad margines pratorum, pascuum, ad vias et sepes, in cultis et ruderalis. Mai. Jun. ☉. ♂.

347. Bromus commutatus SCHRAD.: panicula laxa patente demum cernua, spiculis oblongo-lanceolatis, glumella in margine medio obtusangulo aristata aristam aequante, glumella supera longiore ciliata. RCHB. *Fl. germ.* 43. 281. KUNTH 414. 8. KOCH 946. 3. *simplex* GAUDIN. *secalinus* M. B. *volgensis* SPR.

Folia inferiora cum vaginis pilosa.

In pascuis, ad vias, in agris onobrycheis. Mai. Jun. ♂. Hamburg: SONDER. Barnth, Guben: RA-BENHORST. Zerbst, Sondersleben: SCHWABE. Gaithain, Rochsburg: RICHTER. Halle: SRENGEL. Rossleben: WALLROTH. Siehmen in Schwarzburg-Rudolstadt: SCHÖNHEIT. Blankenburg: HAMPE. Göttingen: SCHRADER. Grubenhagen, Hildesheim: F. W. MEYER. Kaiserslautern: SCHRADER. Mainz: ZIZ. Herfort: WEIHE. Töplitz: G. RECH. fil. Schweiz: GAUDIN.

- 348. Bromus racemosus** L.: panicula racemosa laxa patula erecta demum cernua, spiculis longius pedunculatis, ovato-oblongis compressis glabris, floribus compactis, glumella infera margine ovali superam superante aristas porrectas aequante. RECH. *Fl. germ.* 43. 282. KUNTH 413. 4. KOCH 946. 4. *hordeaceus* LINN. spec. 1. *pratensis* ENRH. *multiflorus* ROTH. (*simplex* GAUD. agrost. teste GAUD. *Fl. helv.*) Gaudini R. S.

Folia inferiora cum vaginis pilosa.

In pratis, agris, ad vias. Mai. Jun. ♂. passim gregarius.

- 349. Bromus confertus** M. B.: panicula erecta oblonga conferta ante et post anthesin contracta, spiculis oblongis plus minus pubescentibus, antrorsum scabris, floribus oblongis margine demum occultato compactis; glumella infera sub-7-nervi aristam demum arcuato-patentem subaequante superam superante. RECH. *Fl. germ.* 43. 284. KUNTH 414. 9. KOCH 947. 6. *intermedius* GESS. *erectus* MORIS. *alopecuroides* MORIS.

Humilis, folia ciliata. Variat pube.

In Istria, in alluvio ad Campo marzo: TOMMASINI. San Andrea: PAPPERITZ. Amphitheater b. Pola: BRASOLETTO. Apr. Mai. ☉. Specimina Sardo a P. THOMAS lecta graciliora.

- CXLIV. **350. Bromus multiflorus** SMITH Engl. Bot. 1884.: panicula ampla demum nutante, spiculis magnis ellipsoideis compressis, floribus fructiferis margine se amplectentibus, glumella infera 7-nervi aristam aequante superam glumellam subsuperante, vaginis glabris. RECH. *Fl. germ.* 43. 285. *B. grossus* β. GAUD. agr. *grossus* α. M. K. *secalinus* α. *grossus* KOCH 945.

Bi—tripedalis, robustior. Spiculae glabrae: *B. nitidus* DUMORT. aut velutinae: *velutinus* SCHRAD. KUNTH 413. 3. Folia pilosella.

Intra segetes, in Belgia: LEJEUNE, in Palatinato: KOCH. Heidelberg: DIERBACH. Zweibrücken: MÜLLER. Zürich: REGEL. Helv. merid.: SCHLEICHER. Jun. Jul. ♂.

- 351. Bromus arduennensis** KUNTH: erectus glaber, foliis margine pilosis, subtus glabris laevibus, panicula patente demum nutante, spiculis compressis glabris, glumellae inferae ala membranacea in medio rectangula, triaristata, arista media glumellam aequante. KUNTH 416. 27. KOCH 945. *B. multiflorus* var. b. RECH. *Fl. germ.* 43. 285b. — *Br. auriculatus* et *Libertia arduennensis* LEJ. *Michelaria bromoidea* DUMORT. *Br. triaristatus* LOIS.

Variat ut vicini spiculis velutinis.

In agris provinciae Leodiensis, in den Ardennen bei Aiwaille: MICHEL. LEJEUNE! Jun. Jul. ♂.

- 352. Bromus divaricatus** ROUGE: panicula erecta racemosa, ante et post anthesin contracta, spiculis lanceolatis 10—15-floris, glumella infera 7-nervi, superiore latiore longioreque, bicuspidata patenti-aristata. RECH. *Fl. germ.* 43. 286. KUNTH 415. 17. *lanuginosus* POIR. *turgidus* PERS.

Gracilis, spiculae flavo-virentes apicibus violaceo-rubellae, aristae concolores.

In siccis ad vias. Jun. ☉. ♂? pr. Nicaeam, Villa franca: SONDER, ad portum versus Hospitium: G. RECH. fil. — Specimina ad Perpignan, Montpellier, Toulon, am Luc lecta conveniunt. Subest var. spiculis longe sericeo-velutinis.

353—54. *Bromus secalinus* Linn.: panicula demum graviter nutante, spiculis ovato-fusiformibus compressis, glumis tandem involutis (nec tegentibus) aristis subnullis brevibusve. *Rehb. Fl. germ.* 44. 388. *Kunth* 413. 2. *Koch* 945. 2. *arvensis* Fl. Dan. 293. *vitiosus* Weig.

Var. a. ***badensis* Gm.:** spiculis et aristis iisdem, tantum illis hirtellis.

b. ***hordaceus* Gm.:** spiculis minoribus puberulis longius aristatis.

c. ***elongatus* Gaedn.:** spiculis glabris longe aristatis arista recta.

d. ***divergens* Rehb.:** spiculis glabris longe aristatis arista patente: *B. thuringiacus* Heynh.

Habitat in agris intra segetes ubique. Var. d. rarius occurit in cultis montosis in agro Variscorum et Hungaria: Adler et Geyer. Jul. Aug. ☉.

355—56. *Bromus squarrosus* L.: panicula apice cernua, spiculis velutinis lanceolatis complanatis, floribus teretiusculis, glumellis demum amplectentibus, infera 7-nervi, margine obtusangulo rotundata, superiore multo latior longiorque aristam demum contorto-patentem subaequante. *Rehb. Fl. germ.* 43. 287. *Kunth* 414. 14. *Koch* 948. 10. et spiculis villosis: *villosus* Gm. *squarrosus* Host. *hirsutus* Schrank.

In agrorum versuris, collibus, vineis in regione meridionali. Mai—Jul. ♂.

e. *perennes:*

CXLV. **357. *Bromus asper* L.:** panicula nutante, spiculis lineari-lanceolatis compressis hirtellis 7—9-floris, floribus lanceolatis demum distantibus, glumella infera 5-nervi aristâ brevior superam ciliatam superante; foliis vaginisque hirsutis. *Rehb. Fl. germ.* 44. 293. *Kunth* 414. 11. *Koch* 948. 11. *hirsutus* Curtis. *montanus* Pollich. *montanus* et *asper* Gm. bad. *ramosus* Murr. *nemoralis* Heds. *nemorosus* Vill. *altissimus* Web. Holsat. *Festuca aspera* M. K.

Elatius robustus hirsutus.

In nemorosis inter frutices et sub arborum umbra. Jun. Aug. 24.

358. *Bromus giganteus* L.: foliis medio profunde carinatis, panicula ampla nutante, ramis paucispiculatis, spiculis lanceolatis compressis glabris, floribus densis, glumella infera 5-nervi aristâ subbreviore superam aequante. *Rehb. Fl. germ.* 44. 289. *Festuca gigantea* Vill. *Kunth* 407. 91. *Koch* 942. 22. — β . *triflorus* L. *Fest. triflora* Sm. Engl. Bot. 1918.

Elatius gracilis ambigit inter Festucas Bromosque.

In nemoribus, vallibus inprimis ad rivulos, flavios et stagna. Jun.—Aug. 24.

CXLVI. **359. *Bromus laxis* Hornem.:** panicula sub anthesi nutante, spiculis demum pendulis compressis nitidis, floribus distantibus, glumellis aristam superantibus, foliis laxis pilosis ciliatis. *Rehb. Fl. germ.* 44. 292. *Kunth* 419. 47.

Medius inter *B. asperum* et *erectum* nec cum alterutro rite pungendus.

In Saxonia metallifera in arce Frauenstein: Weigelt. Jun.—Aug. 24.

360. *Bromus erectus* Hudson: foliis anguste linearibus ciliatis, panicula erecta demum subnutante, ramulis infimis quaternis—senis, spiculis lineari-lanceolatis planis 5—12-floris, floribus lanceolatis densis, glumella infera 5-nervi aristam et superiorem glumellam ciliatam superante. *Rehb. Fl. germ.* 44. 291. *Kunth* 418. 42. *Koch* 948. 12.

agrestis ALL. *perennis* VILL. *angustifolius* SCHREK. *arvensis* POLL. *montanus* FL. WETT.
pratensis GM. *pseudarvensis* KOEL. *Festuca hirta* SEEXUS. *montana* SAVI.

In pratis, collibus graminosis. Jul. Aug. 24.

Dactylis LINN. Panicula glomerata secunda. Spiculae breve pedunculatae 3—pluriflorae. Flores introrsi, gluma bivalvis inaequalis, valva inferior longior, utraque cuspidata uninervis. Glumellae carinatae: inferior maior 5-nervis cuspidato-aristata, superior trinervis acuminata.

CXLVII. **361. Dactylis maritima** SUFFR. SCHRAD.: panicula subspicata, ramulis brevibus rigide arrectis, spiculis distichis subsessilibus 3—10-floris, glumella infera 9-nervi, culmis simplicibus e nodis adscendentibus, foliis distichis, turionibus prostratis. RCHB. *Fl. germ.* 36. 227. *D. littoralis* WILLD. KOCH 934. 2. *Poa littoralis* KUNTH 324. 1. *Festuca littoralis* SIETH. Fl. graec. *Dact. distichophylla* BRIGNOLI. *repens* DESF. *Agrostis pungens* PALL. *Triticum supinum* SCHREK. *Poa pungens* M. B. *tunetana* SPB.
Humilis-viridi glaucescens rigidula.

In arenosis maritimis. Jun — Aug. 24. Venedig: BRIGNOLI. Triest: WELWITSCH. Osero: NOB
Insel Caorle: SIEBER.

362. Dactylis hispanica ROTH: panicula secunda glomerato-subspicata semicylindrica, spiculis subtrifloris, foliis carinatis glaucescentibus. RCHB. *Fl. germ.* 36. 228. KUNTH 386. 3. *D. glom. β. hispanica* KOCH 943. *D. cylindrica* BROT. *villosa* TENORE. *Festuca phalaroides* LAM.

In arenosis apricis littoralibus regionis meridionalis. Jun. Jul. 24.

363—64. Dactylis glomerata LINN.: panicula pyramidalis spiculis in apice ramulorum sub anthesi divergentium glomeratis, gluma infera 5-nervi; culmo erecto, radice fibrosa. RCHB. *Fl. germ.* 36. 229. KUNTH 386. 1. *Festuca glomerata* ALL. *Bromus glomeratus* SCOP. — Var. *D. glaucescens* WILLD. EN. *altaica* BESS.

363. abbreviata BERNH.: panicula ovata abbreviata, glomerulis subsessilibus. Humilior et e semine immutata.

In pratis, agrorum versuris et locis graminosis nec non in nemoribus. Jun. Jul. 24.

Cynosurus LINN. Panicula confertim thyrsoides secunda. Spiculae sessiles 2—5-florae, spicula quaeque bracteata, bracteis pectinato-distichis denticulatis. Glumae aequales uninerves acuminatae. Glumella membranacea, inferior 3—5-nervis, acutata aut aristata, superior bicarinata emarginata.

CXLVIII. **365. Cynosurus echinatus** LINN.: annuus, panicula contracta ovato-subrotunda, spiculis aristatis. RCHB. *Fl. germ.* 17. 71.

Icon. tab. CXLVIII. Figura altera a dorso, altera a facie adspicitur. A. spicula cum processu spiculae sterilis. B. spicula florens aperta.

In agris, ad vias et colles. Mai. Jun. ☉. In regione meridionali.

366. Cynosurus cristatus LINN.: perennis, panicula lineari-oblongata, spiculis multiceis. RCHB. *Fl. germ.* 17. 72.

In pratis, agrorum versuris, locis graminosis in planitie montibusque. Jun. Jul. 24.

Chrysurus PERS. Panicula contracta secunda e spiculis fertilibus sterilibusque. Spiculae fertiles pedunculatae biflorae, flos inferior hermaphroditus superior neuter, glumae aequales lanceolatae aculae spiculam subaequantes. Glumella infera 5-nervis carinata, bienspidata aristataque, superior bicarinata bienspidata. Spiculae steriles e glumis 3—8-distiche compactis.

CXLIX. **367. Chrysurus aureus** P. B.: foliis scabris, ligula magna denticulata, spiculis flavo-virentibus nitidulis. RECHB. *Fl. germ.* 36. 223. *Lamarkia aurea* MOENCH. KUNTH 389. 1. KOCH 914. 1. *Cynosurus aureus* L.

Icon. tab. CXLIX. Subest figura aucta ramulorum, quibus ad basin bractearum sterilium adstat spicula fertilis, quae supra magis aucta explicatur, glumis remotis singularis et flosculo sterili pedicellato.

In lapidosis in Istria, pr. Genuam et Niexam. Apr. Mai. ☉.

Sclerochloa P. B. Panicula contracta, pedunculi articulo-inserti crassi. Spiculae subsessiles pluriflorae. Gluma floribus brevior, inferior brevior 1-nervis, superior trinervis, glumellae subaequales, inferior mutica trinervis, superior bicarinata emarginata.

368. Sclerochloa dura P. B.: panicula ovato-conferta secunda, spiculis singulis, lanceolato-obtusis 3—5-floris, gluma infera 5-nervi. RECHB. *Fl. germ.* 36. 224. *Sesleria dura* KUNTH 323. 12. *Poa dura* SCOP. KOCH 925. 2. *Cynosurus durus* L. *Eleusine dura* LAM. *Festuca dura* VILL.

Humilis prostrata, colore fere Poae annuae.

In arenosis humidis lutosi, in pascuis, inundatis, ruderatis gregaria. Mai. Jun. ☉.

369. Sclerochloa procumbens P. B.: panicula oblonga contracta secunda, spiculis oblongis, ramulis erectis 6—7-spiculatis, spiculis 4—5-floris; glumis obtusis nervosis inaequalibus; floribus obtusis, glumella infera 5-nervi; foliis planis mollibus, culmis adscendentibus. RECHB. *Fl. germ.* 140³. 242b. *Festuca procumbens* KUNTH 393. 6. *Poa procumbens* CURTIS. *rupestris* WITH. *Glyceria procumbens* SMITH.

Amsterdam: HALL. Venedig: RUCHINGEB. Aug. Sept. ☉.

370. Sclerochloa rigida LIXX.: adscendens, panicula oblonga, rami distichi secundi trispiculati, spiculae breviter petiolatae lineari-lanceolatae 5—12-florae, flores lineares, gluma 5-nervis. RECHB. *Fl. germ.* 26. 225. *Festuca rigida* KUNTH 392. 5. KOCH 936. 3. *Poa rigida* LIXX. *Glyceria rigida* SMITH. *Megastachya rigida* P. B.

Præcedente gracilior ex omni parte, saturate viridis.

In siccis graminosis, ad vias, vineas in regione meridionali et passim: Aachen, Jena. Mai. Jun. ☉.

371. Sclerochloa maritima RECHB.: panicula dichotoma, rami breves, articulati, spiculae oblongae teretes solitariae 5—9-florae, glumae aequales, inferior 7-nervis, superior 5-nervis, glumellae aequales, inferior latior trinervis carinata, superior bicarinata, culmi adscendentes. RECHB. *Fl. germ.* 36. 226. *Festuca maritima* DEC. KUNTH 392. 4. *lanceolata* et *dichotoma* FORSK. *Sclerochloa dichotoma* LIXX. *Brachypodium maritimum* R. S.

Icon. tab. CXLIX. Planta integrâ paniculis duabus ante anthesin, media sub anthesi, infra ramulus cum flosculis explicatis.

In littorali belgico. Jun. Jul. ☉.

Molinia SCHRANK. Panicula. Spiculae 2—4-florae, flos terminalis latuus. Gluma inferior minor, glumella infrorsa basi ventricosa extrorsa semicylindrica apice integra. Ovarium glabrum. Semen bicuspidatum. — Culmus basi tantum uninodis, folia stricta. —

CL. **372. Molinia coerulea** MICHX.: panicula contracta, spiculis areolis arrectis subtrifloris atro-violaceis, glumis obsolete trinerviis, foliis utrinque laeviusculis novemnerviis. RECHB. *Fl. germ.* 44. 294. KUNTH 379. KOCH 933. 1. *varia* SCHRANK. *Aira coerulea* L. spec. *atrovirens* TURILL. *Melica coerulea* LINN. mant. *Enodium coeruleum* GAUD. *Festuca coerulea* DE C. *Hydrochloa coerulea* HARTM.

In pratis ndis. Jul. Aug. 24.

373. Molinia littoralis HOST: panicula virgata, spiculis remotis bi—trifloris variegatis, glumellis distincte trinerviis, foliis utrinque scabris caesiis tredecimnerviis. RECHB. *Fl. germ.* 44. 295. *arundinacea* SCHRANK. *Melica coerulea major* ROTH. *Enodium altissimum* LINN. EN.

Omnino distincta species, quam praecedens, licet procerior occurrens nusquam hujus paniculam, spiculas, flores et folia offerret.

In paludibus silvaticis nec non ad rivulos in silvis. Jul. Aug. 24.

Catabrosa P. B. Panicula ramulosa. Spiculae subbiflorae. Gluma bivalvis, valvae inaequales obtusae obovato-rhombeae crenatae. Glumella inferior trinervis apice rotundata carinata, superior binervis bicarinata apice subtriloba. Caryopsis stipitata.

374. Catabrosa aquatica P. B.: panicula aequali diffusa, spiculis lineari-oblongis, radice repente. KUNTH 369. 1. *Glyceria airoides* RECHB. *Fl. germ.* 45. 296. *Aira aquatica* LINN. sp. *Poa airoides* KOEL. *Molinia aquatica* WILB. *Hydrochloa airoides* HARTM. *Glyceria aquatica* SM. KOCH 933. 7. *Colpodium aquaticum* TRIN.

Culmus procumbens adscendens, folia molliter membranacea, spiculae violaceae.

Icon. tab. CL. Planta integra cum spicula et valvis:

Ad fontes, in rivulis, paludibus imprimis salinis passim. Jan. Jul. 24.

Glyceria R. BR. Panicula patenti-divergens ramis remotis simpliciusculis. Spiculae pluriflorae tereti-compressae. Gluma inaequalis floribus brevior. Glumella oblonga obtusa, inferior carinata 5—7-nervis ventricosa, superior bicarinata. — *In sola Gl. aquatica rami definite ramulosi sunt.* —

CLL. **375. Glyceria distans** WAHLNB.: paniculae verticillis longe distantibus, ramis inferioribus quinis post anthesin divergentibus, spiculis 3—6-floris, glumis ovato-oblongis obtusis obsolete 5-nerviis. RECHB. *Fl. germ.* 298. KOCH 932. 4. *Poa distans* LINN. mant. *salina* POLICH. *retroflexa* CURT. *arenaria* RETZ. *arenaria a.* TRIN. *Molinia* et *Hydrochloa distans* HARTM. *Aira aquatica* β . HUDS. *Festuca distans* KUNTH 932. 4.

376. β . capillaris: *Glyceria capillaris* WAHLNB. HARTM.: ramis tenuioribus, floribus acutioribus.

Adscendens, obliqua, caesia, radix fibrosa, spiculae saturata virentes margine albidomembranaceae.

Ad salinas, in fossis. Mai. Jul. 24.

377. *Glyceria maritima* WAHLNB.: panicula patente, fructifera contracta, ramulis verticillorum infimorum 2—3, spiculis lineari-oblongis 4—6-floris, gluma obtusa nervosa, turionibus prostratis, radice repente. RCHB. *Fl. germ.* 46. 299. KOCH 933. 6. *Poa maritima* HUDS. *arenaria* γ. TRIN. *Hydrochloa* et *Molinia maritima* HARTM. *Festuca thalassica* KUNTH 394. 12.

In littorali regionis septentrionalis. Jun. Jul. 24.

CLII. **378. *Glyceria festucaeformis* HEYNH.:** panicula aequali patente, ramis inferioribus subquinis, fructiferis arceolis, spiculis 5—9-floris, floribus lineari-oblongis obsolete 5-nerviis subtrienatis; culmo simpliciter, turionibus nullis, radice fibrosa. RCHB. *Fl. germ.* 45. 297. *Poa festucaeformis* Host. *arenaria* β. TRIN. *Festuca palustris* SEENUS. *Hostii* KUNTH 393. 7.

In littorali adriatico ad salinas: Venedig, Triest. Jun. Jul. 24.

379. *Glyceria aquatica* SMITH: panicula ampla aequali, spiculis subteretibus 5—9-floris, floribus 7-nerviis, radice repente. RCHB. *Fl. germ.* 45. 301. KUNTH 367. 1. *spectabilis* M. K. KOCH 933. 6. *Poa aquatica* L. *altissima* MICHX. *Hydrochloa aquatica* HARTM.

Gramen speciosum, procerum.

Culmus basi tantum adscendens tunc erectus. Folia canaliculata. Spiculae mox fuscescentes.

In stagnis, paludibus, lacubus, ad fluvios. Jul. Aug. 24.

380. *Glyceria fluitans* R. BR.: panicula longissima secunda, ramis subbinatis divergentibus, ante et post anthesin adpressis, gluma obtusa 7-nervi, foliis junioribus simpliciter complicatis, radice repente. RCHB. *Fl. germ.* 45. 300. KUNTH 367. 3. KOCH 932. 3. *Festuca fluitans* L. *Poa fluitans* Scop. *Hydrochloa fluitans* HARTM. *Devauxia fluitans* P. B. mscrpt.

Adscendens culmo ad extremam usque paniculam obliquo. Folia natantia.

Icon. tab. CLII. paniculae post anthesin delineatae additur segmentum ex alia florente cum ramo divergente, praeterea pedicellus cum valvis, flos apertus, semen et radix repens.

In fossis, stagnis, lacubus, rivulis, ad fontes. Jun.—Aug. 24.

CLIII. **381. *Glyceria plicata* FRIES:** panicula erecta, ramulis inferioribus ternis, spiculis 5—11-floris, gluma 7-nervi obtusa denticulata, foliis novellis repetito-plicatis RCHB. *Deutschl. Flora. Gräser* S. 37. 381.

Specimen iconis originale e manu ill. FRIESII. Folia repetito-plicata nondum accepti.

In aquis stagnantibus, in Holsatia pr. Oldesloe: SONDER. Jun. Jul. 24.

***Sphenopus* TRINIUS.** Panicula. Spiculae in pedunculis cuneatis 3—4-florae, flores pedunculati remotiusculi, axi articulo. Glumae parvae, inferior minor. Glumella infera concava obtusa trinervia, superior bicarinata emarginata.

CLIV. **382. *Sphenopus divaricatus* RCHB.** Sola species, gramen e tenuioribus ramis trichotomis, foliis anguste linearibus. RCHB. *Fl. germ.* 45. 302. *Poa divaricata* GOUAN. *expansa* GM. syst. *Sclerochloa divaricata* P. B. *Sphenopus Gouani* TRIN. *Festuca expansa* KUNTH.

In arenoso littorali, in Belgia pr. Tournay. Mai. Jun. ☉.

Poa LINN. Panicula. Spiculae complanae ovals 3—pluriflores in axi articulo pilosello. Glumae floribus breviores muticae, inferior brevior uninervis, superior trinervis. Glumellae muticae, inferior carinata 5-nervis, superior bicarinata ciliata.

CLIV. **353. Poa concinna** GAUDIN: panicula ovata erecta patente, ramulis scabris infimis binatis reliquis subsolitariis, spiculis ovatis acutis 9—10-floris, floribus pilosellis non lanato-intertextis; foliis angustissime linearibus subsetaceis, culmo basi bulboso, radice fibrosa. RCHB. *Fl. germ.* 46. 304. KUNTH sub. *P. bulbosa* 352. KOCH 927. 7. *P. carniolica* HÖST.

Accedit ad *P. bulbosam* sed bulbos non prolifer et folia longe angustiora subsetacea, culmeum folium lineare nec lanceolatum, spiculae pluriflores magis ac illius et flores lana non intertexti.

In arenosis siccis in Vallesia: Montorge, Tourbillon, Branson, St. Leonard etc.: in Carniolia: *P. carniolica* HLADN., FREIER, in Istria: Parenzo: PAPPERITZ. Nizza Col di Tenda: G. RCHB. fil. Apr. Mai. 24.

CLVI. **394. Poa pumila** HÖST: panicula erecta divaricata ramis scabris geminis solitariisque ramulisque subrectangule divergentibus, spiculis sub anthesi subaequaliter sparsis ovatis subsexflores, floribus lanceolatis puberulis liberis, foliis angustissime linearibus. RCHB. *Fl. germ.* Add. 140⁴. 302. KOCH 926. 6.

Floribus vix unum alterumve filum intertextum est et inprimis paniculae divaricatione differt a simili *P. concinna*.

In Carniolia in arena ad Fl. Germade pr. Billichgratz: GRAF et FREIER. Apr. Mai. 24.

CLIV. **385—86. Poa bulbosa** LINN.: panicula oblonga erecta patente, ramulis scabris solitariis geminisve, spiculis ovalosubrotundis 3—6-floris, floribus oblongo-lanceolatis pilosellis, lana intertextis; radice fibrosa, culmo basi incrassato-bulboso. RCHB. *Fl. germ.* 45. 303. KUNTH 352. 173. KOCH 927. 8.

Folium culmeum lanceolatum. Saepissime et in regionibus quibusdam semper *β. vivipara* cf. ic. nostr. 386.

In arenosis ad vias, colles, agrorum versuras. Mai. Jun. 24.

CLV. **387—88. Poa annua** LINN.: panicula patente subseunda, ramis laevibus solitariis geminisve demum patenti-divergentibus, spiculis ovatis 3—7-floris glabris, culmo subcompressa, radice fibrosa bienni.

388. P. supina SCHRAD.: forma montana spiculis violaceo-variegatis.

In pratis, graminosis, in ruderalis, cultis et locis saxosis, in viis plateisque inter stratos lapides. Apr.—Oct. ♂ rarius ☉.

389. Poa minor GAUDIN: panicula oblonga laxa cernua, ramulis laevibus subcapillaribus solitariis geminisve, spiculis oblongis 4—6-floris, floribus lanceolatis dense pilosellis, basi lana intertextis, radice fibrosa. RCHB. *Fl. germ.* 46. 307. KUNTH 350. 164. KOCH 926. 5. *supina* PANZ. ap. STURM. *tenella* et *discolor* HOPPE.

Panicula tenerrima vacillans.

In alium petrosis, in pascuis atque fissuris. Jul. Aug. ♂ vix unquam ☉.

CLVI. **390—93. Poa alpina** LINN.: panicula ovata—pyramidalis patente, ramis geminatis, spiculis oblongis 4—10-floris, floribus lanceolato-acuminatis pilosellis lana vix

intertextis; turionibus cum culmo serialibus. REHB. *Fl. germ.* 308. KUNTH 350. 168. KOCH 927. 9.

390. *P. badensis* HAENKE: panicula ovato-contracta, foliis linearibus rigidulis. Forma collina: *P. collina* HOST, *trivialis* POLLICH. *Koeleri* DEC. *brizoides* WAHLNB. *thermalis* PERS. *Molinieri* BALB. *cenisia* LINK. REHB. *Fl. germ.* 46. 309. *compressa* FRVILLE.

391. *P. brevifolia* DEC. *alpina brevifolia* GAUD.: panicula ovato-contracta, foliis radicalibus culmeisque brevibus latis.

391. γ . *P. flavescens* THOMAS: forma alpina spiculis flavescentibus.

392. *P. alpina* LINN.: planta normalis genuina panicula pyramidalis spiculis variegatis.

393. *P. frigida* GAUDIN: spiculis minus multifloris, foliis magis confertis. Forma glacialis. In alpinis et subalpinis pratis, pascuis rubipusque. Jul. Aug. 24.

CLVII. **395—96. *Poa laxa*** HÄNKE: panicula laxa contracta cernua, ramis subsolitariis laevibus filiformibus, spiculis ovali-rhombeis subtrifloris, floribus lanceolatis, glumellis pilosellis lana basi subnulla intertextis; foliis linearibus; radice fibrosa. REHB. *Fl. germ.* 46. 306. KUNTH 349. 162. KOCH 926. 4.

Humilis, saepe culmi laterales repentes et proliferi. Etiam huius var. *flavescens* lecta est a cl. THOMAS.

In rupibus alpium, Sndetorum et in M. Beichen im Schwarzwalde. Jul. Aug. 24.

397. *Poa cenisia* ALLIONE: panicula patentissima, ramulis scabriusculis laevibusve, spiculis ovali-rhombeis 3—5-floris, floribus lanceolatis, dorso dense pilosellis, basi lana densa intertextis, foliis distichis patentibus; radice stolonibusque repentibus. KUNTH 350. 165. *P. distichophylla* GAUDIN. REHB. *Fl. germ.* 46. 310. *stolonifera* BELLARD.

398. β . *flexuosa*: panicula aequaliter patentissima diffusa, ramis ternis geminisve laeviusculis flexuosis. *P. flexuosa* WAHLNB. KUNTH 350. 166.

CLVIII. **399. γ . *Halleri***: maerior laecida in umbrosis enata. *P. Halleridis* (!) R. S. KUNTH 350. 167. *pallens* GAUD. *P. cenisia* γ . *pallescens* KOCH 931.

In lapidosis rupibusque in Tirol, Bavaria, Helvetia, Pedemontio. Jul. Aug. 24.

CLVIII. **401. *Poa compressa*** LINN.: panicula oblonga conferta subsecunda, ramulis scabris quinis geminisve, spiculis oblongis ovatis 5—9-floris, floribus vix pilosellis, axi paucilanato; culmo adscendente compresso, ligula brevi truncata; radice stolonosa. REHB. *Fl. germ.* 47. 314. KUNTH 355. 190. KOCH 931. 18. *muralis* WIBEL.

402. β ? *Langeana* REHB. *Fl. germ.* 140⁴. 314b.: panicula aequali laxa, spiculis rhombeis 5—6-floris, culmo basi repente compresso, ligula oblonga rotundata. KUNTH 357. 175. *compressa* β . *Langeana* KOCH 932. *compressa* β . *effusa* TAUSCH pl. select.

Humilis spithamea, pedalis adscendens obliqua dura, β . contra bipedalis et laxior inprimis ligulae productae forma videtur distincta.

Icon. tab. CLVIII. subest figura segmenti culmi et vaginae cum ligula.

In muris, ruderalis, rupibus, ad ripas. β .: im Badener Oberlande auf den Jurakalkfelsen des Isteiner Klotzes am Rhein: LANG, Stadtpfarrer in Mühlheim. Jun. Jul. 24.

- 400. *Poa caesia* SMITH:** caesia, panicula conferta patente, ramis scabris, inferioribus quinis, floribus obsoletenerviis, vix pilosellis, vagina internodium superante, summa folio longiore, radice fibrosa. RECHB. *Fl. germ.* 47. 313. KOCH 928. 10. *nemoralis* 9. *caesia* KUNTH 354. *glauca* POIR. *glaucanthos* SCHLEICH. *glauescens* ROTH.

Planta quae culturâ non mutatur.

In alpinis apricis et in subalpinis in Silesia: am Altvater u. Köpernick, Petersstein, Kessel im Gesenke, Sudeten. Jul. Aug. 24.

- CLIX. **403 — 9. *Poa nemoralis* LIXX.:** panicula regulari patente, ramis scabris quinibus — binis; spiculis ellipsoideis 2 — 5-floris scabriusculis, glumis obsoletenerviis obtusiusculis; culmo vaginisque glabris, vagina summa folio divergente brevior; radice caespitosa prolifera. RECHB. *Fl. germ.* 47. 315.

403. subuniflora: tenuissima spiculis paucis subunifloris.

404. tenella: panicula patentissima tenuissima, spiculis subbifloris.

405. vulgaris: panicula effusa, spiculis rhombo-lanceolatis plurifloris.

406 — 8. montana — coarctata — firmula: panicula plus minus contracta.

409. glauantha: spiculis glaucescentibus.

In nemoribus, rupibus, muris. Jun. Jul. 24.

- CLX. **411 — 12. *Poa fertilis* Host:** panicula regulari oblonga diffusa, ramis scabris inferioribus quini-verticillatis, spiculis ovato-lanceolatis 2 — 5-floris, glumis obsoletenerviis; culmo vaginisque laevibus, ligula oblonga acuta; radice caespitosa. RECHB. *Fl. germ.* 47. 316. *P. angustifolia*, KUNTH 353. 180. KOCH 929. 12. *effusa* KIT.

Spiculae virides, glumae et glumellae testaceo-marginatae.

410. palustris ROTH: elatior saturate virens, panicula spiculisque majoribus. *P. serotina* EHRH. *angustifolia* WAHLNB. non L.

In fossis, ad vias, in rivulis paludibusque. Jul. Aug. 24.

- CLXI. ***Poa pratensis* L.:** panicula regulari pyramidata, ramulis semiverticillatis quinibus scabris divergentibus; spiculis ovatis 3 — 5-floris, axi lanato, gluma nervosa acuta pilosella; culmo vaginisque laevibus, ligula brevi truncata, folio summo brevi arrecto, radice repente. RECHB. *Fl. germ.* 47. 317. KUNTH 352. 176. KOCH 931. 16. *glabra* EHRH.

413a. angustifolia: foliis angustissime linearibus: *P. angustifolia* LIXX. sp. *setacea* HOFFM.

414b. strigosa: panicula contracta: *P. strigosa* HOFFM.

415c. latifolia: soli pinguioris proles procera.

416d. humilis: eadem forma humilior montana: *P. humilis* EHRH. *subcoerulea* SM. *depressa* PRESL.

417e. variegata: gracilis in saxosis siccioribus et apricis enata spiculis viridi et violaceo variegatis.

In graminosis, a. b. et c. in siccioribus, c. et d. in locis pinguibus vel certe pluviis roreque frequentius humectatis. Jul. Aug. 24.

CLXII. **418—20. *Poa trivialis* L.:** panicula aequali oblonga divergente, ramis quinis scabris; spiculis ovalis, axi vix pilosello, gluma nervosa ligulaque oblonga acuta, vagina scabra, radice fibrosa. RCHB. *Fl. germ.* 48. 318. KUNTH 352. 174. KOCH 930. 15. scabra EHRL. dubia LEERS. pratensis POLICH.

In solo pingui, in pratis inprimis in fossis humidis ad rivulos, stagna, paludes. Jun. Jul. 24.

CLXIII. **421—22. *Poa sudetica* HÄNKE:** panicula regulari divergente, ramis scabris, spiculis ovato-lanceolatis subtrifloris, gluma externa nervosa glabra aut basi lanata; foliis late linearibus basi in vaginam ancipitem contractis, turionibus sub anthesi vegetis. RCHB. *Fl. germ.* 48. 320. KUNTH 351. 170. KOCH 930. 13. rubens MOENCH. quadripedalis EHRL. sylvatica VILL. trinervata DEC. nec EHRL.

423. *β. P. remota* FORSELLES: ramis paniculae magis effusae valde elongatis apice cernuis. *P. sudetica β. remota* FRIES.

Inter frutices: in Holstein, Lauenburg, Thüringen, Erzgebirge, Riesengebirge, Glatzer Gebirge, in schlesisch-mährischen Geseuke, Göttingen, Harz, Franken, Hessen, Coburg, Eupen, Schwarzwald, durch die ganze Alpenkette in den Voralpen und in den Seealpen. Jul. Aug. 24.

423b. *Poa hybrida* GAUDIN: panicula regulari patenti-diffusa, ramis scabris inferioribus quinis, spiculis ovato-lanceolatis 3—5-floris, gluma 5-nervosa glabra basi sublanata; foliis lanceolato-linearibus attenuato-acutissimis, vaginis ancipitibus ligula brevi, turionibus complanis sub anthesi subemarcidis. RCHB. *Fl. germ.* (excl. *Poa remota*) 48. 319. KUNTH 351. 172. KOCH 930. 14. *Festuca montana* STERNB. et HOPPE.

Inter frutices in vallibus alpinis rarior. Jul. Aug. 24. Savoyen, Schweiz: Grimsel à la Porsairette im Gebiete vom Enzeindaz in Waad; Jura: Dôle, Chasseron, Creux du Van, Weissenstein; Kitzbühl in Tirol, Untersberg in Salzburg, Hallstadt in Oesterreich, Kalbling et Dyrnthal in Steiermark, Schmelzberg b. Cudowa: GRABOWSKY.

***Eragrostis* Host.** Panicula. Spiculæ pedunculatæ 3—00-floræ complanæ in rachis persistente. Gluma bivalvis floribus brevior mutica uninervia decidua. Glumella infera 3-nervia decidua, superior ciliata marginibus revoluta persistens.

CLXIV. **424—25. *Eragrostis pilosa* P. B.:** panicula regulari, ramulis infimis quaternis—quiniverticillatis; spiculis linearibus 7—9-floris, floribus acutis adpressis, nervis lateralibus tenuibus. RCHB. *Fl. germ.* 48. 321. KOCH 925. 3. *Poa pilosa* LINN. KUNTH 329. 33.

425. *β. ? verticillata*: robustior, spiculis latioribus propter flores 8—12 magis patentes. *E. verticillata* P. B. *Poa pilosa* Host, sed non *P. verticillata* Cav. quæ propria species est oris vaginarum non barbatis sed nudis. Hæc tantum in Hispania, Lusitania et Brasilia crescit.

In cultis. Jun.—Spt. ☉. In regione meridionali in media passim et rarius quasi sponte.

426. *Eragrostis megastachya* LINK: panicula regulari oblonga patente, ramis inferioribus tenuis—binis, spiculis lineari-lanceolatis magnis 12—20-floris, floribus obtusis, aequaliter nervosis. RCHB. *Fl. germ.* 324. exsicc. 201. KOCH 924. 1. *Poa megastachya* KOEL. KUNTH 333. *Poa Eragrostis* CAV. *Briza Eragrostis* L. *Eragrostis major* Host. *Megastachya Eragrostis* P. B. *P. cilianensis* AUL. *Eragr. poaeoides a.* TRIN.

In cultis, ruderalis, ad vias et ripas. Jun.—Aug. ☉. In regione meridionali, in media passim: Carlsruhe, Mannheim, Blankenburg, Halberstadt, Regensburg, im Elsass.

- 427. Eragrostis poaeformis** LINK: panicula regularis ovato-oblonga patente, ramis inferioribus geminis, spiculis lineari-oblongis 8—20-floris, glumis aequaliter nervosis. REHB. *Fl. germ.* 48. 323. *poaeoides* P. B. KOCH 924. 2. *Poa Eragrostis* LINN. KUNTH 332. 56.

Icon. tab. CLXIV. Gramini additur elegans ille generis character: spiculac rachis cum glumellis interioribus et ex his singula quaedam magis aucta.

In collis, imprimis in vineis, ruderalis, muris, ad vias et in alluvio ad ripas. Jun. Spt. ☉. In regione meridionali, in media passim: am Rheine, in Franken, Böhmen, Breslau, Arnstadt, Jena, Dresden. Blankenburg, Halberstadt.

Briza LINN. Panicula. Spiculac longe pedunculatae, ovato-triangularis, complanae cernuae aut nutantes multiflorae: gluma aequaliter bivalvis membranacea ventricosa mutica, floribus brevior. Flores distiche compacti, glumella inferior navicularis obtusa multinervia, superior angusta bicarinata. — *Habitus Poae.* —

- CLXV. **428. Briza minor** L.: panicula erecta, spiculis viridibus, deltoideis 6—9-floris, glumis violaceis flores subsuperantibus, ligula lanceolata acuta. REHB. *Fl. germ.* 48. 325. KUNTH 372. 7. KOCH 924. 3. *virens* β. DEC. *aspera* KNAPP.

In apricis collibus graminosis. Mai. Jun. ☉. In Istria et ad Nicaeam. Olim indicabatur pr. Vevay in Helvetiae Cant. Waadt.

- 429. Briza media** L.: panicula erecta, spiculis cordato-ovatis 5—9-floris; glumis violaceis flore proximo brevioribus, glumellis viridibus, ligula abbreviato-truncata. REHB. *Fl. germ.* 49. 327. KUNTH 371. 4. KOCH 924. 2.

In locis graminosis, pratis, agrorum versuris. Jun. Aug. 24.

- 430. Briza virens** L.: panicula erecta, spiculis cordato-ovatis septenfloris, glumis proximos flores aequantibus. REHB. *Fl. germ.* 48. 326.

In graminosis. Mai. Jun. ☉. Dalmatia ad Narentam: NEUMEYER.

- 431. Briza maxima** L.: panicula cernua, spiculis ovatis 9—12-floris, gluma violacea floribus proximis superata. REHB. *Fl. germ.* 49. 328. KUNTH 371. 1. KOCH 924. 1.

Spicula supra glumam violaceam flavo-virens demum testacea.

In collibus, graminosis. Mai. Juni. ☉. Dalmatia, Croatia, Istria, Liguria.

Diplachne P. B. Panicula ramis racemosis. Spiculac pedunculatae pluriflorae. Flores in axis callis, gluma inaequali acuta, glumellis superata, glumella infera longior ex apice brevis aristata, superior bicarinata. — *Habitu ad Moliniam accedit, sed culmus nodosus et turiones distiche foliati.* —

- CLXVI. **432. Diplachne serotina** LINK: spiculis 2—5-floris, culmo stricto vaginato. REHB. *Fl. germ.* 41. 265. *exsicc.* 265. *Molinia serotina* M. K. KUNTH 380. 2. KOCH 934. 2. *Festuca serotina* L. sp. *Agrostis serotina* L. mant. *Melica nodosa* PILL. MITTERR. *Bromus strictus* Scop. *Schenodorus serotinus* R. S.

Altera species altaica est *D. squarrosa* (*Molinia* — TRIN., LEDEB. ic. t. 227.) spiculis subtrifloris, floribus magis acuminatis rostratis, culmo multinodi ramoso flexuoso-squaroso diversa. Hanc speciem nostrae diagnosis constituere patet.

Icon. tab. CLXVI. Adstat spicula, flos et aristula aucta.

In declivibus siccis. Aug.—Oct. **24.** Liguria, Genua, Tenda, Piemont, Turin, Lugano, Wallis, Südl. Waadtland b. Aigle, Südtirol b. Botzen, Istrien, Croatiaen.

Triodia P. B. Panicula racemosa. Spiculae teretiuseculae 3—5-florae, axis articulatus pilosellus. Gluma flores adaequans trinervis acuta. Glumella mutica, inferior 7-nervia carinata tridentata, superior bicarinata. — *Habitus fere et indumentum Bromi.*

433. Triodia decumbens P. B.: decumbens, culmo obliquo, spiculis trifloris in ramo subsolitariis vel in infimis duabus, foliis laxè vaginantibus vaginarum ore barbata, lamina angustè lineari pilosa. REHB. *Fl. germ.* 41. 271. *exsicc.* 910. KOCH 923. 1. *Danthonia decumbens* (ad *Triodiam* p. 319: „huc forsàn *Danthonia decumbens* CAND. BROWN.“) KUNTH 311. 1. *Festuca decumbens* L. sp., *Poa decumbens* WITH. *Bromus decumbens* KOEL. *Sieglingia decumbens* BERNH. *Melica decumbens* WEBER. *rigida* WIR. *Avena spicata* ALL.

Icon. tab. CLXVI. Oblatus est culmus spiculis ramosis et alter paniculatis, basi figura adstat spiculae auctae et flosculus auctus.

In ericetis, pratis montanis, arenosis humidis, innudatis. Jul. **24.**

Scolochloa LINK. Panicula effusa. Spiculae 3—5-florae. Gluma acuta, inferior valva brevior superior longior, utraque 5-nervia. Flores basi penicillati. Glumella subaequalis. infera trinervia lricuspidata, superior bifida. — *Habitus Glyceriae aquaticae et quasi Triodia aucta.*

434. Scolochloa festuacea LINK. Gramen procerum quadripedale et ultra, panicula effusa cernua, spiculae obovato-oblongae. REHB. *Fl. germ.* 42. 272. *Festuca borealis* M. K. KUNTH 404. 73. KOCH 942. 23. *Arundo festuacea* WILDL. EN. *Donax festuaceus* P. B. *borealis* TRIN. *Festuca arundinacea* LILJEBL. *donacina* WAHLNB. *Glyceria festuacea* FRIFS.

Icon. tab. CLXVI. Adstat culmus submersus, spicula et flos.

In fossis profundis et lacubus. Jul. Aug. **24.** Holstein b. Friedrichsort, Stettin, Berlin.

Melica LINN. Panicula racemosa. Spiculae subbiflorae, floribus summis 1—2 fatuis. Gluma subaequalis concava mutica flores occultans. Glumella infera 5—7-nervia, superior brevior bicarinata.

CLXVII. **435. Melica ciliata** L.: panicula spicata cylindrica, glumella infera a basi longissime ciliata. REHB. *Fl. germ.* 41. 266. KUNTH 375. 1. KOCH 923. 1. *Beckeria ciliata* BERNH. Spiculae basi apiceque violascentes demum canescentes argenteo-nitidulae.

Icon. tab. CLXVII. Panicula altera ante, altera post anthesin, additur flos apertus et apex glumellae inferioris.

In collibus apricis rupibusque intra frutices passim, in meridionali regione vulgatio. Mai. Jun. **24.**

436. Melica uniflora RETZ: panicula laxa remotiflora, ramis elongatis 1—2-spicularis, spicularum altero flore glumellis glabris fatuo. REHB. *Fl. germ.* 41. 268. KUNTH 377. 10. KOCH 923. 3. *Lobelia* VILL. *nutans* LAM., POLLICH.

Culmus gracilis subsolitarius obliquus pedalis, spiculae viridi-testaceae violascentes.

In vallium umbrosis nemorosis. Mai. Jun. **24.**

- 437. *Melica nutans* L.:** panicula racemosa, laxa, cernua, spiculis perfecte trifloris, glumis margine nudis. *REHB. Fl. germ.* 41. 267. *KUNTH* 376. 8. *Koch* 924. 4. *montana* HUDSON.

Culmi graciles erecti aggregati. Spiculae flavo-virides apicem versus violaceae.

In nemoribus ad fontes, rivulos, in rupium humidis. Mai. Jun. 24.

- 438. *Melica Bauhini* ALL.:** paniculae ramis remotis arrectis paucispiculatis sub anthesi divergentibus, spiculis trifloris, flore supremo vel etiam intermedio fatuo, glumella inferior ad medium usque ciliata. *REHB. Fl. germ.* 41. 269. *KUNTH* 376. 4. *Koch* 923. 2. *pyramidalis* DESF. *setacea* PEBB. *exasperata* R. S.?

M. uniflorae et *nutanti* quasi intermedia sed utraque rigidior.

In collibus. Jun. Jul. In Istriae maritimis: DOLLNER, in Liguria, Laigueglia: BADARRO. Nizza: KUNZE. Fontan: G. *REHB.* fil.

- 439—40. *Melica altissima* L.:** panicula subspicata, spiculis trifloris, duabus inferioribus fertilibus, glumellis nudis. *REHB. Fl. germ.* 41. 270. *KUNTH* 377. 15. *sibirica* LAM.

- 440. β ? *interrupta*:** floribus angustioribus in ramulis longioribus paniculae remote interruptae. Spiculae magis violascentes, folia angustiora.

Habitat inter frutices in vineis in Bannata: HEUFFEL. Jun.—Aug. 24.

***Echinaria* DESF.** Thyrsus capitatus. Spiculae pluriflorae. Gluma inferior obtusa biaristata, superior cuspidata. Glumella inaequalis, inferior 5-fida, laciniis lanceolatis pungentibus, superior bifida.

- CLXVIII. **441. *Echinaria capitata* DESF.** Sola species, gramen pusillum palmare, folia breviter linearia. *REHB. Fl. germ.* 35. 216. *KUNTH* 257. 1. *Koch* 910. 1. *Cenchrus capitatus* L. *Panicastrella capitata* MOENCH. *Sesleria echinata* Host.

In collibus graminosis et agris. Apr. Mai. ☉. Istria, Liguria, Nizza: KUNZE. Dalmatia.

***Psilathera* LINK.** Thyrsus capitatus, spiculae pedunculatae. Gluma aequalis uninervis breviaristata. Glumella inaequalis, inferior maior 5-aristata superior truncata biaristata.

- 442. *Psilathera tenella* LINK.** Sola species. Gramen tenue, palmare—spithamaeum dense cespitosum multiculme, capitula lilacina. *REHB. Fl. germ.* 35. 217. *Sesleria tenella* Host. *KUNTH* 322. 7. *microcephala* DEC. *Koch* 911. 4. *Cynosurus microcephalus* HOFFM. *ovatus* HPP.

Icon. tab. CLXVIII. infra spicula biflora, supra genitalia separata et glumellae solutae, superiore biaristata et paulo inferius glumella inferior 5-aristata.

In alpium summis jugis in Salisburgo, Tirol, Carinthia, Carniola, Styria. Jun. Jul. 24.

***Sesleria* ARDUINO.** Thyrsus capitatus aut subspicatus. Spiculae complanae 2—6-florae. Glumae 1-nerviae acutae floribus breviores, glumellae carinatae, inferior 5—7-nerviae truncata crosa aristata, superior binervia truncata.

- 443. *Sesleria sphaerocephala* ARD.:** thyrsus globoso coerulescente, spiculis subtrifloris, glumella inferiore emarginata 1-aristata. *REHB. Fl. germ.* 35. 218. *KUNTH* 322. 6. *Koch* 912. 5. *Cynosurus sphaerocephalus* WULF. JACO.

Var. *β. leucocephala* DEC.: thyrsus albidus. *Cynosurus sphaerocephalus* KOEL.

in summis alpinis in Styria, Carniola, Carinthia, Tirol, Salisburgo, ad lacum Comensem. Jun. Jul. 24.

444. *Sesleria coerulca* ARD.: thyrsus ovato-oblongus coerulescens, spiculis 3—5-floris, glumella infera brevis 3—5-aristata, foliis linearibus planis abrupte acutatis, radice caespitosa. RECHB. *Fl. germ.* 35. 219. *exsicc.* 121. KUNTH 321. 1. KOCH 911. 2. *Cynosurus coeruleus* L.

in montibus et in subalpinis calcareis, in meridionali regione vulgarior, in media passim. Mart.—Jun. 24.

445. *Sesleria elongata* HOST: thyrsus cylindrico productus, spiculis trifloris, glumella infera brevis 3—5-aristata, foliis linearibus canaliculatis sensim attenuatis, radice caespitosa prolifera. RECHB. *Fl. germ.* 35. 220. *exsicc.* 1403. KUNTH 322. 9. KOCH 911. 3. *Phleum autumnale* Scop. *Aira alba* WULFEN.

Gracilis, thyrsus spiciformis caesio-coerulescens.

in apricis lapidosis in Istria, Carniola, Croatia. Aug. Sept. 24.

445b. *Sesleria cylindrica* DEC.: thyrsus compacto cylindrico-oblongo, bracteis integris, spiculis bi—trifloris subsessilibus gluma cuspidata, glumella infera mucronato-tridentata, dente medio aristato, foliis rigidis planis cuspidatis margine scabris. KUNTH 322. 4. *argentea* SAVI. *pallidescens* HARTM. *Cynosurus cylindricus* BAILEIS. *Koeleria coerulea* TEN.

in rupium fissuris in Dalmatia circa Priko pr. Almissa et in saxosis apricis circa Ragusam: de VISIANI. Nicaeae, Col di Tenda: G. RECHB. fil. Apr. Mai. 24.

CLXIX. **446—49. *Sesleria tenuifolia*** SCHRAD.: thyrsus subspicatus oblongus, spiculis trifloris, glumella infera 3—5-aristata, foliis anguste linearibus, canaliculatis subinvolutis, vagina infima in fila contexta soluta; radice caespitosa prolifera. RECHB. *Fl. germ.* 35. 221. KUNTH 322. 5. KOCH 911. 1. *Aira juncifolia* WULFEN.

446—47. *S. juncifolia* STEUD., Host: foliis latioribus crassioribusque. *S. rigida* HELF.

449. *S. interrupta* DE VIS.: culmis basi nodibus, foliis longissimis, spiculis sessilibus, gluma glumellis non ciliatis. RECHB. *Fl. germ.* 140³. 221 add. De differentiis conf. TRACHSEL *Flora b. Zeit.* 1830. 506. Vis. *Fl. dalm.* 87. 142. — Color spicae paleaceus.

in declivibus apricis in Dalmatia, Istria, Croatia, Hungaria, Bannato pr. Csiklova, Szoszka, Majdan. *S. interrupta* in Dalmatia pr. Turnasa ad Flumen Cattiva pr. Almissa. Apr. 24.

Nardus L. Spica secunda. Rachis introrsum canaliculata dentata, in dentibus spiculae uniflorae. Gluma nulla. Glumella inferior carinata 3-nervia acuminata, superior brevior oblusa bicarinata. Stylus stigmatibus elongatus.

CLXX. **450. *Nardus stricta*** L. Sola species, fasciculi rigidi e culmis vaginatis strictis et rigidis aggregati, folia convoluta-setacea rigidula patentia subsecunda. RECHB. *Fl. germ.* 54. 372. KUNTH 460. 1. KOCH 959. 1.

in turfosis, pascuis arenosis planitiebus montiumve et alpium. Mai—Jul. 24.

Spartina SCHREB. Spica e spicis spiculatis composita. Spiculae secundae biseriales, pedunculatae uniflorae. Gluma inferior minor acuta uninervia, superior major florem superans 5-nervia acuta, in dorso dente retrorso. Glumella membranacea mutica, inferior 1—2-nervia carinata, superior binervia longior navicularis. Stam. 3. Stigmata clavato-plumosa.

CLXXI. **451. *Spartina stricta*** Rru.: spicis subterminalibus, spiculis imbricato-arrectis, foliis involutis, rhizomate repente. RCHB. *Fl. germ.* 22. 117. *exsicc.* 1803. KUNTH 278. 2. KOCH 900. 1. *Dactylis stricta* AIT. *Limnetis pungens* RICH. PERS. *Trachypodia stricta* DEC.

Icon. tab. CLXXI. Specimini cum spicis completis additur ad sinistram aliud spicis delapsis, ut axis in conspectum veniat. A. gluma. B. eadem cum flore. C. glumella et genitalia.

In solo lutoso alla riva longa inter Montfalcone et Aquileja et Venetiis. Aug. Spt. 24.

Beckmannia Host. Spica e spicis spiculatis composita. Spicae alternatim sessiles. Spiculae dense biseriales secundae biflorae. Glumae obcordatae convexae, glumellae aequalis mutica. Glumella infera 5-nervia, superior binervia.

452. *Beckmannia cruciformis* Host: culmo basi bulboso strieto, spiculis viridibus. RCHB. *Fl. germ.* 22. 119. KUNTH 27. 1. *Phalaris cruciformis* LINN. *Cynosurus* — AIT. *Bruchmannia* — NUTT. *Paspalum aristatum* MOENCH. *Joachimia phalaroides* TEN.

Icon. tab. CLXXI. Specimen a dorso et aliud a fronte visum. D. spicula aperta. E. flos inferiorum cum pistillo.

In pratis uliginosis, inundatis. Jun. Jul. 24. Pesth: SADLER. Dornis in Dalmatia: de VISIANI. Breslau in der Odervorstadt b. Polnisch Neudorf bis 1814: SCHUMMEL, GÜNTHER.

Mibora ADANS. Spica secunda. Spiculae subbiseriales uniflorae. Gluma oblonga, obtusa erosa uninervia florem superans. Glumella obtusa, infera 5-nervia, supera angustior binervis.

CLXXII. **453. *Mibora verna*** P. B. Sola species, pusilla tenera uni—tripollicaris caespitosa. Culmus filiformis, spica violascens. RCHB. *Fl. germ.* 23. 120. *exsicc.* 203. *Chamagrostis minima* BORKH. KUNTH 23. 1. KOCH 899. 1. *Agrostis minima* L. *Knappia agrostidea* SM. *verna* TRIN. *Sturima minima* HOPPE.

Icon. tab. CLXXII. A. spica aucta. B. spicula. C. flos. D. folium.

In arenosis in Belgia, Holsatia, Würzburg, Hanau, Mainz, Schwetzingen nach Mannheim zu, Philippsburg, angeblich bei Prag, auch b. Nizza. März. Apr. ☉.

Cynodon RICHARD. Spicae digitatae. Spiculae secundae alternatim biseriales sessiles biflorae, altero flore rudimentario: capitulo stipitato. Gluma bivalvis carinata uninervis flore brevior. Glumella inferior carinata trinervia mutica, superior bicarinata.

454. *Cynodon Dactylon* RICHARD: rhizomate repente, culmis adscendentibus, foliis biserialibus rigidis. RCHB. *Fl. germ.* 22. 118. *exsicc.* 520. KUNTH 259. 1. KOCH 900. 1. *linearis* RETZ. *Panicum Dactylon* L. *lineare* BURM. *Digitaria stolonifera* SCHRAD. *linearis* PERS. *maritima* SFR. *stolonifera* ECKL. *Paspalum praecox* WALT. *umbellatum* LAM. *Dactylon* LAM. *Fibigia umbellata* KOEL. *Dactylon officinale* VILL. *Agrostis linearis* RETZ. *bermudiana* TUSSAC. *Chloris maritima* TRIN.

Icon. tab. CLXXII. E. pars spicae a dorso. F. particula spicae a facie. G. flos apertus. H. pistillum cum squamulis. L. ligula.

In arenosis siccis humidisque in meridionali regione et passim in media in Moravia, Bohemia, Silesia, ad Rhenum, ad flumen Lippe et pr. Berolinum. Jul. Aug. 24.

Imperata CYRILLO: Thyrsus spiciformis. Spiculae biflorae muticae, flos superior hermaproditus, inferior fatuus univalvis, gluma aequalis mutica longipilosa. Glumella parva, inferior longior.

CLXXIII. **Imperata cylindrica** Host: sola species. Gramen rigidum vaginatum, strictum bipedale. Folia involuta. Thyrsus cylindricus argenteo-nitens speciosus. RCHB. *Fl. germ.* 34. 213. Koch 895. 1. *I. Koenigii* P. B. *Lagurus cylindricus* L. *Saccharum cylindricum* LAM. *spicatum* BURM. *Siska* CAV. *Thunbergii* RETZ. *Koenigii* RETZ. *Imperata arundinacea* CYRILLO. KUNTH 477. 1.

In olivetis, vineis, ad vias. Jun. Jul. 24. In Istria: TOMMASINI. Nicacae ad fl. Var.: G. RCHB. fil.

Saccharum LINN. Panicula. Spiculae in rachi articulo-fragilissima geminae aequales biflorae, pilis longis occultae, altera pedicellata altera sessilis. Flos alter fatuus univalvis. Gluma aequalis pilosa acuminata, infera trinervi supera binervi. Glumella infera trinervis arista setacea, supera angustior involuta. — Nostra species aliis *Erianthus* RICHARD: character Andropogonis spiculae autem omnes hermaphroditae.

456. **Saccharum Ravennae** MURR.: panicula ramosissima, gluma pilos aequante: foliis canaliculatis infra culmoque pilosis. RCHB. *Fl. germ.* 215. *exsicc.* 908. Vis. dalm. 52. 48. *Erianthus Ravennae* P. B. KUNTH 479. 7. Koch 889. 1. *Andropogon Ravennae* L. sp. *Saccharum Ravennae* L. syst. veg.

Procerum, strictum, panicula argenteo-nitens.

Icon. tab. CLXXIII. B. particula ramuli paniculae cum spiculis et valva externa separata. C. spicula sub anthesi.

In maris alluvio arenoso humido et passim in continente. Aug. Spt. 24. Dalmatia: im Brackwasser b. Scardona an der Kerka u. häufig auf den Inseln Cherso u. Sansego: NOE, v. PITTONI. S. Nicolo del Lido b. Venedig: v. CHARPENTIER. Mantua: BARBIERI. Pestrino an der Elsch: BRUCHT.

457. **Saccharum strictum** SPR.: panicula e thyrsis spiciformibus conferta elongata, pilis flore brevioribus, apice floris alterius bifido. RCHB. *Fl. germ.* 34. 214. Vis. *Fl. dalm.* 52. 49. *Erianthus strictus* BALDW. in ELLIOT Bot. KUNTH 478. 5. *Saccharum strictum* NUTT. *Baldwinii* SPR. *appressum* KIT. mserpt. *Andropogon strictum* Host.

Procerum, strictissimum, panicula rubens.

Icon. tab. CLXXIII. D. ramulus cum spiculis geminatis sessilibus pedicellatisque. E. spicula sub anthesi.

In lapidosis declivibus in Hungaria in Comitatu Syrmienti et Illok, in Dalmatia in pratis silvaticis pr. Slioniza pr. Zara, in paludibus pr. Omlata Ragusae proxima, in collibus ad Najessich prope Catarro: de VISIANI. Jul. Aug. 24.

Heteropogon PERS. Spica. Spiculae articulis geminae terminales ternae. Illarum altera sessilis herbacea mascula, earum supremæ cartilagineae femineae; pedicellatae singulae masculae. Spicula ♂ 1—2-flora, glumae oblongo-acuminatae, flos inferior univalvis fatuus, superior bivalvis muticus. Spicula ♀ uniflora: glumae obtusae, flos in pedicello piloso, glumella infera arista longa tortuosa.

CLXXIV. 458. **Heteropogon Allionii** R. S.: gluma et flore masculo involuto acuto glabro. RCHB. *Fl. germ.* 33. 263. Koch 890. 1. *Andropogon contortum* ALLIONE non LINN. *Heteropogon glabrum* PERS. *Andropogon Allionii* DEC. KUNTH 486. 1.

Humilis, spicae virides, aristae in vivo pallide ferrugineae.

Icon. tab. CLXXIV. Spica a facie et a latere visa. A. rachis pro parte cum spicula pedicellata et post eam sessili utraque mascula. B. spicula sessilis. C. valva externa separata. D. E. spiculae foemineae.

In collibus lapidosis. Aug. Spt. **24.** In Dalmatia pr. Macarsca, in insula Brazza pr. Stipansko: de VISIANI. Botzen in Südtirol: ELSMANN, SIEBER, v. HAUSMANN, SENDTNER, Canton Tessin pr. Gandria u. Candranullo: MORITZ. Bellinzona: LERESCHE. Suva in Savoyen: JORDAN. Moltrassio am Comosec: CESATI. Ligurien al Ceriale: SASSI. a Finale: BUBANI. Nizza: COLLE.

Andropogon LINN. Spicae digitatae. Spiculae geminae in axi articulato piloso, altera sessilis hermaphrodita sterilis, altera pedicellata subuniflora mascula. Singulis rudimentum floris inferioris univalvi (exoticis fl. inferior bivalvis masculus). Gluma inferior ecarinata superior carinata. Glumellae tenuissime membranaceae, intermedia tertia s. floris ♂ inferior aristata.

459. Andropogon pubescens VISIANI: spicis linearibus geminatis pedunculo apice pubescente folio glabro vaginato, floribus masculis, femineisque alternantibus pubescentibus arista sexies florem longa, foliis angustissimis brevibus glaucis vix pilosellis, ligula oblonga membranacea, culmo ramoso. RECHB. *Fl. germ.* 33. 206. et *exsicc.* Vis. *Fl. dalmat.* 51. 46. KUNTH 492. 42. KOCH 890. 2.

Ab *A. hirta* iam humilitate, foliorum angustia, et pedunculis tenuius puberulis distinguendus. Spiculae e viridi purpurascens.

In apricis saxosis sterilibus praesertim ad mare in Istria: Insel Sansego. Lossino: TOMMASINI. Dalmatia: Monte Marian b. Spalato, Grippi, Stobrez, Salona, Doborce bei Vrullia zwischen Almissa und Macarsca, Insel Curzola u. bei Ragusa in Lapad so wie auf dem Monte Zarovika. Jun.—Aug. **24.**

460. Andropogon hirtus L.: spicis geminatis pedunculatis, pedunculis longe pilosis, arista quater florem longa, foliis linearibus longiusculis. RECHB. *Fl. germ.* 33. 205. KUNTH 492. 41. *Trachypogon hirtus* N. v. E.

Praecedente robustior, folia latiora longiora, pedunculi hirti. Spiculae purpurascens.

Icon. tab. CLXXIV. F. flos masculus. G. flos hermaphroditus.

In collibus apricis, vineis, rupibus. Jul. Aug. **24.** Dalmatia: Lessina, Ragusa, Zuppa, Perzagro. Monte Vermaz b. Cattaro: de VISIANI. Genua: RECCO, PEGLI, BERTOLONE. Nizza: SONDER, G. RECHB. fil.

CLXXV. **461. Andropogon Ischaemum** L.: spicis 5—10 digitatis, gluma striata, floris hermaphroditi glumella infera pilosa, masculi glabra, arista florem ter aequante, rachi pedicellis pilosis. RECHB. *Fl. germ.* 204. *exsicc.* 651. KUNTH 499. 91. KOCH 890. 1. *angustifolius* SMITH non KUNTH 486. 5.

Gregarius, culmi plures adscendentes obliqui, spicae rubellae.

Icon. tab. CLXXV. A. apex inflorescentia, spicula cum flore hermaphrodito et lateralis pedicellata mascula. B. flos hermaphroditus cum pistillo suo. C. flos masculus cum staminibus.

In graminosis, collibus rupibusque. Jul.—Spt. **24.** In regione meridionali et media.

Pollinia SPR. Spicae digitatae aut spiculae paniculatae, spiculae geminae terminales ternae, media sessilis hermaphrodita. Gluma subaequalis coriacea, infera mutica superior ex apice aristata. Glumella inferior uninervia arista longa subtorta, superior lanceolata cum rudimento: valva singula. Spiculae pedicellatae biflorae masculae fatuae: gluma aequalis aristato-acuminata, glumellae oblongae apice denticulatae, inferior trinervia superior enervia, rudimentum valvae solitaria uninervia.

a. *Schizopogon*: styli separati, spicae.

207. Pollinia distachys SPRENGEL: spicis geminatis pedunculatis, floribus geminis aristatis, hermaphrodito sessili, masculo aristato. REHB. *Fl. germ.* 34. 207. *Andropogon distachyos* LINN.

Culmus simplex, spicae crassiusculae virentes.

Icon. tab. CLXXV. D. spicula hermaphrodita, subjecta est palea superior aristis resectis. E. spicula mascula.

In rupestribus, collibus. Jul. Aug. 24. Angeblich Istrien u. Inseln. Dalmatia: Zara: de VISIANI, v. WELDEN. Genna: de NOTARIS. Nizza b. Villa franca: SONDER. Col de Bruis u. Fontane: G. REHB. fil.

b. *Chrysopogon* TRIN. Styli coaliti, panicula verticillata.

208. Pollinia Gryllus SPRENGEL: ramis paniculae laxae diffusis subtrispiculatis, pedicellis barbatis. REHB. *Fl. germ.* 34. 208. et *exsicc.* 1112. *Andropogon Gryllus* LINN. KUNTH 504. 125. KOCH 890. 4. *paniculatus* LAM. *Holcus Gryllus* R. BR. *Apluda?* *Gryllus* P. B. *Chrysopogon Gryllus* TRINIUS.

Gramen culmo simpliciter erecto cum panicula purpurascens.

Icon. tab. CLXXV. F. spicula flore baseos hermaphrodito, laterali utroque pedicellato masculo.

In collibus graminosis. Jun. Jul. 24. Triest: MÜLLER. Fiume NOE. Isonzothal: PAPPERITZ. Südtirol: FACCHINI. Verona: Sylva Mantica: BRACHT. Helvetia: Bex Canton de Vand: G. REHB. fil. Lanis, Bellinzona, Clefen, Livinethal, Misox im Tessin: MORITZ. Ivrea in Piemont: G. REHB. fil.

Sorghum PERS. Panicula. Spiculae geminae fusiformes, altera sessilis biflora. Gluma cartilaginea, infera 5-nervia acuta subtridentata, superior 7-nervia hermaphrodita. Glumella infera emarginata arista tortili, superior mutica ciliata. Rudimentum: glumella membranacea. Spicula altera pedunculata. Gluma illius. Flos ♂: glumella infera mutica, superior mutica ciliata. Rudimentum: glumella solitaria

464. Sorghum halepense PERS.: panicula patente, ramis scabris, glumis lanceolatis acutis serieis, foliis lanceolato-linearibus margine scabris. REHB. *Fl. germ.* 34. 212. *exsicc.* 109. KOCH 890. 1. *Andropogon halepense* SMITH. KUNTH 502. 113. *avenaceus* KUNTH n. gen. *arundinaceus* Scop. *Holcus halepensis* LINN. *exiguus* FORSK. *Blumenbachia halepensis* KOEL. *Trachypogon avenaceus* N. v. E.

Bi—tripedale, spiculis purpurascens.

In littorali in cultis, inundatis, rupestribus. In regione meridionali. Jun. Aug. 24.

CLXXVI. **465. Sorghum vulgare** PERS.: panicula oblonga thyrsioidea, ramis flexuosis arrectis, glumis obovato-ovalibus nitidis inprimis marginem versus apicemque pilosis, caryopsi compressa. REHB. *Fl. germ.* 34. 209. KOCH 891. 3. *Andropogon Sorghum* BROTERO. KUNTH 501. 106. *Holcus Sorghum* LINN. II. *Durra* FORSK.

Icon. tab. CLXXVI. Panicula florens et fructifera, additur spicula biflora, flos masculus, flos foemineus gluma demta, styli eum stigmatibus, caryopsis et eadem transsecta.

Ex India orientali in agro Veronensi cultum. Jun.—Spt. ☉.

465 b. Sorghum saccharatum PERS.: paniculae sub anthesi divergentis ramis ad medium fere nudis, demum arrectis, spiculis hermaphroditis obovato-ovalibus, masculis lanceolatis pedicellum quadruplum longis. KOCH 891. 2. *Holcus saccharatus* LINN. II. *Dochna* FORSK. *Andropogon saccharatus* ROXB. KUNTH 502. 111.

Ex India orientali passim in maxime meridionali regione cultum. Jul. Aug. ☉.

466. *Sorghum cernuum* W.: panicula patenti thyrsoides oblonga demum tota reflexa gluma obovato-ovali pubescente, caryopsi globosa. RCHB. *Fl. germ.* 34. 210. *Holcus cernuus* W. spec. *Andropogon cernuus* ROXB. KUNTH 501. 108.

Icon. tab. CLXXVI. Panicula florens et fructifera cum ramulo sub anthesi aucto. ?

E Bengalía ubi colitur ortum et in regione maxime meridionali cum praecedentibus nec non cum *S. nigrum* R. S. *bicolore* W. En. *rubente* (vulg. β . *rubens*) PERS. et *S. caffrorum* P. B. passim cultum. Jul. Aug. ☉.

***Coleanthus* SEIDL.** Panicula glomerata. Gluma nulla. Glumella membranacea inaequalis, inferior carinata uninervia acuminato-aristata, superior brevior bicarinata bilida. Stamina 2. Stigmata bifariam dentata. Caryopsis turbinato-oblonga reticulata exserta.

CLXXVII. **467. *Coleanthus subtilis* SEIDL.:** gramen pusillum, depressum vaginatum vaginis ventricosis. RCHB. *Fl. germ.* 30. 174. *exsicc.* 117. KUNTH 204. 1. KOCH 900. 20. *Schmidtia utriculosa* STERNBERG. *subtilis* TRATT.

Icon. tab. CLXXVII. A. spicula. B. caryopsis nuda. C. genitalia.

In huto stagnorum. Jul.—Spt. ☉. In Bohemia: bei Wossek im Pilsner Kreise: PRESL. 1811., SEIDL. TAUSCH, v. STERNBERG, BENESCH, im Kaurzimer Kreise b. Stürzim: SIKORA, MALY, RUPRECHT. (Nuper in Norvegia meridionali repertus pr. Nittedalselven, parochia Skydsmoe: BLYTT in FRIES Herb. norm. 1843. 87.)

***Crypsis* AITON.** Thyrsus capitatus aut spiciformis. Spiculae uniflorae. Gluma flore brevior; carinato-compressa, inferior minor. Glumella lanceolata subaequalis, superior uni- vel bicarinata. Stam. 2—3. Styli elongati, stigmata filiformia plumosa apice exserta.

468. *Crypsis aculeata* AIT.: culmo compresso ramoso, thyrsu hemisphaerico vaginato, flore diandro, glumella superiore uninervi. RCHB. *Fl. germ.* 30. 175. KUNTH 22. 3. KOCH 897. 1. *Schoenus aculeatus* L. spec. *Anthoxanthum aculeatum* L. suppl. *Phleum schoenoides* Jcq. *Agrostis aculeata* Scop. *Antitragus aculeatus* GÄRTN. *Heleochloa diandra* Host. Gramen humile procumbens brevifolium subsquarrosum.

In paludosis. Jul. Aug. ☉. In Austria inferiore, Mähren im Mönitzer See, Ungarn im Nensiedler See, Dalmatien an der Narenta, Montfalcone, Venedig, Pavia.

469. *Crypsis schoenoides* LAM.: culmo compresso, thyrsu ovato vaginato, floribus triandris, glumella superiore binervi. RCHB. *Fl. germ.* 30. 176. KUNTH 22. 2. KOCH 897. 2. *Phleum schoenoides* LINN. *Spartina phleoides* Roth. *Heleochloa schoenoides* Host. *Crypsis aculeata* β . Willd. *Phalaris vaginiflora* Forsk. *Pectea subcylindrica* POUER.

Gramen humile adscendens aut suberectum foliis longioribus.

In paludosis. Jul.—Spt. Ungarn: LANG. Dalmatien ad Fl. Narenta: NEUMAYER. Venedig: de VISIANI. Mantua: del ARCO. Nizza: BALBIS.

470. *Crypsis alopecuroides* SCHRAD.: culmis simplicibus teretiuseulis, thyrsu cylindrico exserto, floribus triandris. RCHB. *Fl. germ.* 30. 177. *exsicc.* 1810. KUNTH 21. 1. KOCH 897. 3. *macrostyla* BROTERO. *Phleum alopecuroides* PILLER & MITTERBACHER. *Heleochloa alopecuroides* Host. *Phalaris explicata* LINK. *geniculata* SMITH. *Crypsis geniculata* R. S.

Prostrata aut adscendens, habitu fere *Alopecuri geniculati*.

In paludosis. Jul.—Spt. ☉. Mähren b. Bisanz; Grossenzersdorf in Austria: SIEBER. Doberdo inter Duino et Görz: TOMMASINI. Bannat pr. Basias: WIERZBICKI. Dalmatien: Dermis u. an. d. Narenta: de VISIANI. Mantua: BARBIERI. Lago di Tarnavasio in Pedemontio: BALBIS.

Alopecurus L. Thyrsus spiciformis exsertus. Spiculae uniflorae. Gluma subaequalis compressa carinata basi coalita. Glumella univalvis membranacea utriculata uninervia e basi dorsi aristata. Styli elongati, stigmata filiformia fibrillosa ex apice floris exserta.

CLXXVIII. **421. Alopecurus utriculatus** PERS.: thyrsus ovato, gluma compressa supra medium abrupte acuminata carinata, folii supremi vagina valde ventricosa. RCHB. *Fl. germ.* 30. 178. *exsicc.* 119.

In fossis paludosis pratorum. Mai—Jun. ☉. In Palatinatu: Zweibrücken, Trier, Saarbrücken, in Alsatia pr. Schettstadt, Luxemburg, Steiermark, Dalmatien: Zara, Sebenico, Durnis, Kuin, Rodigne. Salona, Narenta. Helvetia: Vellin, Mantua, Mailand, Piemont.

422. Alopecurus geniculatus L.: adscendens, thyrsus cylindrico obtuso, gluma ima basi coalita pilosa, glumella apice crenolata sub medio aristata, arista exserta. RCHB. *Fl. germ.* 31. 183. KUNTH 24. 3. KOCH 896. 4. *ramosus* POIR. *panicus* FL. DAN. 861. Antherae breves croceae demum fusculae.

Ad fontes, in rivulis, paludibus, inundatis. humidis. Mai. Jun. ☉.

423. Alopecurus agrestis L.: erectus, thyrsus subfusiformi, gluma naviculari compressa alato-carinata puberula ultra medium coalita. RCHB. *Fl. germ.* 30. 179. et *exs.* KUNTH 23. 1. KOCH 896. 3.

Reliquis mollior, thyrsus quidquam coerulescens.

In solo limoso aut arenoso, in vineis, agris. Apr.—Jul. ☉. In meridionali regione vulgatio, in media passim.

424. Alopecurus bulbosus L.: culmo bulboso adscendente, thyrsus fusiformi aequali tenui; glumis aequalibus compressis acutis carinatis trinerviis puberulis vix ima basi coalitis; glumella tertia parte immersa truncato-apiculata aristata, arista dorsali suprabasilarum glumellam ter longa. RCHB. *Fl. germ.* 30. 181. KUNTH 24. 5.

In pratis paludosis et fossis in aqua imprimis subsalsa. Mai. Jun. 24. Venetiis pr. Brondolo: MORICAND. Istria: Carpano pr. Albona: PAPPERITZ. SENDTNER. — (Extra fines specimina prostant in Gallia australi lecta: Port Vendres: COLSON. Antibes au Var: JORDAN, e Sicilia: Palermo al gurgio di dingoli: v. HELDBREICH).

425. Alopecurus erectus TRIN.: thyrsus spiciformi gracili, gluma compressa subcarinata trinervia, apice denticulata ultra medium coalita, marginibus inferioris superiorem amplectentibus, glumella truncata denticulata, arista suprabasilarum. RCHB. *Fl. germ.* 180.

In Istria pr. Rovigno inter Capodistria et Isola teste Biasoletto et in Dalmatia indicatus, sed utroque loco non porro repertus. Mai—Jul. ☉.

426. Alopecurus fulvus SMITH: adscendens, glaucus, thyrsus spiciformi cylindrico, gluma basi coalita obtusa ciliata, glumella medio dorso aristata, arista vix exserta. RCHB. *Fl. germ.* 30. 182. KUNTH 24. *paludosus* P. B. KOCH 896.

Alopecuro geniculato procerior, vaginis magis ventricosis, antheris oblongatis miniatis demum rufis.

In humidis, ad fontes, rivulos. Mai—Aug. ☉.

427. Alopecurus nigricans HORNEMANN: erectus, repens prolifer, thyrsus cylindrico, ramulis 4—6 spiculatis, gluma acuta compressa infra medium coalita, pilosa. RCHB. *Fl. germ.* 31. 185. KUNTH 24. 7. KOCH 896. 2. *pratensis* β. M. B. *sibiricus* Jcq. fil. Hort. Vind. *pratensis* β. *nigricans* WILHELM. *nigrescens* Jcq. fil. Eclog. *intermedius* BOCK mserp. *repens* M. B. sppl. *ruthenicus* WEICH. *arundinaceus* POIR. *ventricosus* PERS.

Alopecuro pratensi plerumque procerior et pinguior, vaginae inprimis suprema, amphiores et magis ventricosae, antherae aurantiae demum nigrescentes, thyrsus demum obscurior.

Icon. tab. CLXXVIII. C. spicula. B. ejus apex magis auctus.

In pratis passim cum sequente, alibi separatus occurrit. Mai. Jun. Iunc Aug. Spt. 24.

478. Alopecurus pratensis L.: erectus cespitoso-prolifer, thyrso cylindrico, ramulis 4—6-spiculatis, gluma acuta compressa, infra medium coalita puberula. *Rech. Fl. germ.* 31. 184. *Kuntz* 24. 6. *Koch* 896. 1.

Gracilior et plerumque humilior *Alopecuro nigricante*, vaginae arctiores, thyrsus inprimis tenuior, antherae luteae demum fusculae, thyrsus demum pallens.

Icon. tab. CLXXVIII. E. spicula. D. apex spiculae magis auctus.

In pratis et meliorum pratorum particeps decusque. Mai. Jun. iterum Aug. Spt. 24.

Colobachne P. B. Thyrsus subspicatus. Spiculae uniflorae. Gluma bivalvis carinata compressa acuminata. Glumella infra 5-nervia basi aristata, superior brevior uninnervia carinata.

CLXXIX. **479. Colobachne Gerardi** LINN: thyrso capitato ovato sericeo micante, gluma coalita mucronata, foliis brevibus, caulorum vagina ventricosa. *Rech. Fl. germ.* 31. 186. *Alopecurus vaginatus* PALL. *Kuntz* 25. 12. *Phleum Gerardi* ALL.

Icon. tab. CLXXIX. A. spicula. B. apex valvae.

In pascuis alpium. Jul. Aug. 24. Sabaudia: Mont Iseran: PH. THOMAS. Mont Cenis: BONJEAN. See-alpen: über Vinadio: G. RECH. fil. Valdiere: Vallasco: BERTERO. Appenninen über Carlino: G. RECH. fil.

Phleum LINN. Thyrsus cylindrico spicato. Spicae uniflorae. Gluma bivalvis carinato-compressa truncata aut acuminata. Glumella inferior trinervia apice denticulata, supera binervia.

a. *Achnodonton* P. B.: glumella infera 5-nervis truncata.

480. Phleum tenue SCHRAD.: thyrsus tenue cylindrico, gluma albida viridinervia, glumellis oblongo-ellipticis mucronatis scabris. *Rech. Fl. germ.* 31. 187. *Kuntz* 28. 1. *Koch* 897. 1.

In Istria: Aquileja. Dalmatia. Apr.—Jun. ☉.

b. *Phleum* P. B.: glumella infera trinervia.

481. conf. *Chilochloa*.

482—83. Phleum pratense L.: thyrsus cylindrico, gluma truncata erecto-mucronata, carina setuloso-ciliata, arista immersa, vagina cylindrica. *Rech. Fl. germ.* 31. 189. *Kuntz* 29. 8. *Koch* 898. 6.

483. β. nodosum L.: culmi basi bulbosa, humilior adscendens, thyrsus brevior.

Icon. tab. CLXXIX. E. spicula. F. genitalia. G. paleae.

In pratis et locis graminosis. Jun. Jul. 24.

484. Phleum alpinum L.: thyrsus ovato-oblongo, gluma truncata, carina ciliata aristata, aristam aequante, vagina suprema ventricosa. *Rech. Fl. germ.* 31. 190. *exsicc.* 907.

Thyrsus obscurior.

Per alpium tractum, in Carpatis, Sudetis in Moravia et Silesia: im Gesenke. Jul. Aug. 24.

- 485. *Phleum echinatum*** Host: thyrso subgloboso, gluma truncata aristam scabram aequante, glumella bivalvi membranacea immersa truncata subaristata. REHB. *Fl. germ.* 32. 192. KUNTH 29. 9. KOCH 899. 8.

In collibus graminosis in Istria, Dalmatia, in agro veronensi, in M. Bolka pr. Vestene et Bartolomeo: POLLINI. Mai. ☉.

Chilochloa P. B. Phlei notis additur floris alterius rudimentum: pedicellus.

- 481. *Chilochloa arenaria*** P. B.: thyrso oblongo, gluma lanceolata breviaristata scabra ciliata. *Phleum arenarium* L. REHB. *Fl. germ.* 188. KUNTH 28. 5. KOCH 898. 2. *Phalaris arenaria* WILD. *phleoides* β. AIT. *Crypsis arenaria* DESF.

Ad litus maris ballici, septentrionalis, adriatici; pr. Aachen et Mainz. Jun.—Aug. ☉.

- CLXXX. **486. *Chilochloa aspera*** P. B.: thyrso cylindrico viridi, gluma carinata, truncata mucronata vaginisque scabris. REHB. *Fl. germ.* 22. 193. *exsicc.* 703. *Phleum asperum* KUNTH 28. 2. KOCH 898. 5. *viride* ALL. *paniculatum* HUDS. *ventricosum* MOENCH. *Phalaris aspera* RETZ. *paniculata* AIT.

In collibus siccis regionis meridionalis et mediae. Jun. Jul. ☉.

- 487. *Chilochloa Boehmeri*** P. B.: caespitosum, thyrso cylindrico viridi-nigricante, glumis lanceolatis acuminato-mucronatis dorso setuloso-ciliatis scabriusculis. REHB. *Fl. germ.* 32. 194. *Phleum Boehmeri* WIEB. KUNTH 28. 4. KOCH 898. 4. *phalaroides* KOEL. *glabrum* BRUN. *laeve* M. BIEB. *Phalaris phleoides* L.

Icon. tab. CLXXX. Adstat spicula florens et flosculus cum rudimento.

In collibus et montium declivibus siccis. Jun. Jul. 24.

- 488. *Chilochloa Michellii*** REHB.: thyrso crassiuscule cylindrico, glumis lanceolatis acuminatis carina a basi longe ciliatis. REHB. *Fl. germ.* 32. 195. *Phleum Michellii* ALL. KUNTH 28. 6. KOCH 878. 3. *hirsutum* SUTER. *phalaroideum* VILL. *Phalaris alpina* HANKE. *phleoides* SAVI. *ciliata* LAGASCA.

- 489. β? *cuspidata*** R. S.: thyrso cylindrico elongato attenuato, glumis (angustioribus) lanceolatis acuminato-mucronatis, carina superne ciliata. *Phleum cuspidatum* WILLD. En. *sppl. trigynum* Host. *Hostii* JACQ. cat. H. Vind. *Phalaris trigyna* Host *gram. mucronata* DESF.

In alpinum pratis pascuisque. β. in Tirol meridionali, Istria, Dalmatia. Mai. Jun. 24.

Phalaris LINN. Thyrsus spiciformis. Spiculac bi—triflorac. Flos inferus hermaphroditus, reliqui steriles. Gluma bivalvis alato-carinata. Glumella immersa inaequalis mutica, infera major. Rudimenta uni- aut bivalvia.

- CLXXXI. **490. *Phalaris paradoxa*** L.: thyrso cylindrico oblongo basi neutro, superne crassiore, ramulis 6—7-spiculatis, floris medii hermaphroditi gluma alato-carinata, ala medio in dentem producta, arcuato-acuminata, neutris angustioribus minoribus, ramulorum inferiorum geminato-euneatis oblique truncatis. REHB. *Fl. germ.* 32. 199. *exsicc.* 2109. KUNTH 33. 9. KOCH 894. 4. *praemorsa* LAM.

Icon. tab. CLXXXI. Prope paniculam repraesentantur e spiculis mutilatis bini, infra spicula e mediis cum rudimento paleis subiecto et alia infra posita e lateralibus sub anthesi.

In vineis, agris, inundatis. Apr. Mai. ☉. Istria: BIASOLETTO. Triest in alluvio: TOMMASINI. Nizza: BALBIS, PEGLI, VINCENTI. Ceriale: SASSI. Albignano: BADARRO.

491. Phalaris canariensis L.: thyrsus subturbinatus, gluma naviculari carina arcuato-alata integerrima, glumella immersa ovato-acuminata pilosella, flore sterili fertilem semilongo. RCHB. *Fl. germ.* 32. 197. KUNTH 31. 1. KOCH 894. 1.

Icon. tab. CLXXXI. cum spicula et flosculo.

Inter segetes in Istria: BIASOLETTO, PAPPERITZ. Mai. Jun. ☉.

492. Phalaris minor RETZ: thyrsus subturbinatus oblongus, gluma naviculari carina arcuato-alata crenulata, glumella parvula ovata acuminata pilosella, flore sterili fertilem subaequante, culmo basi aequali. RCHB. *Fl. germ.* 32. 198. (*aquatica* AITON non LINN.) KUNTH 32. 4. KOCH 894. 2. *capensis* THNB.

Nomen *Ph. aquaticae* in tabula corrigendum.

Icon. tab. CLXXXI. subest spicula et flosculus cum addito rudimento valde aucto.

Inter segetes in arenosis humidis. Mai. Jun. ☉. Inter Fiume et Laurana, HOST. Nizza ad fl. Var: a CHARPENTIER.

492b. Phalaris aquatica LINN.: thyrsus oblongus, gluma naviculari acuminato-mucronata margine uninervia alae carina eroso-denticulata, flore sterili altero minimo altero nullo, glumellis floris fertilis glabris, culmo basi tuberoso. KOCH 894. 3. *aquatica minor* SAVI. *coerulescens* DESF. KUNTH 32. 3. *tuberosa* LINN. mant.? LINK. *bulbosa* CAV. *nitida* PRESL. *variegata* SPR. *commutata* R. S.

Iconem huius serius dabimus.

Triest b. Stramane: TOMMASINI. Mai. ☉.

Baldingera G. M. S. Thyrsus lobatus. Spiculae compressae utrinque convexae, uniflorae, rudimentis duobus bivalvibus pilosis. Gluma bivalvis subaequalis carinata exalata. Glumella bivalvis, lanceolato-acuminata immersa.

493. Baldingera arundinacea DUMORT: thyrsus patente, gluma obtuse carinata integerrima. RCHB. *Fl. germ.* 33. 200. *Phalaris arundinacea* LINN. KUNTH 33. 11. KOCH 894. 5. *Arundo colorata* AIT. *Baldingera colorata* G. M. S. *Calamagrostis colorata* SIEBH. *Digraphis arundinacea* TRINUS. — Varietas *albolineata*: foliis eleganter viridi alboque lineatis e China orta.

Gramen elatum speciosum, spiculae passim ex albovirente purpurascens. Flos hermaphroditus glaber, rudimenta pilosella.

Icon. tab. CLXXXI. cum ramulo paniculae coerulescentis et infra spicula cum rudimento magis aucto.

Ad ripas, in fossis, paludibus, lacubus. Var. ex antiquissimis temporibus in hortis culta. Jun. Jul. 24.

Leersia SOLANDER ap. SWZ. Panicula effusa. Gluma nulla, glumella membranacea inaequaliter navicularis, compressa, carinata mutica, inferior latior trinervia, superior uninervia.

494. Leersia oryzoides SWARZ.: panicula patente, glumella infera pilosella carina setoso-ciliata. RCHB. *Fl. germ.* 33. 201. KUNTH 5. 1. KOCH 900. 1. *Phalaris oryzoides* LINN. *Homalocenchrus oryzoides* POLLECH. *Asprella oryzoides* LAM.

Gramen flavo-virens, repens, erectum, scabrum panicula in meridionali regione, apud nos autem nisi calidissimo aetumno effunditur — in supremi folii vagina tota inclusa, propterea *Ehrharta clandestina* WIGGERS.

Icon. tab. CLXXXI. Panicula normalis ad latas vagina cum panicula temperie injucunda suppressa clandestina deflorata. Spicula clausa, supra situs aculeorum, ad sinistram florens aperta et pistillum et squamulae calycis.

Ad ripas, in paludibus, in meridionali regione in oryzetis. Aug. Spt. 24.

Anthoxanthum LINN. Panicula thyrsoides. Spiculae triflorae, flore medio hermaphrodito, lateralibus neutris. Gluma inaequalis, inferior dimidio brevior 1-nervia superior trinervia. Glumella utriusque floris sterilis solitaria glabra ciliata obtusa crenulata bifida e fissura aristata. Floris hermaphroditi glumella ima basi coalita ventricosa truncata mutica. — Floris hermaphroditi glumella refert lodicularum naturam.

495. Anthoxanthum odoratum L.: thyrsus spiciformi ovato aut lobato, arista geniculata glumellam superante. REHB. *Fl. germ.* 53. 364. KUNTH 38. 1. 895. 1.

496. thyrsus interrupto.

497. thyrsus lobato paniculato, forma umbrosa.

498. β. A. villosum Lois.: totum pilosellum. Glumae videntur angustiores et aristae magis productae.

Icon. tab. CLXXXII. A. spicula sub anthesi. B. floris hermaphroditi glumella. C. D. glumellae florum sterilium.

In pratis, graminosis, ericetis, in siccis humidisque. Apr. Mai. Jul. Aug. 24.

Hierochloe GM. Panicula. Spiculae triflorae, flores laterales triandri, medius hermaphroditus diandrus. Glumae subaequales glumellas subaequantes. Glumellae aequales, infera 5-nervia acuta mutica aut aristata superior mutica. — Quasi Anthoxanthum floribus lateralibus perfectionibus masculis.

CLXXXIII. **499. Hierochloe australis** R. S.: cespitosa, masculis floribus aristatis, alterius arista uncinata, alterius brevi recta aut subnulla, hermaphrodito mutico: gluma fusculo-pallente, glumella fusea micante. REHB. *Fl. germ.* 53. 366. KUNTH 36. 3. KOCH 895. 2. *Holcus australis* SCHRAD. *odoratus* HOST. *Holcus odoratus* LINN. suec. cum seq. *Avena odorata* a. DEC.

In lucidis nemoribus. Apr. Mai. 24. In Bohemia vulgaris, in Moravia et Austria et in Silesia: inter Frankenstein et Wartha am Fleischerbusche am Fusssteige nach Priesnitz in Menge 1842: DITTRICH. In Bavaria: Nürnberg, Regensburg. In Helvetia: pr. Mühlhausen: HOFER, GAUDIN. — Nec in MORITZI: Flora d. Schweiz nec in Vrs. Fl. dalmatica. —

500. Hierochloe borealis R. S.: repens, masculis floribus breve aristatis aut muticis, spiculis flavo-virentibus demum fuscis. REHB. *Fl. germ.* 53. 365. *exsicc.* 1819. KUNTH 36. 1. *odorata* WAHLB. KOCH 895. 1. *Holcus borealis* SCHRAD. *odoratus repens* SCHK. *odoratus* TIMM. *repens* HOST. *Avena odorata* PERS. *Poa nitens* WEBER.

„Pili pedunculorum caduci“ WIERZBICKI.

Icon. tab. CLXXXIII. B. spicula florens.

In locis arenosis graminosis, pratis humidis. Mai. Jun. 24. In septentrionali regione, in media: München, Bohemia, Silesia, Moravia, in meridionali, Tirol: Soreghy bei Campidello im Fassathale, sed inundatione ibi deleta: Dr. FACCHINI; in arvis pr. Grebenaez in Bannato: WIERZBICKI.

Ampelodesmos LINK. Panicula. Spiculae 2—4-florae in axi articulato piloso. Gluma bivalvis lanceolato-acuminata exserta. Flores basi pilosi, glumella infera maior lanceolato-mucronata 5-nervia, supera bicarinata brevior. Germen superne pilosellum.

CLXXXIV. **501. Ampelodesmos tenax** LINK: panicula effusa secunda cernua, foliis anguste lineari-canaliculatis longissime attenuato-acutis. RECH. *Deutschl. Flora, Gräser* S. 51. 501. KUNTH 249. 1. KOCH 910. 1. *Arundo tenax* VAHL. *mauritanica* POIR. *festucoides* DESF. *Ampelodesmos* CYRILLO.

Gramen elatum culmo fereito.

Icon. tab. CLXXXIV. a. Spicula. A. pistillum et sepala. B. ovarium. C. pili stigmatidis. D. caryopsis antice visa. E. eadem postice visa. F. semen. G. embryo antice visus. H. idem a latere. Praeterea spicula et folii transsegmentum.

In arena littorali: Monte di Portofino Genuae: de VISIANI. Istria: SCOGLIO. SAN GIROLAMO ad exitum Portae Polae. 2. Mai 1843. PAPPERITZ et SENDTNER.

Phragmites TRIN. Panicula. Spiculae pedunculatae teretiusculae 3—6-florae. Gluma bivalvis inaequalis carinata. Flores in axi piloso exserti, inferior masculus reliqui hermaphroditi. Glumella infera longe acuminata trinervia, superior bicarinata bis vel ter brevior.

CLXXXV. **502. Phragmites communis** TRIN.: panicula pyramidali sub anthesi effusa erecta, ante et post anthesin conferta cernua. RECH. *Fl. germ.* 54. 369. KUNTH 251. 1. KOCH 909. 1. *Arundo phragmites* L. — Varict. *flavescens*: spiculis flavescens-tibus. *Fl. germ. exsicc.* 2124.

Icon. tab. CLXXXV. A. ramulus. C. spicula.

Ad ripas, in paludibus, lacubus fossis. Jul.—Aug. 24. Var. *flavescens* passim: Leipzig: PETERMANN. Bregenz: SAUTER. im Wallis b. Turtmann: G. RECH. fil. Triest: TOMMASINI.

503. Phragmites isiacus RECH.: panicula laxissime effusa, glumellis lineari-clongatis. RECH. ap. SIEB. *exs. Fl. germ. exc.* 140⁶. excl. locis. KUNTH 251. 2. *Arundo isiac* DELILE.

Gramen aegyptiacum comparandum, propterea quod praecedentis varietatem flavescenscentem quidam cum eo confundant. Specimen pr. Rosette legit SIEBER.

Arundo LINN. Panicula. Spiculae 2—5-florae. Glumae aequales aetae. Glumella infera longior, tricuspidata, basi cum rachi longe pilosa, superior brevior bicarinata obtusa.

CLXXXVI. **504. Arundo Donax** L.: panicula patente, spiculis subtrifloris, glumellae aristula apicibus lateralibus sublongiore, pilis glumellas subaequantibus, foliis ex ovata basi longe attenuatis. RECH. *Fl. germ.* 54. 371. KUNTH 246. 1. KOCH 909. 1. *Donax arundinaceus* P. B. *Scolochloa arundinacea* MERT. KOCH.

Spiculae fusculo-violaceae.

Icon. tab. CLXXXVI. A. spicula florens cum paleis et genitaliis.

In paludosis inprimis maritimis in regione meridionali saepius culta. Ad Montem di Portesimo Genuae: BERTOL *Fl. ital.* I. 733. spontanea videtur. In Istria, Tirol et in Helvetia culta. Oct. Nov. 24.

505. Arundo Plinii TURRA: panicula patente, spiculis 1—2-floris, gluma infera subtricuspidata apicibus lateralibus subnullis medio acuminato, foliis linearibus. RECH. *Fl. germ.* 54. 370. *A. mauritanica* DESF. KUNTH 246. 3. *Pliniana* KOCH 910. 2.

Spiculae illis praecedentis dimidio minores, lutescentes.

Icon. tab. CLXXXVI. B. spicula.

In insulae Cherso parte septentrionali. Nov. 24. NOE. Venetiis: MORETTI.

Digitaria Scop. Spicae subdigitatae. Spiculae geminae uniflorae cum altera sessili altera pedunculata. Glumina inaequalis infera parva rudimento floris secundi, aut subnulla supera trinervia. Glumella infera trinervia, supera binervia.

CLXXXVII. **506. Digitaria filiformis** KOEL.: spicis 3—4, spiculis ellipticis puberulis, nervis foliis vaginisque glabris, culmis prostratis. RCHB. *Fl. germ.* 23. 121. *Panicum glabrum* GAUDIN. KUNTH 83. 51. KOCH 892. 3. *humifusum* KUNTH gram. *lineare* KROCK. *arenarium* M. B. *Ischaemum* SCHREB. *humifusum* KUNTH gram. *Syntherisma glabrum* SCHRAD. *Digitaria humifusa* PERS. *glabra* R. S. *Paspalum ambiguum* DEC. *Agrostis lenta* AIT. Gramen humile prostratum purpurascens.

Icon. tab. CLXXXVII. figura floris adstat.

In cultis et incultis. Jul.—Spt. ☉.

507. Digitaria sanguinalis SCOPOLI: spicis 4—5-patentibus, spiculis oblongo-lanceolatis, gluma neutrius floris puberula nervis lateralibus glabris, foliis vaginisque pilosellis. RCHB. *Fl. germ.* 23. 122. *ersicc.* 512. *marginata* LINN. *Panicum sanguinale* LINN. KUNTH 82. 47. KOCH 891. 1. *Linkianum* KUNTH gram. *Paspalum sanguinale* α. LAM. *Dactylon sanguinale* VILL. *Syntherisma vulgare* SCHRAD. *praeco* WALT. CAROL. *Cynodon praeco* R. S.

Spithamaea—pedalis adscendens.

In arenosis, vineis. Jul.—Spt. ☉.

508. Digitaria ciliaris KOELER: spicis 3—5, spiculis oblongo-lanceolatis, gluma neutrius floris puberula, nervis lateralibus ciliatis, foliis vaginisque pilosis. RCHB. *Fl. germ.* 23. 123. *Panicum ciliare* RETZ. KUNTH 82. 43. KOCH 891. 2. *Paspalum ciliare* DEC. *Syntherisma ciliare* SCHRAD.

Icon. tab. CLXXXVII. flos externe visus cum valva separata, sequuntur glumellae et granum.

In arenosis in regione meridionali non rara, in media passim: in Flora rhenana Basel bis Mainz, in septentrionali rarior: Lusatia, Stettin. Jul.—Spt. ☉.

Setaria P. B. Thyrsus spiciformis. Spiculae setis stipatae biflorae, flos alter neuter 1—2-valvis. Gluma inaequalis, superior longior 7-nervia. Glumella subaequalis cartilaginea obtusa mutica inferior 7-nervia superior 5-nervia.

CLXXXVIII. **509. Setaria glauca** P. B.: thyrsu cylindrico, setis aurantiis sursum scabris, glumellis hermaphroditi floris rugosis illam neutrius duplum longis. RCHB. *Fl. germ.* 29. 168. KUNTH 149. 2. KOCH 893. 3. *pumila* R. S. *Panicum glaucum* L. *penicillatum* N. v. E. *flavescens* MÖNCH. *lutescens* WEIG. *laevigatum* β. LAM. *pumilum* POIR. *Pennisetum glaucum* R. BR.

Icon. tab. CLXXXVIII. B. spiculae et C. apex involucri.

In agris post messem. Jul.—Spt. ☉.

510. Setaria viridis P. B.: thyrsu cylindrico, setis sursum scabris, glumellis hermaphroditi floris laevibus illam neutrius aequantibus. RCHB. *Fl. germ.* 29. 169. KUNTH

151. 12. KOCH 803. 2. *Panicum viride* LINN. *bicolor* MÖNCH. *laevigatum* α. LAM.
Pennisetum viride R. BR. — β. *P. reclinatum* VILL. *Setaria Weinmanni* R. S.

Setae virides aut violascentes.

Icon. tab. CLXXXVIII. D. spiculae cum involuero.

In cultis. Jul. Aug. ☉.

511. *Setaria verticillata* P. B.: thyrsus cylindrico verticillato-interrupto, setis 1—2 retrorsum aculeolatis, glumella hermaphroditi floris laevi illam neutrius aequantibus. RCHB. *Fl. germ.* 29. 120. KUNTH 152. 21. KOCH 893. 1. *Panicum verticillatum* L. *asperum* LAM. *Pennisetum verticillatum* R. BR.

Plerumque tota viridissima.

In cultis. Jul. Aug. ☉.

Setaria germanica P. B. et ***italica*** P. B.: cultae passim in Gram. cultis dabuntur.

Orthopogon R. BR. Spicae in raclo communi breves. Spiculae biflorae: flos alter neuter. Gluma inferior maior utraque aristata, glumella fertilis floris infera obtusa trinervis, supera emarginata binervis, neutrius floris inferior 7-nervis mucronata, superior minor aut nulla.

CLXXXIX. **512. *Orthopogon Burmanni*** R. BR.: spicis multifloris, gluma pilosella, arista tenui acuta scabra, foliis lanceolatis basi undulatis, vagina marginem versus pilosa. RCHB. *Fl. germ.* 23. 125. *Oplismenus Burmanni* P. B. KUNTH 139. 5. *Panicum Burmanni* RETZ. *hirtellum* BURM. HOST. *bromoides* LAM.

Icon. tab. CLXXXIX. adstat valva pilosa cum arista scabra.

In paludosis littoralibus Aquilejae: JAN. Aug. Spt. 24. Nuper ibi sequens repertus, sed etiam Hostiani horti specimina nostrae speciei Aquilejae lecta fuerunt.

513. *Orthopogon undulatifolius* R. BR.: spicis paucifloris 2—3 fasciculatis, glumella glabriuscula, aristis laevibus, foliis ovato-lanceolatis basi undulatis, vagina pilosa. RCHB. *Fl. germ.* 23. 124. *Oplismenus undulatifolius* R. S. KUNTH 139. 1. *Panicum undulatifolium* ARD. *hirtellum* WULF.

Icon. tab. CLXXXIX. additur figura floris utriusque et valva aristata a dorso visa, in hac specie glabritie insignis.

In silvis umbrosis. Aug. Spt. ☉. Littorale b. Aquilejae: TOMMASINI. Südtirol, Val Sugano: POLLINI. Auma b. Botzen: v. HAUSMANN. Canton Tessin, Lavis, Luggaris, Codelego, Clefen: MORITZ, THOMAS. Masena am Val Vigezza b. Crevola u. am Golf von Agro am lago di Muzano am San Salvador: LAGGER. Chiasso b. Como: ODESCALCHIO. Turin: v. CHARPENTIER. Mailand b. Buffaloro: BALSAMO CRIVELLI. Verona: v. CHARPENTIER.

Lappago SCHREB. Spica composita, spiculae ternae uniflorae flos mediae fatuus. Gluma inaequalis, infera parva membranacea enervia, supera major coriacea navicularis acuta 7-nervia, nervis aculeatis. Glumella inferior longior acuta trinervia, superior brevis emarginata.

CXC. **514. *Lappago racemosa*** WILLD. Sola species. Radix fibrosa, culmi prostrati aut adscendentes spithamei, gluma superior viridis demum purpurascens. RCHB. *Fl. germ.* 24. 127. KUNTH 170. 1. *Tragus racemosus* DESF. KOCH 819. 1. *Cenchrus racemosus* L.

Icon. tab. CXC. A. spicula. B. flos fertilis. C. flos sterilis. D. pistillum.

In arenosis et tutosis ad vias in collibus, ruderalis. Jun. Aug. ☉. Pr. Gent in Belgia: van HOORBECKE, in Moravia: Franzensberg u. Spielberg b. Brünn: HOCHSTETTER. Wagram bei Wien: UNGER. Istria, Croatia, Dalmatia, n. Tirol merid. Lombardia, Pedemontio, Liguria et Vallesia.

- **Echinochloa** P. B. Spicae in rachi communi alternae. Spiculae biflorae, flos alter neuter. Gluma infera minor trinervia, supera 5-nervia mucronata aut ex apice aristata. Glumella floris hermaphroditi infera 5-nervia, supera enervia mutica, floris neutri inferior similis illi hermaphroditi floris, superior multo brevior rotundata aut subnulla.

CXCI. **515—16. Echinochloa crus galli** P. B.: spicae secundae, spiculae approximatae scabrae in rachi 5-angulari. RICH. *Fl. germ.* 23. 126.

515. aristata: gluma superiore longe-aristata.

516. mucronata: gluma ejusdem superiore mucronata.

Icon. tab. CXCI. A. spicula aperta in ea ad dextram flos sterilis, ad sinistram hermaphroditus.

In cultis et ruderalis, fossis, locis humidis. Jul.—Spt. ☉.

517. Echinochloa cruciformis RICH.: spicis alternis sessilibus arrectis secundis, gluma neutrius floris acuta, glumis vaginisque pilosellis. RICH. *Fl. germ.* 140¹. 126b. *Panicum cruciforme* SM. *Fl. graec.* KUNTH 78. 21. *cruciforme* (ex errore) R. S. Beckmannia diffusa WELW. in litt.

Icon. tab. CXCI. B. spicula aperta.

In Dalmatia pr. Ragusam: WELWITSCH. Bergamo pr. Ragusam: NEUMAYER. Littorale pr. Osero: NOE. Juni. ☉.

Panicum LINN. Panicula. Spiculae biflorae: flos alter hermaphroditus alter neuter. Gluma inaequalis mutica, infera minor 5-nervia, superior plurinervia. Glumellae hermaphroditi floris mutica, inferior 7-nervia, superior 5-nervia demum cartilaginea, alterius floris inaequalis infera plurinervia, superioris minima enervia.

CXCII. **518. Panicum capillare** L.: panicula erecta, ramis rigide diffusis capillaribus, foliis vaginisque hirsutis. RICH. *Fl. germ.* 29. 172. KOCH 892. 6.

Pedale et ultra, rigens hirsutum, panicula capillari-effusa.

In cultis passim quasi spontaneum ex America boreali ortum. Jul.—Spt. Oct. ☉.

519. Panicum miliaceum L.: panicula nutante, ramis laxis, foliis vaginisque hirsutis. RICH. *Fl. germ.* 29. 173. KUNTH 104. 195. KOCH 892. 5. *P. Miliun* PERS. *esculentum* MÖNCH. — Varietas β . *violaceum*: herba fructibusque violaceis.

Icon. tab. CXCII. A. spicula. B. eadem aperta. C. gluma infera. E. flosculi sterilis gluma infera et F. supera. G. eadem postice visa. H. flosculus. I. glumella infera. K. glumella supera. L. sepal. M. pistillum. N. stigmati ramulus. O. flos fructifer P. Q. earyopsis in glumellis. R. eadem transsecta. S. earyopsis glumellis liberata.

Cultum ex Oriente ortum, in Bannata quasi spontaneum. Jul. Aug. ☉.

Icones addendae.

Pag.	17.	sub	lin.	2.	inser.:	leon. tab. XCIV. cum spicula florente.
"	"	"	"	13.	"	leon. tab. XCIV. cum spicula et flore sub anthesi.
"	"	"	"	21.	"	leon. tab. XCIV. cum spicula, flore sub anthesi et glumella exteriori magis aucta.
"	"	"	"	27.	"	leon. tab. XCIV. cum spicula aperta normali et alia clausa flore utroque aristato abnormi ex eadem panícula.
"	"	"	"	38.	"	leon. tab. XCV. <i>Aira flexuosa</i> L. genuina: A. spicula florens. B. flos. — <i>Aira discolor</i> Thuill.: C. spicula. D. flos. E. glumella interior. F. apex ejus. G. glumellae externae apex.
"	18.	"	"	3.	"	leon. tab. XCV. H. spicula. I. glumella externa.
"	"	"	"	33.	"	leon. tab. XCVII. A. spicula florens cum glumella interna magis aucta.
"	"	"	"	38.	"	leon. tab. XCVII. B. spicula florens cum glumella interna magis aucta.
"	19.	"	"	11.	"	leon. tab. XCVIII. sub anthesi et post anthesin. A. spicula florens. B. apex glumellae externae. C. apex glumellae internae.
"	"	"	"	20.	"	leon. tab. XCIX. A. spicula. B. flos.
"	"	"	"	26.	"	leon. tab. XCIX. C. spicula.
"	"	"	"	ultim.	"	leon. tab. XCIX. D. flos.
"	20.	"	"	13.	"	leon. tab. C. fig. B. spicula.
"	"	"	"	21.	"	leon. tab. C. fig. C. spicula.
"	"	"	"	30.	"	leon. tab. C. fig. A. spicula.
"	"	"	"	36.	"	leon. tab. CI. fig. A. spicula.
"	"	"	"	42.	"	leon. tab. CI. fig. B. spicula.
"	21.	"	"	7.	"	leon. CI. Addidi figuras: C. spicula, cujus flos superior masculus. D. flores separati. E. segmentum folii radicalis cum ligula. F. segmentum folii culmei cum ligula biaurita.
"	"	"	"	20.	"	leon. tab. CII. A. spicula. B. flos.
"	"	"	"	26.	"	leon. tab. CII. florens et fructifera cum C. gluma et D. flore.
"	"	"	"	32.	"	leon. tab. CII. cum spicula aucta.
"	"	ante	"	ultim.	"	leon. tab. CII. E. gluma. F. glumella.
"	22.	sub	"	4.	"	leon. tab. CIII. cum spicula.
"	"	"	"	13.	"	leon. tab. CIV. A. gluma. B. flos. — var. <i>compressa</i> Heuff.: ad latus adduntur glumae, flos et flores superi.
"	"	"	"	28.	"	leon. tab. CIV. C. glumae. D. flos.
"	"	"	"	38.	"	leon. tab. CV. fig. A. spicula.
"	23.	"	"	2.	"	leon. tab. CV. fig. B. spicula.
"	"	ante	"	ultim.	"	leon. tab. CVI. spiculae.
"	24.	sub	"	8.	"	leon. tab. CVI. A. glumae. B. flos. C. glumellae exterioris apex.
"	"	"	"	18.	"	leon. CVII. A. pars spicae. B. pars alia cui floris alterius tantum pedicellus enascitur. C. spicae pars extrema. D. flores, inferior explicatus cum pistillo et stamine. E. gluma. F. glumella interior floris inferioris. G. pistillum cum palea. H. flos spicae terminalis.
"	"	"	"	27.	"	leon. tab. CVIII. A. folium summum cum vagina. B. pars spicae a latere. C. pars spicae antice visa, glumis apertis. D. flos interior. E. gluma. F. genitalia. G. spicae pars terminalis a latere.
"	"	"	"	35.	"	leon. tab. CVIII. particula spicae cum flore aperto.
"	25.	"	"	2.	"	leon. tab. CIX. A. particula spicae cum flore aperto. B. glumellae. C. genitalia. D. flos terminalis.
"	"	"	"	10.	"	leon. tab. CIX. E. pars spicae. F. Flores e scrobiculo. G. gluma transsecta. H. glumella interior transsecta.

Index.

A.

Aegilops L. pag. 26.

caudata L. 243.
cylindrica Host. 243.
geniculata Roth. 240.
incurvata L. 222.
ovata L. 240.
triaristata W. 241.
triuncialis L. 242.

Agruolus alpinus P. Beauv. 127.
caninus P. Beauv. 128.

Agropyrum Gärtn. p. 29.

acutum R. S. 264, 266.
arvense Schrk. 257.
biflorum Brign. 283.
caninum R. S. 254.
cristatum P. Beauv. 255.
dumetorum Schrk. 259.
firmum Pers. 256.
glaucum R. S. 262, 269.
Halleri Rehb. 276.
juncum P. Beauv. 267.
β — giganteum Rth. 271.
Leersianum Schrk. 261.
littorale Host. 263.
pungens R. S. 267.
repens P. Beauv. 256—261.
rigidum R. S. 271.
strictum Dethard. 268.
subulatum Schrk. 258.
villosum Lk. 272.

Agrostis L. p. 8.

aculeata Scop. 468.
alopecuroides Lam. 170.
alpina Scop. 126.
alpina W. 127.
ambigua R. S. 133.
arundinacea L. 143.
australis L. 122.
bermudiana Leers. 454.
Calamagrostis L. 167.
Canina L. 128.

capillaris Poll. 134.
coarctata Hoffm. 134.
crinita Mueh. 170.
decumbens Gaud. 134.
densa M. Bieb. 138.
festucoides Vill. 126.
gigantea Rth. 136.
glauescens Pr. 139.
hybrida Gaud. 130.
incurvata Scop. 222.
interrupta L. 123.
lendigera Poir. 122.
lenta Ait. 506.
linearis Retz. 454.
maritima Lam. 139.
miliacea L. 162.
minima L. 453.
panicus W. 170.
panicea Lam. 122.
patula Gaud. 135.
pilosa Schleich. 141.
pumila L. 132.
pungens Schreb. 140.
pungens Pall. 361.
purpurea Gaud. 124.
rupestris W. 126.
rupestris All. 127.
rupestris DeC. 127.
serotina L. 432.
setacea Vill. 127.
spica-venti purpur. Schleich. 124.
spica-venti L. 125.
spuria R. S. 141.
stipata Koel. 167.
stolonifera L. 133—137, 139.
stolonifera vivipara silvatica Huds. 137.
stolonifera Sm. 138.
triaristata Knapp. 170.
raria Host. 134.
ventricosa Gou. 122.
verticillata Vill. 138.
vulgaris Wither. 130—132.

Aira L. pag. 17.

alba Wulf. 445.
aquatica β. Huds. 357.

aquatica L. 374.
atrovirens Thuill. 372.
canescens L. 178.
capillaris Host. 181.
caryophylla L. 180.
cespitosa L. 185—189.
cristata L. 174.
coerulea L. 372.
dactyloides Rochel. 176.
discolor Thuill. 183.
elegans W. 181.
flexuosa L. 182.
inflexa Lois. 180.
juncifolia Wulf. 446.
Leersii Lois. 180.
paludosa Wibel. 189b.
paludosa Weihe. 184.
parviflora Thuill. 189.
praecox L. 179.
pusilla Wigg. 179.
subspicata L. 200.
subspicata Radner. 179.
uliginosa Weihe. 184.
callesiaca All. 175.
Wibeliana Sonder. 189b.

Airochloa cristata Lk. 144.

Alopecurus L. pag. 62.

agrestis L. 473.
aristatus Huds. 170.
arundinaceus Poir. 477.
bulbosus L. 474.
creticus Trin. 455.
fulvus Sm. 476.
geniculatus L. 472.
intermedius Bock. 477.
nigricans Horn. 477.
nigrescens Jacq. f. 477.
nigrescens-pratensis Whlbg. 477.
panicus L. 170.
panicus Fl. Dan. 472.
pratensis L. 478.
pratensis β. M. Bieb. 477.
ramosus Poir. 472.
repens M. Bieb. 477.

ruthenicus Weinm. 477.
sibiricus Jacq. fils. 477.
utriculatus Pers. 471.
caginalus Pall. 479.
rentricusus Pers. 477.

Ampelodesmos. pag. 67.

tenax Lk. 501.

Andropogon L. pag. 59.

Allionii DeC. 458.
angustifolium Sm. 461.
arundinaceus Scop. 461.
avenaceus Kunth. 464.
cernuus Roxb. 466.
contortum All. 458.
distachyos L. 207.
gryllus L. 208.
halepense Sibth. 464.
hirtus L. 460.
ischaemum L. 461.
paniculatus Lam. 208.
pubescens Vis. 459.
Ravennae L. 456.
saccharatus Roxb. 465b.
Sorghum Brot. 465.
strictum Host. 457.

Ammophila arearia Lk. 157.
arundinacea Host. 157.
baltica Lk. 158.

Anemagrostis spica-venti Trin. 125.

Anemochloa spica-venti DeC. 125.

Anthoxanthum L. pag. 66.

aculeatum L. 468.
odoratum L. 495—497.
paniculatum L. 325.
villosum Lois. 498.

Antitragus aculeatus Gästn. 468.

Apera Adans. pag. 7.

interrupta P. Beauv. 123.
purpurea P. Beauv. 124.
spica-venti P. Beauv. 125.

Arrhenatherum P. B. pag. 19.

avenaceum P. Beauv. 192.
elatius M. et Koch. 192.
nodosum-avenaceum. 193.

Arundo L. pag. 67.

acutiflora Schrad. 145.
agrostis Scop. 145.
Ampelodesmos Cyr. 501.
annulata R. S. 152.
areolaria L. 157.
baltica Flüg. 158.
Calamagrostis L. 151.
Calamagrostis M. Bieb. 154
canescens Wigg. 151.
colorata Ait. 493.

Fl. Germ. Tom. I.

Donax L. 504.
festuacea W. 434.
festucoides Desf. 501.
Halleri W. 167.
Halleriana Gaud. 147.
humilis R. S. 141.
intermedia Gmel. 154.
isiacus Delil. 503.
Leersii Oettl. 151.
littorea Schrad. 152.
mauritanica Poir. 501.
mauritanica Desf. 505.
montana Gaud. 146.
neglecta Ehrh. 142.
Phragmites L. 502.
Plinianii Koch. 505.
Plinii Turr. 505.
Pseudophragmites Schrad. 147.
pseudophragmites Hall. 152.
pygmaea Spr. 195.
Schrebii Spr. 122.
Schrebii Schult. 122.
sibirica Schrad. 143.
speciosa Schrad. 167.
stricta Timm. 142.
tenax Vahl. 501.
tenella Schrad. 141.
vavia Schrad. 146.

Asprella nardiformis Host. 221.
oryzoides Lam. 494.

Avena L. pag. 19.

airoides Koel. 200.
alpestris Host. 204.
alpina Sm. 212.
argentea W. 198.
brevifolia Host. 199.
brevis Rth. 215.
bromoides L. 207b.
bulbosa W. 193.
canescens Web. 178.
cantabrica Lag. 213.
capillaris Koch. 181.
caryophyllea Weh. 180.
compressa Henfl. 210.
disticha Lam. 198.
distichophylla Vill. 199.
distichophylla Host. 198.
dubia Leers. 197.
clatior L. 192.
fallax R. S. 214.
fatua L. 218.
fertilis All. 197.
flavescens L. 204—206.
flexuosa M. Bieb. 182.
fragilis L. 168.
glauca Lap. 208.
hybrida Peterm. 217.
lanata Koel. 190.
Löfflingiana Cav. 195.
longifolia Thore. 203.
lucida Bert. 209.
macrocarpa Mch. 219.
mollis Koel. 191.
myriacantha Bertol. 196.
neglecta Savi. 194.
nuda L. 216.
odorata Pers. 500.

odorata a. DeC. 499.
panicea Lam. 194.
paniculmis Eng. Bot. 212.
paniculmis Schrad. 210. 211.
praeox P. Beauv. 179.
praeusta Rehb. 212.
pratensis Gort. 213.
pratensis L. 217.
procatoria Thuill. 193.
pubescens L. 213.
pygmaea Poll. 195.
Scheuchzeri Ait. 208.
sedeneris DeC. 214.
sempervirens Vill. 214.
sesquitertia W. 198.
sesquitertia Host. 201.
sesquitertia L. 213.
sesquitertia Ten. 214.
spicata All. 433.
sterilis L. 219.
striata Lam. 197.
strigosa Schreb. 217b.
subspicata Clairv. 200.
tenuis Mach. 197.
Thorei DeC. 203.
triaristata Vill. 197.
villosa Bertol. 202.

B.

Baldingera G. M. S. pag. 65.

arundinacea Dumort. 493.
colorata G. M. S. 493.
Beckeria ciliata Bernh. 435.

Beckmannia Host. pag. 56.

ericaeformis Host. 452.
diffusa Wellw. 517.
Blumenbachia halepensis Koel. 464.

Brachypodium P. Beauv. pag. 32.

cespitosum R. S. 282.
distachyon R. S. 287.
genuense R. S. 285.
gracile P. Beauv. 277—279.
Halleri R. S. 276.
hispanicum Rehb. 276b.
loliaceum R. S. 274.
maritimum R. S. 371.
pinnatum P. Beauv. 280. 281.
pinnatum β. *cespitosum* Koch. 282.
Pluckenctii Lk. 285.
Poa R. S. 276.
psilanthum Lk. 288.
ranosum R. S. 285. 286.
rupestre R. S. 280.
sylvaticum R. S. 277.
tenellum P. Beauv. 288.
tenuiflorum R. S. 288.

Briza L. pag. 53.

aspera Knapp. 428.
Eragrostis L. 426.

maxima L. 431.
media L. 429.
minor L. 428.
virens L. 430.
virens β . DeC. 428.

Bromus L. pag. 41.

agrestis All. 360.
alopecuroides Moris. 349.
altissimus Web. 357.
ambiguus Cyril. 293.
angustifolius Sebrk. 360.
ardennensis Kunth. 351.
arundinaceus Rth. 334.
arvensis Fl. dan. 353.
arvensis L. 343.
arvensis Poll. 360.
asper Gm. 357.
asper L. 357.
auriculatus Leyss. 351.
badensis Gm. 353.
bohemicus Schmidt. 290.
brachystachys Horn. 334b.
cespitosus Host. 282.
ciliatus Lam. 287.
clavata Mueh. 292.
commutatus Schrad. 347.
commutatus K. et Z. 344.
confertus M. Bieb. 349.
corniculatus Lam. 282.
cristatus L. 255.
decolorans Rehb. 319.
decumbens Koel. 433.
diandrus Curt. 342.
distachyos L. 287.
distichus Mueh. 339.
divaricatus Rohde. 352.
divergens Rehb. 354.
dortomensis All. 293.
dumosus Vill. 277.
elatior Koel. 330.
elatior Spr. 334.
elongatus Gaud. 353.
erectus Moris. 349.
erectus Huds. 360.
Gaudini R. S. 348.
giganteus L. 358.
glauca Hort. 313.
glomeratus Scop. 363.
gracilis Weig. 277.
gracilis Leyss. 280.
grandiflorus α . Weig. 339.
grossus α . M. et K. 350.
grossus β . Gaud. 350.
gynandrus Rth. 342.
hirsutus Curtis. 357.
hirsutus Schm. 355.
hordeaceus L. 348.
hordeaceus Gm. 353.
hordeiformis Lam. 291.
incrassatus Lam. 341.
inermis L. 335.
intermedius Guss. 349.
lanuginosus Poir. 352.
laxus Horn. 359.
ligusticus All. 292.
littoreus Retz. 334.
longiflorus W. 336b.
madritensis L. 342.

madritensis Vahl. 341.
maximus Desf. 338.
mollis L. 345. 346.
montanus Fl. Wett. 360.
montanus Poll. 357.
multiflorus Sm. 350.
multiflorus Weig. 343.
multiflorus Rth. 348.
multiflorus DeC. 344.
multiflorus var. β . Rehb. 351.
multispicatus R. S. 342.
 muralis Huds. 342.
nannus Weig. 345.
nemoralis Huds. 357.
nemorosus Vill. 357.
patulus M. et K. 344.
pauper Gm. 287.
perennis Vill. 360.
pinnatus L. 280.
pinnatus β . L. 277.
platystachyos Lam. 287.
Pluckenetii All. 285.
polystachys DeC. 342.
pratensis Spr. 330.
pratensis Ehrh. 348.
pratensis Gm. 360.
pseudoarvensis Koel. 360.
racemosus L. 348.
ramosus L. 285.
ramosus Murr. 357.
rigidus Rth. 341.
Rochelianus Opitz. 342.
rubens Host. 341.
rapestris Host. 280.
scaberrimus Bert. 342.
secalinus L. 353. 354.
secalinus M. Bieb. 347.
secalinus α . *grossus* Koch. 350.
simplex Gaud. 347. 348.
spiculitenuata Knapp. 343.
squarrosus L. 355. 356.
squarrosus Host. 355.
sterilis L. 339.
stipoides Desf. 292.
strictus Scop. 432.
sylvaticus Poll. 277.
tectorum L. 340.
temulentus Bernh. 231.
thuringiaca Heynh. 354.
triflorus Poll. 197.
triflorus Ehrh. 326.
tricalis Savi. 337.
triaristatus Lois. 351.
truncatus Scop. 267.
turgidas Pers. 352.
versicolor Poll. 343.
viciosus Weig. 353.
villosus Forsk. 341.
villosus Gm. 355.
volgensis Spr. 347.

Bruchmannia eruciformis Nutt. 452.

C.

Calamagrostis Rth. pag. 9.
acutiflora DeC. 145.

alpina Host. 141.
argentea DeC. 167.
arundinacea Rth. 143.
Clavensis Lois. 147.
colorata Sibth.* 493.
conspicua Berg. 167.
Epigeios Rth. 154.
Gaudiana Rehb. 150.
glauca M. Bieb. 155.
Halleriana DeC. 147.
Hibneriana Rehb. 156.
lanceolata Rth. 151.
laxa Host. 153.
littorea DeC. 152.
montana Host. 146.
mutans Saut. 149.
Pseudophragmites Lk. 147—149.
pulchella Saut. 148.
pyramidalis Host. 143.
ramosa Host. 151.
sylvatica DeC. 143. 144.
speciosa Host. 167.
stricta Spr. 142.
subulata Dumort. 145.
tenella Lk. 141.
varia Host. 147.

Catabrosa P. Beauv. pag. 47.
aquatica P. Beauv. 374.

Catapodium Lk. pag. 32.
foliaceum Lk. 274.

Cenchrus capitatus L. 441.
racemosus L. 514.

Chamagrostis minima Borkh. 453.

Chloris maritima Trin. 454.

Chrysopogon Gryllus Trin. 208.

Chilochloa P. Beauv. pag. 64.
arenaria P. Beauv. 481.
aspera P. Beauv. 486.
Böhmeri P. Beauv. 487.
cuspidata R. S. 489.
Micheli Rehb. 488.

Chrysurus Pers. pag. 46.
aureus P. B. 367.

Coleanthus Seid. pag. 61.
subtilis Seid. 467.

Colobachne P. Beauv. pag. 63.
Gerardi Lk. 479.

Corynephorus P. Beauv. pag. 16.
canescens P. Beauv. 178.
Craepulia temulenta Schrnk. 231.

Crypsis All. pag. 61.

- aculeata* All. 468.
aculeata β. W. 469.
alopeuroides Schrad. 470.
arenaria Desf. 481.
geniculata R. S. 470.
macrostyla Brot. 470.
schenoides Lam. 469.

Cynodon Rich. pag. 57.

- Dactylon* Rich. 454.
praecox R. S. 507.

Cynosurus L. pag. 45.

- aureus* P. Beauv. 367.
aureus L. 367.
corallinus L. 444.
cristatus L. 366.
cylindricus Balb. 445b.
distichus Hoffm. 258.
durus L. 368.
echinatus L. 365.
eruciformis Ait. 452.
microcephalus Hoffm. 442.
ovatus Hippe. 442.
panicus L. 170.
sphaerocephalus Wulf. 443.
sphaerocephalus Koel. 443.

D.

Dactylis L. pag. 45.

- abbreviata* Bernh. 363.
altaica Bess. 364.
cristata M. Bieb. 174.
cylindrica Brot. 362.
distichophylla Brign. 361.
glaucescens W. 364.
glomerata L. 363. 364.
glomerata β. *hispanica* Koch. 362.
hispanica Roth. 362.
littoralis W. 361.
maritima Sullr. 361.
repens Desf. 361.
stricta Ait. 451.
villosa Ten. 362.

- Dactylon officinale* Vill. 454.
sanguinale Vill. 507.

Danthonia DeC. pag. 24.

- alpina* Vest. 220.
calycina Rehb. 220.
decumbens DeC. 433.
provincialis DeC. 220.
spicata β. W. 220.
stricta Host. 220.
-strigosa P. Beauv. 217b.

- Deschampsia cespitosa* P. Beauv. 185.

- Deraeura fluitans* P. Beauv. 380.

- Deyeuxia acutiflora* Kuth. 145.
montana Poir. 146.
neglecta Kuth. 142.
sylvatica Kuth. 143.
varia Kuth. 146.

Digitaria Scop. pag. 68.

- ciliaris* Koel. 508.
filiformis Koel. 506.
glabra R. S. 506.
hamifusum Pers. 506.
linearis Pers. 454.
marginata Lk. 507.
maritima Spr. 454.
sanguinalis Scop. 507.
stolonifera Schrad. 454.
stolonifera Ekl. 454.

- Digraphis arundinacea* Trin. 493.

Diplachne P. Beauv. pag. 53.

- serotina* L. 432.

- Donax borealis* Trin. 434.
festucaceus P. Beauv. 434.
arundinaceus P. Beauv. 504.

E.

Echinaria Desf. pag. 55.

- capitata* Desf. 441.

Echinochloa P. Beauv. pag. 70.

- Crus Galli* P. Beauv. 515. 516.
eruciformis Rehb. 517.

- Eleusine dura* Lam. 368.

Elymus L. pag. 28.

- arenarius* L. 247. 248.
caninus L. 254.
crinitus Schreb. 244. 245.
europaeus L. 246.
intermedius M. Bieb. 244.

- Enodium altissimum* Lk. 373.
coeruleum Gaud. 372.

Eragrostis Host. pag. 52.

- major* Host. 426.
megastachya Lk. 426.
pilosa P. Beauv. 424. 425.
poaeformis Lk. 427.
poaeoides α. Trin. 426.
poaeoides P. Beauv. 427.
verticillata P. Beauv. 425.

- Erianthus Ravennae* P. Beauv. 456.
strictus Baldw. 457.

F.

Festuca L. pag. 35.

- acuminata* Gaud. 315.
alpina Gaud. 298.
alpina Host. 317.
amethystina Host. 301.
arundinacea Schreb. 334.
arundinacea Lilje. 434.
aspera M. et K. 357.
aurata Gaud. 300.
baltica Horn. 321.
barbata Schrnk. 321.
bromoides L. 293.
calamaria Sm. 326.
canescens Lois. 306.
cespitosa Desf. 285.
ciliata Gon. 287.
ciliata Pers. 289.
clavata Mueh. 292.
coerulea DeC. 372.
cristata Vill. 174.
cristata L. 337.
curvula Gaud. 304.
decidua Sm. 326.
decumbens L. 433.
diandra Mueh. 287.
dichotoma Forsk. 371.
distachya Koel. 287.
distans Kuth. 375.
donacina Whlbg. 434.
Drymeia M. et K. 328.
dumetorum Rafn. 321.
dura Vill. 368.
duriuscula L. 302—311.
duriuscula L. 303.
duriuscula β. *raginata* Koch. 313.
duriuscula L. 323.
elatior L. 330. 334.
exaltata Prsl. 328.
eskia Ramond. 320.
expansa Kuth. 382.
fusculata Forsk. 291.
flavescens Bellardi. 317.
Gaudini Kuth. 297.
geniculata W. 292.
germanensis Poll. 285.
gigantea Vill. 358.
gigantea β. *triflorus*. 358.
glauca Lam. 307.
glomerata All. 363.
gracilis Mueh. 277.
Halleri Gaud. 297.
Halleri All. 299.
heterophylla Hnke. 323.
hirsuta Host. 305.
hirta Seenus. 360.
hispanica Kuth. 276b.
Hostii Kuth. 378.
incrustata Charp. 319.
inermis DeC. 335. 336.
juncu Mueh. 267.
Lachenalia Spen. 276.
Lachenalia β. *ramosa* Koch. 276.
laevigata Clairv. 309.
lanceolata Forsk. 371.
latifolia Host. 327.
laxa Host. 314.
laxa Seringe. 319.

Leysseri Mueh. 336.
ligustica Bertol. 292.
littoralis Sibth. 360.
littorea Whlbg. 334.
longiflora W. 336b.
madritensis Vahl. 341.
maritima Löffl. 276b.
maritima DeC. 371.
monostachya Poir. 287.
montana Rehb. 328.
montana Savi. 360.
montana Sternb. & Ilppe. 423b.
myurus L. 289.
myurus Ehrh. 290.
nemorum Leyss. 323.
nigrescens Lam. 322.
nigricans Schleich. 322.
nutans Host. 324.
nutans Mueh. 254.
ovina L. 294.
ovina β . *alpina* Koch. 297.
ovina ϵ . *amethystina* Koch. 301.
ovina γ . *duriuscula* Koch. 302.
pallens Host. 308.
pallida Murr. 300.
paludosa Gaud. 294.
palustris Seenus. 378.
pannonica Wulf. 310.
phalaroides Lam. 362.
phleoides Vill. 337.
pilosa Hall. 318.
pinnata Mueh. 280.
Poa Kunth. 276.
poaeformis Host. 318.
poaeformis Pers. 336.
poaeoides Thuill. 336.
pratensis Hud. 330—333.
procumbens Kunth. 369.
pseudodistachya Koel. 287.
Pseudomyurus Willem. 290.
pulehella Schrad. 324.
pumila Vill. 316.
questphalica Bönningh. 312.
rhaetica Suter. 318.
rigida Kunth. 370.
rotboelliioides Kunth. 274.
rubra L. 321.
rubra β . *dumetorum*. 321.
rubra diversifolia. 323.
Scheuchzeria Gaud. 324.
sciuroides Rth. 293.
serotina L. 432.
spadicea L. 325.
spadicea Mitsch. 324.
spadicea Mueh. 334.
speciosa Schreb. 336.
spectabilis Jan. 329.
stipoides Desf. 292.
sylvatica Vill. 326.
sylvatica Huds. 277.
tennifolia Sibth. 296.
tenniflora Schrad. 288.
tenniflora α . *mutica*. 275.
thalassica Kunth. 377.
triflora Sm. 358.
unilateralis Schrad. 275.
vaginata W. Kit. 313.
vallesiaca Gaud. 311.
varia Hnke. 315.
varia Ilppe. 316.

varia γ . *crassifolia* Koch. 320.
varia Kunth. 317. 320.
violacea Gaud. 302.
vivipara Sm. 392.
xanthina H. S. 317.

Fibrigia umbellata Koel. 454.

G.

Gastridium P. Beauv. pag. 7.

australe P. Beauv. 122.
australe Kunth. 122.
lendigerum Gaud. 122.

Gaudinia P. Beauv. pag. 14.

fragilis P. Beauv. 168.

Glyceria R. Br. pag. 47.

airoides Rehb. 374.
aquatica Sm. 379. 374.
capillaris Whlbg. 376.
distans Whlbg. 375.
festucacea Fries. 438.
festucaeformis Heynh. 378.
fluitans R. Br. 380.
maritima Whlbg. 377.
plicata Fries. 381.
procumbens Sm. 369.
rigida Sm. 370.
spectabilis M. et K. 379.

H.

Helichloa alopecuroides Host. 470.
diandra Host. 468.
schenoides Host. 469.

Heteropogon Pers. pag. 58.

Allionii R. S. 458.
glabrum Pers. 458.

Hierochloe Gm. pag. 66.

australis R. S. 499.
borealis R. S. 500.
odorata Whlbg. 500.

Holcus L. pag. 18.

australis Schrad. 499.
avenaceus Seop. 192.
biaristatus Weber. 197.
borealis Schrad. 500.
bulbosus Schrad. 193.
cernuus W. 466.
Docua Forsk. 465b.
Durra Forsk. 465.
cragmus Forsk. 464.
Gryllus R. Br. 208.

halepensis L. 464.
lanatus L. 190.
mollis L. 191.
odoratus Tim. 500.
odoratus Host. 499.
odoratus L. 499.
odorata α . *repens* Schk. 500.
repens Host. 500.
saccharatus L. 465b.
Sorghum L. 465.

Homalocenchrus oryzoides Poll. 494.

Hordeum L. pag. 29.

bulbosum L. 252.
ciliatum Lam. 272.
crinitum Desf. 244.
geniculatum All. 250.
jubatum Lois. 244.
maritimum With. 250.
maritimum Rth. 251.
murinum L. 249.
nodosum M. Bieb. 251.
pratense Huds. 251.
pseudomurinum Tapp. 249b.
rigidum Rth. 250.
secalinum Schreb. 251.

Hydrochloa airoides Hartm. 374.
aquatica Hartm. 379.
cerulea Hartm. 372.
distans Hartm. 375.
fluitans Hartm. 380.
maritima Hartm. 377.

I.

Imperata Cyril. pag. 58.

arundinacea Cyr. 455.
cylindrica Host. 455.
Königii P. Beauv. 455.

Joachimia phalaroides Ten. 452.

K.

Knappia agrostidea Sm. 453.
vena Trin. 453.

Koeleria Pers. pag. 15.

aristata Lois. 200.
coerulea Ten. 445b.
eristata Pers. 174.
glauca DeC. 176.
hirsuta Gaud. 177.
phleoides Pers. 337.
pyramidalis Roehel. 176.
subspicata Rehb. 200.
vallesiaca Gaud. 175.
villosa Pers. 173.

L.

- Lagurus** L. pag. 15.
cylindricus L. 455.
ovatus L. 169.
Lamarkia aurea Mueh. 367.
Lappago Schreb. pag. 69.
racemosa W. 514.
Lasiagrostis Lk. pag. 14.
Calamagrostis Lk. 167.

- Leersia** Soland. pag. 65.
oryzoides Sw. 494.

- Lepturus** Trin. pag. 24.

- cylindricus* Trin. 224.
filiformis Trin. 223.
incurvatus Trin. 222.
pannonicus Knth. 225.
sirigosus Dumort. 223.
subulatus Knth. 224.

- Libertia arduennensis* Lej. 351.

- Limnetis pungens* Rich. 451.

- Lolium** L. pag. 25.

- agreste* Host. 235b.
arvense With. 233.
Boucheanum Knth. 238.
bromoides Huds. 294.
complanatum Schrad. 230.
festuaceum Lk. 236.
Halleri Gmel. 235b.
italicum A. Braun. 238, 239.
linicola Sonder. 226.
multiflorum Lam. 234.
perenne L. 235.
remotum Hoffm. 226—228.
rigidum Gaud. 230.
robustum Rehb. 229.
speciosum Step. 233.
temulentum L. 231—233.
tenue L. 235b.

- Lophochloa** Rehb. fol. 40.
phleooides Vill. 337.

M.

- Megastachya Eragrostis* P. B. 426.
rigida P. Beauv. 370.

- Melica** L. pag. 54.
altissima L. 439, 440.

- Bauhini* All. 438.
ciliata L. 435.
coerulea L. 372.
coerulea major Rth. 373.
decumbens Weber. 433.
exasperata R. S. 438.
interrupta β. 440.
Lobellii Vill. 436.
montana Huds. 437.
nodosa Pill. 432.
nutans L. 437.
nutans Lam. 436.
pyramidalis Desf. 438.
rigida Wib. 433.
setacea Pers. 438.
sibirica Lam. 439.
uniflora Retz. 436.

- Mibora** Adans. pag. 57.
verna P. Beauv. 453.
Michelaria bromoidea Dumort. 351.

- Milium** L. pag. 13.

- confertum* Mill. 159.
effusum L. 159.
esculentum Mueh. 519.
frutescens Sieb. 162.
lendigerum L. 122.
multiflorum Cav. 162.
paradoxum L. 163.
scabrum Merlet. 161.
vernale M. Bieb. 160.

- Molinia** Schrk. pag. 47.

- aquatica* Wib. 374.
arundinacea Schrk. 373.
coerulea Mueh. 372.
distans Hartm. 375.
littoralis Host. 373.
maritima Hartm. 377.
serotina M. et K. 432.
varia Schrk. 372.

- Monerma monandra* P. Beauv. 221.
sabulosa P. Beauv. 224.

- Mygalurus bromoides* Lk. 293.
caudatus Lk. 290.
geniculatus Lk. 292.
unigibbus Lk. 291.

N.

- Nardurus** Rehb. pag. 33.
Halleri Rehb. 276.
hispanicus Rehb. 276b.
tenellus Rehb. 288.
unilateralis. 275.

- Nardus** L. pag. 56.
aristata L. 221.
striata L. 450.

O.

- Ophiurus** Gärtn. pag. 24.

- filiformis* R. S. 223.
incurvatus P. Beauv. 222.
pannonicus P. Beauv. 225.
subulatus Lk. 224.

- Oplismenus Burmanni* P. Beauv. 512.
undulatifolius R. S. 513.

- Orochloa** L. pag. 29.

- disticha* L. 253.

- Orthopogon** R. Br. pag. 69.

- Burmanni* R. Br. 512.
undulatifolius R. Br. 513.

P.

- Panicastrella capitata* Mueh. 441.

- Panicum** L. pag. 70.

- arenarium* M. Bieb. 506.
asperum Lam. 511.
bicolor Mueh. 510.
bromoides Lam. 512.
Burmanni M. Bieb. 512.
capillare L. 518.
ciliare Retz. 508.
Crus Galli L. 515.
Dactylon L. 454.
cruciforme R. S. 517.
cruciforme Sm. 517.
esculentum Mueh. 519.
flutescens Mueh. 509.
germanicum C. B. 510.
glabrum Gaud. 506.
glaucum L. 509.
hirtellum Wulf. 513.
hirtellum Burm. 512.
humifusum Knth. 506.
Ischaemum Schreb. 506.
laevigatum β. Lam. 509.
lineare Krok. 506.
lineare Burm. 454.
Linkianum Knth. 507.
lutescens Weig. 509.
miliaceum L. 519.
penicillatum N. v. E. 509.
pumilum Poir. 509.
sanguinale L. 507.
stagnidum Host. 512.
undulatifolium Ard. 513.
verticillatum L. 511.
viride L. 510.

- Paspalum aristatum* Mueh. 452.
ambiguum DeC. 506.
ciliare DeC. 508.

Dactylon Lam. 454.
praecox Wall. 454.
sanguinale a. Lam. 507.
umbellatum Lam. 454.

Pechva subcylindrica Pour. 469.

Pennisetum glaucum R. Br. 509.
reclinatum Vill. 510.
verticillatum R. Br. 511.
viride R. Br. 510.

Phalaris L. pag. 64.

alpina Hnke. 488.
aquatica L. 492b.
aquatica Ait. 492.
aquatica minor Savi. 492b.
arenaria W. 481.
aspera Retz. 486.
canariensis L. 491.
capensis Treb. 492.
ciliata Lagas. 488.
coerulescens Desf. 492b.
cristata Forsk. 170.
cruciformis L. 452.
explicata Lk. 470.
geniculata Sm. 470.
minor Retz. 492.
mucronata Desf. 489.
nitida Prsl. 492b.
oryzoides L. 494.
paniculata Ait. 486.
paradoxa L. 470.
phleoides L. 487.
phleoides Savi. 488.
phleoides β. Ait. 481.
praeorsata Lam. 490.
trigyna Host. 489.
tuberosa L. 492b.
raginiflora Forsk. 469.
variegata Spr. 492b.

Phleum L. pag. 63.

Aegilops Scop. 280.
alopecuroides Pill. et Mitz. 470.
alpinum L. 484.
arenarium L. 481.
asperum Knth. 486.
autumnale Scop. 445.
Bohmeri Wib. 487.
crinitum Schreb. 170.
cuspidatum W. 489.
echinatum Host. 485.
Gerardi All. 479.
glabrum Bernh. 487.
hirsutum Suter. 488.
laeve M. Bieb. 487.
Michellii All. 488.
monspeliense Koel. 170.
nodosum L. 483.
paniculatum β. Huds. 486.
phalaroides Koel. 487.
phalaroides Vill. 488.
pratense L. 482. 483.
schenoides Jacq. 468.
schenoides L. 469.

tenue Schrad. 480.
trigynum Host. 489.
centricosum Mch. 486.
viride All. 486.

Pholiurus Trin. pag. 25.

pannonicus Trin. 225.

Phragmites Trin. pag. 67.

communis Trin. 502.
isiaca Rehb. 503.

Piptatherum P. Beauv. pag. 13.

multiflorum P. Beauv. 162.
paradoxum P. Beauv. 163.

Poa L. pag. 49.

airoides Koel. 374.
alpina L. 390—393.
altissima Mch. 397.
angustifolia Knth. 411.
angustifolia Whlbg. 410.
angustifolia L. 413.
annua L. 387.
aquatica L. 379.
arenaria Retz. 375.
arenaria a. Trin. 375.
arenaria β. Trin. 378.
arenaria γ. Trin. 377.
badensis Hnke. 390.
brevifolia DeC. 391.
brizoides Whlbg. 390.
bulbosa L. 385. 386.
caesia Sm. 400.
carniolica Host. 383.
cenisia All. 397.
cenisia Lk. 390.
cenisia γ. *pallenscens* Koch. 399.
cilianensis All. 426.
coarctata. 407.
collina Host. 390.
compressa L. 401.
compressa β. *Longiana* Koch. 402.
compressa β. *effusa* Tsch. 401.
compressa Urv. 390.
concinna Gand. 383.
cristata L. 171.
carrula Koel. 330.
decumbens With. 433.
depressa Prsl. 416.
discolor Ilppe. 389.
distans L. 375.
disticha Wulf. 253.
distichophylla Gand. 397.
dicaricata Gon. 382.
dubia Leers. 418.
dura Scop. 368.
effusa Kit. 411.
Eragrostis Cav. 426.
Eragrostis L. 427.
expansa Gmel. 382.
fertilis Host. 411. 412.
festucaeformis Host. 378.
firmula. 408.
flavescens Thonr. 392.
flexuosa Whlbg. 398.
fluitans Scop. 380.
frigida Gand. 393.
glauca Poir. 400.
glaucaanthos. 400.
glauantha Gand. 409.
glauescens Rth. 400.
Halleri (dis) R. S. 399.
humilis Ehrh. 416.
hybrida Gand. 423b.
Koeleria DeC. 390.
Longiana Rehb. 402.
latifolia Rehb. 415.
laxa Hnke. 395. 396.
littoralis Knth. 361.
loliacea Huds. 274.
maritima Huds. 377.
Megastachya Koel. 426.
minor Gand. 359.
Moliniera Balb. 390.
montana All. 406.
mutalis Wibel. 401.
memoralis L. 403—409.
memoralis β. *caesia* Knth. 400.
nitens Weber. 500.
pallens Gand. 399.
palustris Rth. 410.
phoenice Scop. 334.
pilosa Knth. 424.
pilosa Host. 425.
pratensis L. 413—417.
pratensis Poll. 418.
procumbens Curt. 369.
pumila Host. 384.
pungens M. Bieb. 361.
pyramidata Lam. 176.
quadripedalis Ehrh. 421.
remota Forsk. 423.
retroflexa Curt. 375.
rigida L. 370.
rubens Mch. 421.
rupestris With. 369.
salina Poll. 375.
scabra Ehrh. 418.
serotina Ehrh. 410.
scleroides All. 253.
setacea Hoffm. 413.
stolonifera Bellard. 397.
strigosa Hoffm. 414.
subcoerulea Sm. 416.
submillora Rehb. 405.
sudetica Hnke. 421. 422.
sudetica β. *remota* Fries. 423.
supina Schrad. 388.
supina Panz. 389.
sylvatica Poll. 326.
sylvatica Vill. 421.
tenella nemoralis. 404.
tenella Ilppe. 389.
thermalis Pers. 390.
trinervata Schrad. 326.
trinervata DeC. 421.
trivialis L. 418—420.
trivialis Poll. 390.
tunetana Spr. 361.
variegata Lam. 417.
vulgaris nemoralis. 405.

Pollinia Spr. pag. 59.

distachys Spr. 207.

Gryllus Spr. 208.

Polypogon Desf. pag. 15.

crinitum Nutt. 170.

littoralis Sm. 172.

maritimus W. 171.

mons-peliensis Desf. 170.

panicum Lagas. 170.

Psamma P. Beauv. pag. 12.

arenaria R. S. 157.

baltica R. S. 158.

Psilathera Lk. pag. 55.

tenella Lk. 442.

Psilurus Trin. pag. 24.

nardoides Trin. 221.

R.

Rottbetta biflora Rth. 225.

cylindrica W. 224.

erecta Savi. 223.

filiformis W. 223.

incurvata L. fil. 222.

incurvata β. DeC. 223.

monandra Cav. 221.

pannonica Host. 225.

salina Spr. 225.

S.

Saccharum L. pag. 58.

appresum Kit. 457.

Baldwinii Spr. 457.

cylindricum Lam. 455.

Königii Retz. 455.

Ravennae Marr. 456.

Ravennae L. 456.

siska Cav. 455.

spicatum Burm. 455.

strictum Spr. 457.

strictum Nutt. 457.

Thunbergii Retz. 455.

Santia plumosa Savi. 170.

Schedonorus arundinaceus Dam. 334.

Schenodorus auratus R. S. 300.

calamarius R. S. 326.

cernua Schult. 324.

elatior P. Beauv. 334.

inermis R. S. 335.

nigrescens R. S. 322.

Schenodorus nutans R. S. 324.

pratensis P. Beauv. 330.

pumilus R. S. 316.

Scheuchzeri R. S. 324.

serotinus R. S. 432.

sylvaticus Ilppe. 326.

Schmidtia utriculosa Sternbg. 467.

Schoenus aculeatus L. 468.

Sclerochloa P. Beauv. pag. 46.

dichotoma Lk. 371.

divaricata P. Beauv. 382.

dura P. Beauv. 368.

maritima Rehb. 371.

procumbens P. Beauv. 369.

rigida Lk. 370.

Scolochloa Lk. pag. 54.

arundinacea M. et K. 504.

festuacea Lk. 434.

Secale L. pag. 31.

campestre Schult. 273.

cereale M. Bieb. 273.

fragile M. Bieb. 273.

spontaneum Fisch. 273.

sylvestre Host. 273.

villosum L. 272.

Sesleria Ard. pag. 55.

argentea Savi. 445b.

coerulea Ard. 444.

cylindrica DeC. 445b.

disticha Pers. 253.

dura Knth. 368.

echinata Host. 441.

elongata Host. 445.

interrupta Vis. 449.

juncifolia Suffr. 446. 447.

leucocephala DeC. 443.

microcephala DeC. 442.

pallidescens Hartm. 445b.

spaecephala Ard. 443.

tenella Host. 442.

tenuifolia Schrad. 446—449.

Setaria P. Beauv. pag. 68.

glauca P. Beauv. 509.

pumila R. S. 509.

verticillata P. Beauv. 511.

viridis P. Beauv. 510.

Weinmanni R. S. 510.

Siglingia decumbens Bernh. 433.

Sorghum L. pag. 60.

cernuum W. 466.

halapense Pers. 464.

saccharatum Pers. 465b.

vulgare Pers. 465.

Spartina Schreb. pag. 56.

phleoides Rth. 469.

stricta Rth. 451.

Sphenopus Trin. pag. 48.

divaricatus Rehb. 382.

Gouani Trin. 382.

Sporolobus pungens Knth. 140.

Stipa L. pag. 13.

Aristella L. 164.

Calamagrostis Whlbg. 167.

capillata L. 166.

membranacea L. 291.

pennata L. 165.

Sturmia minima Ilppe. 453.

Synthericum ciliare Schrad. 508.

glabrum Schrad. 506.

praecox Walt. 507.

vulgare Schrad. 507.

T.

Trachynia Lk. pag. 33.

distachya Lk. 287.

Trachypodia stricta DeC. 451.

Trachypogon avenaceus N. ab. E. 464.

hirtus N. ab. E. 460.

Tragus racemosus Desf. 514.

Trichodium alpinum Schrad. 127.

caninum Schrad. 128.

rupestre Schrad. 126.

Triodia P. Beauv. pag. 54.

decumbens P. Beauv. 433.

Trisetum alpestre P. Beauv. 201.

alpinum R. S. 212.

argenteum R. S. 198.

Caranillesii Trin. 195.

distichophyllum P. Beauv. 199.

flavescens P. Beauv. 204.

neglectum R. S. 194.

phleoides Trin. 337.

praecox Dumort. 179.

pratense Pers. 204.

pubescens R. S. 213.

striatum P. Beauv. 197.

subspicatum P. Beauv. 200.

tenue R. S. 197.

villosum Schult. 202.

Triticum L. pag. 31.

acutum β. Rehb. 264.

affine Bethard. 264.

biflorum Brign. 283.

biunciale All. 288.

biunciale Vill. 276.

bromoides Wibel. 280.

caninum Schreb. 254.

ciliatum DeC. 287.
cristatum Schreb. 255.
fartum Viv. 267.
Festuca DeC. 276.
giganteum Retz. 271.
glaucum DeC. 267.
gracile Brotero. 277.
Halleri Viv. 276.
hispanicum W. 276b.
intermedium Host. 262.
juncum Host. 262.
Lachenalii Gm. 276.
loliaceum Sm. 274.
lolioides Pers. 276.
nardus DeC. 288.
pilosum Secus. 271.
pinnatum Mch. 280.
pinnatum p. DeC. 282.
repens L. 256 — 261.

repens b. *maritimum* K. et Z. 263.
rigidum Schrad. 271.
rottboella DeC. 274.
sepium Lam. 254.
supinum Schrnk. 361.
sylvaticum Mch. 277.
tenellum a. Lam. 288.
tenellum L. 276.
teretiflorum Wibel. 277. 326.
unilaterale L. 275.
unilaterale Vill. 274.
villosum M. Bieb. 272.
violaceum Horn. 284.

U.

Utrachne parviflora Trin. 162.
virescens Trin. 163.


V.

Ventenata acenacea Koel. 197.
bromoides Koel. 197.

Vilva stolonifera P. Beauv. 138.

Vulpia Gmel. pag. 34.

bromoides Gm. 293.
geniculata Lk. 292.
ligustica Bertol. 292.
membranacea Lk. 291.
Myurus Willem. 289.
Myurus Gm. 290.
pilosa Gm. 289.
Pseudomyurus Willem. 290.
uniglumis Solan. 291.

I. *Genuinae pterogynae brevigenae poliovocarpae*II. *Subsuperpediceae inogynae, acrogynae, strobocarpae*III. *Subcomelinaceae orthogynae, mesogynae, brachycarpae*



22

Agrostis cum tenuiflorum G.W.D.

23. *Agrostis spicata* P.B.









1539. *A. maritima* L.M.



1540. *A. pungens* SCHERB.

Agrostis



Elymus LK

Calamagrostis Beau

Setaria PB

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Cal. stricta PB

Calamagrostis ERH

Cal. pyramidata Host



Calamagrostis Aleutica DC.



Calamagrostis Aleutica DC.

Calamagrostis Aleutica DC.



Calamagrostis canina SMT.

Calamagrostis Rothii RTH.

Calamagrostis nutans SMT.



C. quadrangula Bern.

C. lanceolata Bern.

Calamagrostis Bern.







Carex LK

Ammophila Host

Calamagrostis LK



150. *Helium cyneum* L.





Agrostis peruviana HBK.



108. Pharusia fragilis P. B.



Lycopodium complanatum LAM.

Lycopodium complanatum LAM.

Lycopodium complanatum LAM.



H. maritima L.

H. littoralis L.

H. littoralis L.





1822
Stemodia L.

1823 *Stemodia L.*
Stemodia L.

1824 *Stemodia L.*
Stemodia L.





190. *landula* L.

191. *mollis* L.

Holcus



A. dichotomum
P.B.

Arthropogon P.B.

A. dichotomum



(Vend)





Alopecurus pratensis Host.

Alopecurus pratensis Bertol.

Alopecurus

Alopecurus pratensis Thunb.



LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Trisetum cymoides L.

Trisetum

compressum HBK.

Trisetum



211. Zea mays L.

Sorghum

212. Sorghum L.



215 pubescens L.

214

semperverens Willd.

herm.



Leuca

Elymus



Salicornia ...



Lepturus incurvus Thunberg

Fig. 1. a. b. c. d.

Lepturus filiformis Thunberg



Pharus subulatus LK.

Picturus pinnatus LK.



Lelium arvense Willd. *L. robustum* Lam. *L. complanatum* Scop.





LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Lolium perenne LEROUX
"Perenne" RYH





Eriodus Schreb.

Elymus L.

E. europaeus L.



E. arenarius L.





Hieracium latifolium L.

Cynodon dactylon L.







202. *Cylindrum* BS

203. *Cylindrum* Host

262. *Cylindrum* Bern

Cylindrum Bern



LIBRARY
YORK
REAL





Triticum villosum MB.

Secale perenne MB.





Brachypodium pinnatifidum PB

Brachypodium pinnatifidum R.S.



LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



285.
Brachypodium pinnatifidum R. & S.

Brachypodium pinnatifidum P. B.

286.
Brachypodium pinnatifidum L. K.



237. *Trachypogon cristatus* Lk.

238. *Vardanus tenellus* Kunth. *Fl. germ.*







507
Stellata
L. 111

508
pallens *Host.*

509
laevigata
Cr. 1111

Festuca

510 *pannonica*
Willd.

511 *rubra* *Willd.*



MISS ELLIEN BAYREN

515 *pragmatica* H. K.

To Anne.

10000 17500



515. *varia* HAW.

516. *pumila* Vill.

517. *sanguinea* Benth.

Festuca



519

520

decolorans M.K.
arundinacea excrescens
A. GRAM.

cokei B.M.

pusilliflora Host
proserpina Willd.

Festuca

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



322
nigrescens
L.A.M.

321. *rubra* LAM.

323. *nemoralis* LAM.

Festuca.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



527

Schuchzeria Willd.

528

Festuca Vill.

529

Spodiopogon L.

Festuca



527
sylvatica Vahl.
F. latifolia Host

528
L. nemoralis L.

Festuca



520 *Festuca speculabilis* HBK.



pratensis
Wies

acuminata SCHREIB. *incarnata*
DE C.

Foliated





540
arvensis L.

540
medeolae L.

541
opulatus Sibth.

542
racemosus L.

543
erectus M.B.

544
patulus M.B.

Bromus L.





558

inermis L.

557

asper L.

Bromus





Lactylis maritima NEES.

502

503

504

Lactylis heptanema ROTH abbreviata BRUN.

Lactylis

Lactylis L.

LIBRARY
OF NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



Pechinatus L.

Cymosurus L.

Cristatus L.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN





572
corallina Mex.

Hobbes

leucalis Muls.

Alveria serotina R.
calyx: insertion
F. B.



distachya capillaris
Willd.

distachya humilis
Willd.

Graminea R. Br.

mercurialis humilis
Willd.



Poaceae. Juncus II.

Gloriosa R. Br.

580. fluitans R. Br.



Stylosanthes bifida Sims

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



504. *coarctata*
(H.W.)

505. *coarctata*
(H.W.)

502.
coarctata (H.W.)

503. *coarctata*
(H.W.)

503. *coarctata*
(H.W.)



1794



Phacelia 500, 508, 510

Phacelia 501

Phacelia 502

Phacelia 503

Phacelia 504

Phacelia 505

Phacelia 506



Agrostis flavida L.
H. & A.

Agrostis lava H. & A.

Agrostis testiculophylla
C. & A.

(Poa)

Agrostis pilosissima
H. & A.







Poa palustris W. H. B.
serotina L.

Poa annua L.

Poa annua L.

Poa annua L.



Anagrostis

Briza media

Briza media

Briza media

Briza media

Briza media



48. vulgaris.

49. Peucedanum L.

50. multiflorum



72 and p. rubens
H. B. K.

G. L. H.

72. multicaulis H. B. K.
repens.

72.5. hybridula
G. L. H.

PARY
YORK
ICAL
N





Briza media L.

Briza media L.

Briza media L.

Briza media L.

Briza L.



Elychnia serotina
Lk

Eriochloa decumbens
P. B.

Elychnia serotina
Lk





LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN





750

Vardus stricta L.



Sparganium strachii Ben

Beckmannia cruxformis Moos





Imperata cylindrica
Hörst



456
Saccharum barrense
Merr



457
Saccharum strictum Spr

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN



203. *Heteropogon* *Alboni* Kunth.

205. *Andropogon* *hirtus* L.

T. Neesbach del.

S. Knorr sculp.





Sorghum vulgare L.



407.
Calceanthus
subulifolius L.

A B C



408.

Crypsis aculeata L.

D E



409.

Calceanthus L.



410.

Crypsis L.

Calceanthus L.

176-177



LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL





1373

aspera P.B.



1374 *Boissieri* P.B.



1375 *Michx.* A.H.



1376 *crispata* P.B.

Chilochloa P.B.



Phalaris L.

intermedia L.

minor L.

agrostoides L.

Phalaris G.M.S.

scandens L.

Phalaris L.

agrostoides L.

L. Reichenbach del.



Phalaris cantharus



499. australis *H.S.*

Microchloa *Gr.*

500. australis *H.S.*



50h

Lygodesmus tenuis Link.



502 communis Trin



503. communis Trin

Phragmites



504.
Pennisetum



506. Pennisetum

truncat.



LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN





Ctenantholepisma HBK.

C. Burmanni R.Br.

C. theopogon R.Br.



Lappula racemosa II.



Panicum PP

Panicum var. *acutula*

Panicum PP

Panicum PP

Panicum PP


24



LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN





New York Botanical Garden Library
OK281.R4 v.1 gen
Reichenbach, H. G./Icones florum Germani

3 5185 00103 6969

